

Journal de l'École
polytechnique / publié par le
Conseil d'instruction de cet
établissement

École polytechnique (Palaiseau, Essonne). Auteur du texte.
Journal de l'École polytechnique / publié par le Conseil
d'instruction de cet établissement. 1895.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.

[CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE](#)

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter utilisation.commerciale@bnf.fr.

JOURNAL
DE
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

11. E. 100. 1



7880
2336.E.I

JOURNAL

DE

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

PUBLIÉ

PAR LE CONSEIL D'INSTRUCTION

DE CET ÉTABLISSEMENT.

II^e SÉRIE. — PREMIER CAHIER.



PARIS,

GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES,
Quai des Grands-Augustins, 55.

1895

Ph 4^o
5699

Journal de l'École Polytechnique (1^{re} SÉRIE). 64 Cahiers in-4, avec figures; 1794-1894..... 1000 fr.

Les Cahiers suivants se vendent séparément :

VII ^e et VIII ^e , Chaque Cahier.	8 fr.	» c.	XXIX ^e et XXX ^e	5 fr.	» c.
IX ^e comprenant la théorie des fonctions analytiques, par Lagrange.....	7	»	XXXI ^e	9	»
XI ^e	12	»	XXXII ^e	5	»
XII ^e	12	»	XXXIII ^e	9	»
XIII ^e	8	»	XXXIV ^e à XXXVII ^e	10	»
XIV ^e	10	»	XXXVIII ^e et XXXIX ^e	8	»
XVI ^e et XVII ^e	8	»	XI ^e à XLIII ^e	10	»
XXI ^e et XXII ^e	8	»	XLIV ^e à LIV ^e	12	»
XXIII ^e	6	»	LV ^e à LVII ^e	14	»
XXIV ^e	7	»	LVI ^e	10	»
XXV ^e et XXVI ^e	8	»	LIX ^e	12	»
XXVII ^e	9	»	LX ^e	10	»
XXVIII ^e	7	»	LXI ^e et LXII ^e	11	»
			LXIII ^e	12	»
			LXIV ^e	12	»

Table des Matières contenues dans les 64 premiers Cahiers, formant 45 Volumes, suivie d'une Table analytique et d'une Table générale par noms d'auteurs. In-4; 1895..... 3 fr.

Répertoire de l'École Polytechnique, depuis l'époque de sa création en 1794, jusqu'en 1853 inclusivement, suivi de la liste des Élèves admis en 1854, avec plusieurs tableaux et résumés statistiques; par M. C.-P. MARIELLE. Vol. in-8..... 5 fr.

Répertoire de l'École Polytechnique de 1855 à 1865, faisant suite au *Répertoire de M. Marielle*, par M. LE PRIEUR, Trésorier de l'École. Vol. in-8..... 3 fr.

AVERTISSEMENT.

Le *Journal de l'École Polytechnique* atteint en 1895 la centième année de son existence.

« L'objet de ce Journal, dit l'*Avant-Propos* publié en 1795 en tête
» du 1^{er} Cahier, se trouve dans les motifs imprimés au considérant de
» l'Arrêté des Comités de la Convention qui surveillent l'École centrale
» des Travaux publics, savoir : de justifier l'emploi des moyens que la
» République fournit pour l'instruction de ses Élèves; de les encourager,
» ainsi que ceux qui concourent à leur enseignement, par la publicité
» donnée à leurs travaux et à leurs soins; de faire prendre aux Études
» une direction qui tende sans cesse à les perfectionner; d'offrir un
» modèle propre à guider d'autres Établissements d'instruction; enfin,
» de répandre des connaissances très utiles relatives aux Arts ou aux
» Sciences, et de provoquer l'extension de leur domaine par des décou-
» vertes nouvelles ou des applications heureuses. »

Le but que se proposaient la Convention et les fondateurs du Journal a-t-il été rempli? Il suffit d'en parcourir la Collection pour s'en rendre compte, et même de lire seulement la Table des matières qu'elle renferme et le nom des Auteurs qui y ont collaboré.

Nous avons pensé précisément qu'il serait bon d'établir les Tables des

cent premières années de cette Publication. On en trouvera trois à la fin de ce Cahier : la première renferme les matières contenues dans les 64 premiers Cahiers, formant 45 Volumes; la seconde est une Table analytique basée sur la classification adoptée dans le Répertoire bibliographique des Sciences mathématiques; la troisième est une Table alphabétique des noms d'Auteurs. M. d'Ocagne, répétiteur à l'École, a bien voulu se charger de mettre à jour la première et la troisième et d'établir la seconde qui n'existait pas.

LA RÉDACTION.



JOURNAL DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

ANALYSIS SITUS;

PAR M. H. POINCARÉ.

INTRODUCTION.

La Géométrie à n dimensions a un objet réel; personne n'en doute aujourd'hui. Les êtres de l'hyperespace sont susceptibles de définitions précises comme ceux de l'espace ordinaire, et si nous ne pouvons nous les représenter, nous pouvons les concevoir et les étudier. Si donc, par exemple, la Mécanique à plus de trois dimensions doit être condamnée comme dépourvue de tout objet, il n'en est pas de même de l'Hypergéométrie.

La Géométrie, en effet, n'a pas pour unique raison d'être la description immédiate des corps qui tombent sous nos sens : elle est avant tout l'étude analytique d'un groupe; rien n'empêche, par conséquent, d'abord d'autres groupes analogues et plus généraux.

Mais pourquoi, dira-t-on, ne pas conserver le langage analytique et le remplacer par un langage géométrique, qui perd tous ses avantages dès que les sens ne peuvent plus intervenir. C'est que ce langage nouveau est plus concis; c'est ensuite que l'analogie avec la Géométrie ordinaire peut créer des associations d'idées fécondes et suggérer des généralisations utiles.

Peut-être ces raisons ne sont-elles pas suffisantes? Ce n'est pas assez, en effet, qu'une science soit légitime : il faut que l'utilité ne puisse en être contestée. Tant d'objets divers sollicitent notre attention, que les plus importants ont seuls droit de l'obtenir.

Aussi y a-t-il des parties de l'Hypergéométrie auxquelles il n'y a pas lieu de beaucoup s'intéresser : telles sont, par exemple, les recherches sur la courbure des surfaces dans l'espace à n dimensions. On est sûr d'avance d'obtenir les mêmes résultats qu'en Géométrie ordinaire et l'on n'entreprend pas un long voyage pour retrouver des spectacles tout pareils à ceux que l'on rencontre chez soi.

Mais il y a des problèmes où le langage analytique serait tout à fait incommode.

On sait quelle est l'utilité des figures géométriques dans la théorie des fonctions imaginaires et des intégrales prises entre des limites imaginaires, et combien on regrette leur concours quand on veut étudier, par exemple, les fonctions de deux variables complexes.

Cherchons à nous rendre compte de la nature de ce concours ; les figures suppléent d'abord à l'infirmité de notre esprit en appelant nos sens à son secours ; mais ce n'est pas seulement cela. On a bien souvent répété que la Géométrie est l'art de bien raisonner sur des figures mal faites ; encore ces figures, pour ne pas nous tromper, doivent-elles satisfaire à certaines conditions ; les proportions peuvent être grossièrement altérées, mais les positions relatives des diverses parties ne doivent pas être bouleversées.

L'emploi des figures a donc avant tout pour but de nous faire connaître certaines relations entre les objets de nos études, et ces relations sont celles dont s'occupe une branche de la Géométrie que l'on a appelée *Analysis Situs*, et qui décrit la situation relative des points des lignes et des surfaces, sans aucune considération de leur grandeur.

Il y a des relations de même nature entre les êtres de l'hyperespace ; il y a donc une *Analysis Situs* à plus de trois dimensions, comme l'ont montré Riemann et Betti.

Cette science nous fera connaître ce genre de relations, bien que cette connaissance ne puisse plus être intuitive, puisque nos sens nous font

défaut. Elle va ainsi, dans certains cas, nous rendre quelques-uns des services que nous demandons d'ordinaire aux figures de Géométrie.

Je me bornerai à trois exemples.

La classification des courbes algébriques en genres repose, d'après Riemann, sur la classification des surfaces fermées réelles, faite au point de vue de l'*Analysis Situs*. Une induction immédiate nous fait comprendre que la classification des surfaces algébriques et la théorie de leurs transformations birationnelles sont intimement liées à la classification des surfaces fermées réelles de l'espace à cinq dimensions au point de vue de l'*Analysis Situs*. M. Picard, dans un Mémoire couronné par l'Académie des Sciences, a déjà insisté sur ce point.

D'autre part, dans une série de Mémoires insérés dans le *Journal de Liouville*, et intitulés : *Sur les courbes définies par les équations différentielles*, j'ai employé l'*Analysis Situs* ordinaire à trois dimensions à l'étude des équations différentielles. Les mêmes recherches ont été poursuivies par M. Walther Dyck. On voit aisément que l'*Analysis Situs* généralisée permettrait de traiter de même les équations d'ordre supérieur et, en particulier, celles de la Mécanique céleste.

M. Jordan a déterminé analytiquement les groupes d'ordre fini contenus dans le groupe linéaire à n variables. M. Klein avait antérieurement, par une méthode géométrique d'une rare élégance, résolu le même problème pour le groupe linéaire à deux variables. Ne pourrait-on pas étendre la méthode de M. Klein au groupe à n variables, ou même à un *groupe continu quelconque*? Je n'ai pu jusqu'ici y parvenir, mais j'ai beaucoup réfléchi à la question et il me semble que la solution doit dépendre d'un problème d'*Analysis Situs* et que la généralisation du célèbre théorème d'Euler sur les polyèdres doit y jouer un rôle.

Je ne crois donc pas avoir fait une œuvre inutile en écrivant le présent Mémoire ; je regrette seulement qu'il soit trop long ; mais, quand j'ai voulu me restreindre, je suis tombé dans l'obscurité ; j'ai préféré passer pour un peu bavard.



I.

§ 1. — PREMIÈRE DÉFINITION DES VARIÉTÉS.

Soient $x_1, x_2, \dots, x_n$ n variables que je pourrai regarder comme les coordonnées d'un point dans l'espace à n dimensions.

Jusqu'à nouvel ordre, je supposerai que ces n variables demeurent toujours réelles.

Un système quelconque de valeurs de n variables s'appellera *un point*.

Considérons le système suivant formé de p égalités et de q inégalités :

$$(1) \quad \left\{ \begin{array}{l} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ \dots \dots \dots, \\ F_p(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) > 0, \\ \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) > 0, \\ \dots \dots \dots, \\ \varphi_q(x_1, x_2, \dots, x_n) > 0. \end{array} \right.$$

Je supposerai que les fonctions F et φ sont uniformes et continues et qu'elles ont des dérivées continues; je supposerai de plus que, si l'on forme le Tableau,

$$\begin{array}{cccc} \frac{dF_1}{dx_1}, & \frac{dF_1}{dx_2}, & \dots, & \frac{dF_1}{dx_n}, \\ \frac{dF_2}{dx_1}, & \frac{dF_2}{dx_2}, & \dots, & \frac{dF_2}{dx_n}, \\ \dots, & \dots, & \dots, & \dots, \\ \frac{dF_p}{dx_1}, & \frac{dF_p}{dx_2}, & \dots, & \frac{dF_p}{dx_n}, \end{array}$$

et que l'on forme les déterminants obtenus en prenant p colonnes quel-

conques dans ce Tableau, je supposerai, dis-je, que ces déterminants ne s'annulent jamais tous à la fois.

Je dirai que l'ensemble des points qui satisfont aux conditions (1), s'il y en a, ce que je suppose, forme une *variété à $n - p$ dimensions*. (Si en particulier $p = 0$, de sorte qu'il n'y ait que des inégalités, j'aurai une variété à n dimensions qui ne sera autre chose qu'une portion de l'espace à n dimensions; je désignerai ordinairement cette variété sous le nom de *domaine*.)

Deux cas peuvent se présenter. Soient $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ deux points satisfaisant aux conditions (1). Ou bien on pourra faire varier d'une manière continue $x_1, x_2, \dots, x_n$ depuis $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ jusqu'à $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, sans que les relations (1) cessent d'être satisfaites, et cela quelles que soient les valeurs de $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ et de $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, pourvu que ces valeurs satisfassent aux conditions (1); ou bien cela ne sera pas toujours possible.

Dans le premier cas, nous dirons que la variété définie par les conditions (1) est *continue*.

Dans ce qui va suivre, je ne considérerai que des variétés continues et, en ce qui concerne celles qui ne sont pas continues, je me bornerai à faire observer que l'on peut toujours les décomposer en un nombre fini ou infini de variétés continues.

Soit, par exemple, la variété

$$x_2^2 + x_1^4 - 4x_1^2 + 1 = 0.$$

Ici $n = 2$ et le point x_1, x_2 est un point du plan; notre variété n'est alors autre chose qu'une courbe du 4^e degré; mais, comme cette courbe se compose de deux branches de courbe fermées, notre variété n'est pas continue.

Mais nous pouvons la décomposer en deux autres, à savoir :

$$x_2^2 + x_1^4 - 4x_1^2 + 1 = 0, \quad x_1 > 0$$

et

$$x_2^2 + x_1^4 - 4x_1^2 + 1 = 0, \quad x_1 < 0$$

et chacune d'elles, se réduisant à une seule branche de courbe fermée, est continue.

Je dirai qu'une variété est *finie* si tous ses points satisfont à la condition

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 < K^2,$$

K étant une constante donnée.

Considérons maintenant le système de relations

$$(2) \quad \begin{cases} F_\alpha = 0 & (\alpha = 1, 2, \dots, p), \\ \varphi_\beta = 0, \\ \varphi_\gamma > 0 & (\gamma \geq \beta) \end{cases}$$

qui se compose de $p + 1$ égalités et de $q - 1$ inégalités.

Il peut arriver, ou bien qu'il n'y ait aucun point satisfaisant aux conditions (2), ou bien qu'il y en ait et, dans ce cas, ils formeront une variété, continue ou non, qui aura moins de $n - p$ dimensions.

L'ensemble des points qui satisferont à l'un des q systèmes de relations :

$$(3) \quad \begin{cases} F_\alpha = 0, & \varphi_1 = 0, & \varphi_\gamma > 0 & (\gamma \geq 1), \\ F_\alpha = 0, & \varphi_2 = 0, & \varphi_\gamma > 0 & (\gamma \geq 2), \\ \dots\dots\dots, & \dots\dots\dots, & \dots\dots\dots & \dots\dots\dots, \\ F_\alpha = 0, & \varphi_q = 0, & \varphi_\gamma > 0 & (\gamma \geq q) \end{cases}$$

s'appellera la *frontière complète* de la variété définie par les conditions (1). Mais nous nous placerons quelquefois à un autre point de vue et nous ne considérerons comme une véritable variété frontière que celles qui auront $n - p - 1$ dimensions.

Il pourra se faire qu'il n'y ait aucune variété à $n - p - 1$ dimensions qui satisfasse à l'un des q systèmes (3). Dans ce cas la variété définie par les conditions (1) sera dite *illimitée*. Dans le cas contraire, elle sera dite *limitée*.

Si une variété est à la fois finie, continue et illimitée, elle sera dite *fermée*.

Pour abréger un peu le langage, nous donnerons le nom de *surfaces* aux variétés à $n - 1$ dimensions, sauf dans le cas de $n = 2$; et nous donnerons, dans tous les cas, le nom de *courbes* aux variétés à une dimension.

§ 2. — HOMÉOMORPHISME.

Considérons une substitution qui change $x_1, x_2, \dots, x_n$ en $x'_1, x'_2, \dots, x'_n$, que j'assujettis seulement aux conditions suivantes.

On a

$$(4) \quad x'_i = \varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Dans un certain domaine, les fonctions φ_i sont uniformes, finies et continues; elles ont des dérivées continues, et leur déterminant fonctionnel ne s'annule pas.

Si l'on résout les équations (4) par rapport à $x_1, x_2, \dots, x_n$, il vient

$$x_k = \varphi'_k(x'_1, x'_2, \dots, x'_n) \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

et les fonctions φ'_k satisfont aux mêmes conditions que les fonctions φ_i .

Il est clair que l'ensemble des substitutions qui satisfont à ces conditions forme un groupe, et ce groupe est un des plus généraux que l'on puisse imaginer. La Science dont l'objet est l'étude de ce groupe et de quelques autres analogues a reçu le nom d'*Analysis Situs*.

Il est clair qu'une substitution de ce groupe transformera une variété de m dimensions en une variété de m dimensions, et que la variété transformée sera continue, ou finie, ou illimitée si la variété donnée l'est elle-même (et inversement).

Soient deux variétés d'un même nombre de dimensions définies V et V' respectivement par les conditions

$$(1) \quad \begin{cases} F_\alpha = 0 & (\alpha = 1, 2, \dots, p), \\ \varphi_\beta > 0 & (\beta = 1, 2, \dots, q), \end{cases}$$

et

$$(1 \text{ bis}) \quad \begin{cases} F'_\alpha = 0 & (\alpha = 1, 2, \dots, p), \\ \varphi'_\beta > 0 & (\beta = 1, 2, \dots, q'). \end{cases}$$

Supposons que l'on puisse faire correspondre à un point $x_1, x_2, \dots, x_n$ de la variété V un point $x'_1, x'_2, \dots, x'_n$ de la variété V' , de telle sorte que l'on ait

$$(5) \quad x'_k = \psi_k(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

Je considère le domaine D défini par les inégalités

$$F_\alpha > -\varepsilon, \quad F_\alpha < \varepsilon, \quad \varphi_\beta > 0.$$

La variété V est évidemment contenue tout entière dans le domaine D .

Je suppose que *dans le domaine* D les fonctions ψ_k sont finies, continues et uniformes, qu'elles ont des dérivées continues et que leur déterminant fonctionnel n'est jamais nul.

Résolvons maintenant les équations (5), nous trouverons

$$(6) \quad x_k = \psi'_k(x'_1, x'_2, \dots, x'_n) \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

Je considère le domaine D' défini par les inégalités

$$F'_\alpha > -\varepsilon, \quad F'_\alpha < \varepsilon, \quad \varphi'_\beta > 0,$$

et je suppose que *dans le domaine* D' les fonctions ψ'_k sont finies, continues et uniformes, qu'elles ont des dérivées continues et que leur déterminant fonctionnel n'est pas nul.

Il résulte de ces hypothèses qu'à tout point de V correspond un point de V' et un seul et inversement; à toute variété W contenue dans V correspondra une variété W' , d'un même nombre de dimensions, contenue dans V' ; si W est continue, finie ou illimitée, il en sera de même de W' , et inversement.

Je puis supposer, dis-je, que les fonctions θ sont analytiques. Si, en effet, ces fonctions θ sont finies et continues, on pourra trouver des fonctions θ' , qui seront analytiques et qui différeront des θ aussi peu que nous voudrons.

Je supposerai, en outre, que les déterminants fonctionnels de m des fonctions θ par rapport aux y ne s'annulent jamais tous à la fois.

On obtiendra une variété qui ne différera pas de la première, en remplaçant les y dans les équations (8) par m fonctions analytiques quelconques de m variables $z_1, z_2, \dots, z_m$.

La portée de cette nouvelle définition serait assez restreinte, si l'on ne pouvait l'augmenter par le procédé de la *continuation analytique*.

Considérons deux variétés V et V' définies par des équations analogues à (8). Soient, par exemple, les équations

$$(8) \quad x_i = \theta_i(y_1, y_2, \dots, y_m)$$

pour V , et les équations

$$(8 \text{ bis}) \quad x_i = \theta'_i(y'_1, y'_2, \dots, y'_m)$$

pour V' .

Il peut arriver que ces deux variétés aient une partie commune V'' ayant également m dimensions; c'est-à-dire que tous les points de V'' appartiendront à la fois à V et à V' .

Dans ce cas, à l'intérieur de V'' , les y seront des fonctions analytiques des y' et inversement.

On dira alors que les deux variétés V et V' sont la *continuation analytique* l'une de l'autre.

On peut former ainsi une chaîne de variétés

$$V_1, \quad V_2, \quad \dots, \quad V_n,$$

de telle façon que chacune d'elles soit la continuation analytique de la

précédente et qu'entre deux variétés consécutives de la chaîne il y ait une partie commune. C'est ce que j'appellerai une *chaîne continue*.

Il peut arriver aussi que la chaîne soit fermée, c'est-à-dire que V_n ne diffère pas de V_1 .

On peut avoir aussi un réseau de variétés, c'est-à-dire un ensemble de variétés telles que chacune d'elles soit la continuation de plusieurs autres et que l'on puisse passer d'une quelconque d'entre elles à une autre quelconque d'entre elles par continuation analytique; c'est ce que j'appellerai un *réseau continu*.

On pourra alors considérer l'ensemble de toutes les variétés d'une même chaîne ou d'un même réseau comme formant une variété unique.

C'est là une définition plus étendue encore que la première.

Il y a, en effet, des variétés (et nous en verrons plus loin des exemples) qui peuvent être décomposées en un certain nombre de variétés partielles, formant une chaîne ou un réseau continu et telles que chacune d'elles puisse être définie par des équations de la forme (8) (des variétés qui, par conséquent, rentrent dans notre seconde définition) et qui cependant ne peuvent pas être définies par des relations de la forme (1) et ne rentrent pas dans notre première définition.

Au contraire, toute variété qui satisfait à la première définition satisfait aussi à la seconde.

Nous pouvons, en effet, d'après un théorème bien connu, si $y_1, y_2, \dots, y_n$ sont définis par n relations de la forme

[illegible]

si, dans un certain domaine, les F sont des fonctions holomorphes des x , dont le déterminant fonctionnel ne s'annule pas; nous pouvons, dis-je, résoudre ces équations et en tirer

$$(\beta) \quad x_i = \theta_i(y_1, y_2, \dots, y_n),$$

les θ_i étant des fonctions des y holomorphes dans un certain domaine.

Soit maintenant une variété V satisfaisant à notre première définition, c'est-à-dire définie par les relations

$$(1) \quad F_\alpha = 0, \quad \varphi_\beta > 0.$$

Reprenons alors les équations (α) ; prenons- y , pour $F_1, F_2, \dots, F_p$, les premiers membres des p égalités (1). Quant aux autres fonctions

$$F_{p+1}, \quad F_{p+2}, \quad \dots, \quad F_n,$$

ce seront $n - p$ fonctions holomorphes quelconques des x . Je les assujettirai seulement à une condition.

Soit $x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0$ un point quelconque M_0 de la variété V . Je m'arrangerai de telle façon que le déterminant fonctionnel des n fonctions F ne s'annule pas pour

$$x_i = x_i^0.$$

Cela est évidemment possible, puisque j'ai supposé que les déterminants fonctionnels des p fonctions

$$F_1, \quad F_2, \quad \dots, \quad F_p,$$

par rapport à p quelconques des variables x , ne s'annulent jamais tous à la fois.

Je puis supposer encore que $F_{p+1}, F_{p+2}, \dots, F_n$ s'annulent au point M_0 , c'est-à-dire pour

$$x_i = x_i^0.$$

Alors, d'après le théorème cité plus haut, on peut résoudre les équations (α) et l'on trouve que les x_i s'expriment en séries ordonnées, suivant les puissances de

$$y_1, \quad y_2, \quad \dots, \quad y_n,$$

et convergentes pourvu que ces quantités satisfassent à certaines inégalités.

Soient donc

$$(\beta) \quad x_i = \theta_i$$

ces équations et

$$\lambda_k(y_1, y_2, \dots, y_n) > 0$$

les conditions auxquelles les y doivent satisfaire pour que les séries soient convergentes.

Faisons maintenant

$$y_1 = y_2 = \dots = y_p = 0;$$

les p premières équations (α) ne différencieront plus des p équations (1); et les fonctions θ_i , ne dépendant plus que de $n - p = m$ variables, seront de la forme (8).

Alors l'ensemble des relations

$$x_i = \theta_i, \quad \varphi_\beta > 0, \quad \lambda_k > 0$$

représentera une variété ν , qui sera définie à la seconde manière et qui, ne différant pas de

$$F_\alpha = 0, \quad \varphi_\beta > 0, \quad \lambda_k > 0,$$

fera partie de V .

Le point M_0 , qui est un point *quelconque* de V , fait partie de ν . On peut donc construire, autour d'un point quelconque de V , une variété analogue à ν .

Le cas le plus simple est celui où les conditions de convergence $\lambda_k > 0$ sont une conséquence des inégalités $\varphi_\beta > 0$.

Alors ν ne diffère pas de V et l'on peut se contenter, pour définir ν , des égalités (8) et des inégalités

$$(9) \quad \psi_\beta > 0,$$

que l'on obtient en substituant les θ à la place des x dans les inégalités

$$\varphi_\beta > 0.$$

Remarquons en passant que tous les déterminants fonctionnels de m des fonctions θ par rapport aux y ne s'annuleront jamais à la fois.

Si les conditions $\lambda_\beta > 0$ n'étaient pas une conséquence des inégalités $\varphi_\beta > 0$, on partagerait la variété V en variétés partielles; c'est ainsi, par exemple, que la variété V peut évidemment être décomposée en deux variétés partielles

$$F_\alpha = 0, \quad \varphi_\beta > 0, \quad \psi > 0$$

et

$$F_\alpha = 0, \quad \varphi_\beta > 0, \quad \psi < 0,$$

ψ étant une fonction quelconque de $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Cela posé, nous pourrions toujours partager V en variétés partielles, ou mieux construire sur V un certain nombre de variétés partielles, empiétant les unes sur les autres et assez petites pour que l'on puisse, pour chacune d'elles, trouver un système de variables auxiliaires, qui permette de représenter cette variété partielle par des égalités et des inégalités de la forme (8) et (9), satisfaisant à toutes les conditions que je viens d'énoncer. Tout point M_0 de V appartiendra à l'une de ces variétés partielles, et l'ensemble de ces variétés formera un réseau continu. La première définition est ainsi ramenée à la seconde.

Pourtant, il reste une remarque à faire; il peut arriver qu'à deux systèmes différents de valeurs de $y_1, y_2, \dots, y_m$ corresponde un même système de valeurs des fonctions $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ et, par conséquent, un même point de la variété V .

Dans ce cas, il convient d'adjoindre aux inégalités (9) d'autres inégalités

$$(10) \quad \psi_\gamma > 0,$$

en les choisissant de telle sorte que des divers systèmes de valeurs des

variables y , qui correspondent à un même point de V , il y en ait toujours un et un seul qui satisfasse aux inégalités (9) et (10).

Soit, par exemple, un tore, dont l'équation sera

$$(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + R^2 - r^2)^2 - 4R^2(x_1^2 + x_2^2) = 0.$$

Posons

$$x_1 = (R + r \cos y_1) \cos y_2,$$

$$x_2 = (R + r \cos y_1) \sin y_2,$$

$$x_3 = r \sin y_1.$$

Nous voyons qu'à un même point du tore correspondront une infinité de systèmes de valeurs des y , compris dans la formule

$$y_1 + 2K_1\pi, \quad y_2 + 2K_2\pi,$$

où les K sont entiers.

Mais si nous assujettissons les y aux conditions

$$0 < y_1 < 2\pi, \quad 0 < y_2 < 2\pi,$$

nous n'aurons plus qu'un système de valeurs des y , qui correspondront à un point du tore.

§ 4. — VARIÉTÉS OPPOSÉES.

Avec l'une comme avec l'autre définition, il y a lieu de faire une distinction, dont on comprendra plus tard l'importance.

Supposons d'abord une variété V définie de la première manière, c'est-à-dire par les relations

$$F_\alpha = 0, \quad \varphi_\beta > 0.$$

On tiendra compte de l'ordre dans lequel sont rangées les équations $F_\alpha = 0$; si deux de ces équations sont permutées, on conviendra de dire

Nous devons supposer que le déterminant fonctionnel Δ des y par rapport aux z ne s'annule pas, afin qu'à un système de valeurs des y corresponde un seul système de valeurs des z . Il sera donc toujours de même signe.

Nous conviendrons de dire que, si Δ est positif, les nouvelles équations représentent encore V et que si, Δ est négatif, elles représentent la variété opposée.

Voyons maintenant ce qui arrive lorsqu'on passe d'une définition à l'autre.

Soit une variété V définie par

$$F_1 = F_2 = \dots = F_p = 0,$$

et par certaines inégalités.

Adjoignons à ces p équations les suivantes

$$y_1 = F_{p+1}, \quad y_2 = F_{p+2}, \quad \dots, \quad y_{n-p} = F_n,$$

$F_{p+1}, F_{p+2}, \dots, F_n$ étant $n - p$ fonctions quelconques des x .

Nous avons vu que si le déterminant fonctionnel Δ des n fonctions $F_1, F_2, \dots, F_n$ n'est pas nul, on peut résoudre ces n équations par rapport aux x et qu'on trouve ainsi n équations

$$x_i = \theta_i(y_1, y_2, \dots, y_{n-p}),$$

qui représentent une variété à $n - p$ dimensions. Mais on peut se demander si elles représenteront V ou la variété opposée.

Nous conviendrons de dire qu'elles représentent V si Δ est positif et la variété opposée si Δ est négatif.

Considérons la variété à $n - p$ dimensions

$$F_\alpha = 0, \quad \dots, \quad \varphi_\beta > 0,$$

que j'appelle V . Nous avons vu que la variété à $n - p - 1$ dimen-

sions

$$F_\alpha = 0, \quad \varphi_\gamma = 0, \quad \varphi_\beta > 0, \quad (\beta \geq \gamma),$$

que j'appelle ν , fait partie de la frontière de V .

Mais il importe de ranger les équations qui définissent ν dans l'ordre suivant :

$$F_1 = 0, \quad F_2 = 0, \quad \dots, \quad F_p = 0, \quad \varphi_\gamma = 0,$$

car si deux d'entre elles étaient permutées, nous conviendrions de dire que ces équations ne représentent plus la frontière de V ou une partie de cette frontière, mais une variété opposée à cette frontière.

§ 3. — HOMOLOGIES.

Considérons une variété V à p dimensions; soit maintenant W une variété à q dimensions ($q \leq p$) faisant partie de V . Supposons que la frontière complète de W se compose de λ variétés continues à $q - 1$ dimensions

$$\nu_1, \quad \nu_2, \quad \dots, \quad \nu_\lambda.$$

Nous exprimerons ce fait par la notation

$$\nu_1 + \nu_2 + \dots + \nu_\lambda \sim 0.$$

Plus généralement la notation

$$k_1 \nu_1 + k_2 \nu_2 \sim k_3 \nu_3 + k_4 \nu_4,$$

où les k sont des entiers et les ν des variétés à $q - 1$ dimensions, signifiera qu'il existe une variété W à q dimensions faisant partie de V et dont la frontière complète se composera de k_1 variétés peu différentes de ν_1 , de k_2 variétés peu différentes de ν_2 , de k_3 variétés peu différentes de la va-

riété opposée à ν_3 et de k_4 variétés peu différentes de la variété opposée à ν_4 .

Les relations de cette forme pourront s'appeler des *homologies*.

Les homologies peuvent se combiner comme des équations ordinaires. Nous emploierons aussi la notation suivante ; supposons que l'on ait

$$k_1\nu_1 + k_2\nu_2 + \dots + k_p\nu_p \sim \omega_1 + \omega_2 + \dots + \omega_q,$$

et que les variétés $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_q$ fassent partie de la frontière de V ; nous écrirons quelquefois

$$k_1\nu_1 + k_2\nu_2 + k_p\nu_p \sim \varepsilon.$$

§ 6. — NOMBRES DE BETTI.

Nous dirons que les variétés

$$\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_\lambda,$$

d'un même nombre de dimensions et faisant partie de V , sont *linéairement indépendantes*, si elles ne sont liées par aucune homologie à coefficients entiers.

S'il existe $P_m - 1$ variétés *fermées* à m dimensions faisant partie de V et linéairement indépendantes et s'il n'en existe que $P_m - 1$, nous dirons que l'ordre de connexion de V par rapport aux variétés à m dimensions est égal à P_m .

Ainsi se trouvent définis, en ce qui concerne une variété V à m dimensions, $m - 1$ nombres que j'appellerai

$$P_1, P_2, \dots, P_{m-1},$$

et qui sont les ordres de connexion de V par rapport aux variétés de

$$1, 2, \dots, m - 1$$

dimensions.

Je les appellerai dans la suite les *nombres de Betti*.

Rendons ces définitions plus claires par un exemple :

Soit D un domaine faisant partie de l'espace ordinaire et limité par n surfaces fermées

$$S_1, S_2, \dots, S_n,$$

qui ne se coupent pas.

Ce domaine est une variété à trois dimensions. Il admet donc deux nombres de Betti P_1 et P_2 .

Cette variété est alors définie par les inégalités

$$\varphi_1 > 0, \quad \varphi_2 > 0, \quad \dots, \quad \varphi_n > 0,$$

si les équations des n surfaces S sont

$$\varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = 0, \quad \dots, \quad \varphi_n = 0.$$

Comme les surfaces ne se coupent pas, il n'y a pas de valeurs de x_1, x_2, x_3 qui satisfassent à la fois à deux de ces équations

$$\varphi_i = 0, \quad \varphi_k = 0.$$

Les surfaces $S_1, S_2, \dots, S_n$, ayant deux dimensions, n'auront qu'un seul nombre de Betti, qui sera l'ordre de connexion de Riemann; soient

$$2Q_1 + 1, \quad 2Q_2 + 1, \quad \dots, \quad 2Q_n + 1,$$

les ordres de connexion (qui sont impairs, puisque les surfaces sont fermées) des n surfaces

$$S_1, S_2, \dots, S_n,$$

on aura

$$P_2 = n, \quad P_1 = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n + 1.$$

Ainsi, pour la région intérieure à une sphère

$$P_2 = 1, \quad P_1 = 1;$$

pour la région comprise entre deux sphères

$$P_2 = 2, \quad P_1 = 1;$$

pour la région intérieure à un tore

$$P_2 = 1, \quad P_1 = 2,$$

pour la région comprise entre deux tores

$$P_2 = 2, \quad P_1 = 2.$$

§ 7. — EMPLOI DES INTÉGRALES.

Considérons une variété V que l'on puisse représenter par les inégalités et égalités (8), (9) et (10) de façon à satisfaire à toutes les conditions énoncées plus haut.

On sait alors ce que l'on doit entendre par l'intégrale multiple d'ordre m

$$\int F dy_1, dy_2, \dots, dy_m$$

étendue à la variété V ; je désigne, bien entendu, par F une fonction donnée des y . Il faut effectuer l'intégration successivement par rapport aux m variables y , et les limites d'intégration seront définies par les inégalités (9) et (10).

Cela posé, je vais définir l'intégrale suivante :

$$(11) \quad \int \sum X_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_m} dx_{\alpha_1} dx_{\alpha_2} \dots dx_{\alpha_m}.$$

Les différentielles $dx_{\alpha_1}, dx_{\alpha_2}, \dots, dx_{\alpha_m}$ sont m quelconques des n différentielles $dx_1, dx_2, \dots, dx_n$. Les fonctions $X_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_m}$ sont des fonctions données de $x_1, x_2, \dots, x_n$ et il y en a autant qu'il y a de combinaisons possibles des indices

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m,$$

c'est-à-dire qu'il y a de combinaisons de n lettres m à m . Il faut convenir que la fonction X est nulle si deux de ses indices sont égaux et qu'elle change de signe quand on permute deux de ses indices.

Cela posé, l'intégrale (11) sera, par définition, égale à l'intégrale d'ordre m

$$\int \sum X_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_m} \frac{\partial(x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, \dots, x_{\alpha_m})}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_m)} dy_1, dy_2, \dots, dy_m.$$

Si maintenant la variété V n'était pas susceptible d'être représentée par des relations de la forme (8), (9) et (10) satisfaisant à toutes les conditions énoncées, on décomposerait la variété V en variétés partielles assez petites pour être susceptibles de ce mode de représentation, et l'intégrale (11), étendue à la variété totale V , serait par définition la somme des intégrales (11) étendues aux diverses variétés partielles.

Cette définition laisse toutefois subsister encore une ambiguïté.

En effet, si l'on permute deux des lettres y_1 et y_2 , l'intégrale change de signe; il importe donc de se donner l'ordre de ces lettres et la permutation de deux de ces lettres équivaldrait à un changement du sens de l'intégration dans l'étude des intégrales simples. Je dirai donc le sens de l'intégration pour parler de l'ordre dans lequel on convient de ranger les lettres $y_1, y_2, \dots, y_m$.

J'ai eu l'occasion de m'occuper d'une question analogue dans un Mémoire *sur les résidus des intégrales doubles*, inséré au Tome IX des *Acta mathematica* et, en particulier, dans le § 3 de ce Mémoire intitulé : *Conditions d'intégrabilité*.

J'ai recherché dans quels cas ces *conditions d'intégrabilité* sont remplies, c'est-à-dire dans quels cas l'intégrale (11) est nulle toutes les fois qu'elle s'applique à une variété fermée.

Voici ce que j'ai trouvé; écrivons pour abrégier l'écriture

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$$

au lieu de $X_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m}$ et $[\alpha_p]$ au lieu de x_{α_p} .

Nos conditions d'intégrabilité s'écriront

$$(12) \left\{ \begin{array}{l} \frac{d(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)}{d[\alpha_{m+1}]} \pm \frac{d(\alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha_{m-1})}{d[\alpha_1]} \\ \pm \frac{d(\alpha_3, \alpha_4, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \alpha_1)}{d[\alpha_2]} \pm \dots \pm \frac{d(\alpha_{m+1}, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1})}{d[\alpha_m]} = 0. \end{array} \right.$$

Voici la loi suivant laquelle doivent être choisis les signes $\pm$. On prendra toujours le signe $+$ si m est pair, et alternativement le signe $+$ et le signe $-$ si m est impair.

Il y aura autant d'équations (12) qu'il y a de systèmes possibles d'indices

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1},$$

c'est-à-dire, puisque ces indices doivent être choisis parmi les lettres,

$$1, 2, \dots, n,$$

autant qu'il y a de combinaisons de n lettres $m+1$ à $m+1$.

Supposons maintenant que les conditions (12), au lieu d'être satisfaites pour toutes les valeurs possibles des n variables

$$x_1, x_2, \dots, x_n,$$

le soient seulement pour certaines valeurs de ces variables. Par exemple, considérons une variété V définie par les conditions

$$F_\alpha = 0, \quad \varphi_\beta > 0.$$

Soit ensuite un domaine D comprenant tous les points voisins de ceux de V et défini, par exemple, par les conditions

$$-\varepsilon < F_\alpha < \varepsilon, \quad \varphi_\beta > -\varepsilon,$$

ε étant un très petit nombre positif.

Supposons que les conditions (12) soient satisfaites pour tous les points du domaine D.

En répétant le raisonnement du Mémoire cité et en le modifiant convenablement, on démontrera ce qui suit : Soit une variété V' à $m + 1$ dimensions faisant partie de V (le nombre $m + 1$ doit donc être inférieur ou au plus égal au nombre des dimensions de V).

Supposons que la frontière complète de V' se compose des k variétés à m dimensions

$$W_1, W_2, \dots, W_k,$$

de sorte que $W_1 + W_2 + \dots + W_k \sim 0$.

Alors si l'intégrale (11) satisfait aux conditions (12) dans le domaine D, la somme algébrique des intégrales (11) étendue aux variétés $W_1, W_2, \dots, W_k$ est nulle. Il faut, bien entendu, pour chacune d'elles, faire attention au sens de l'intégration.

Les conditions (12) sont suffisantes pour qu'il en soit ainsi, mais elles ne sont pas nécessaires; ces conditions, nous l'avons vu, sont en nombre égal à celui des combinaisons de n lettres $m + 1$ à $m + 1$; il suffirait, pour que le résultat que je viens d'énoncer fût encore exact, que l'intégrale (11) satisfît pour tous les points de V à certaines conditions en nombre égal à celui des combinaisons de $n - p$ lettres $m + 1$ à $m + 1$, $n - p$ étant le nombre des dimensions de V .

Ces conditions seraient aisées à former, mais cela m'entraînerait trop loin de mon sujet.

Si alors une intégrale (11) satisfait aux conditions (12) dans le domaine D, les diverses valeurs que cette intégrale pourra prendre quand on l'étendra à diverses variétés fermées à m dimensions faisant partie de V seront des combinaisons linéaires à coefficients entiers d'un certain nombre d'entre elles que l'on pourra appeler les périodes de l'intégrale (11).

Le nombre maximum des périodes est égal à $P_m - 1$; car, si l'on considère P_m variétés fermées quelconques à m dimensions, il y aura toujours une variété à $m + 1$ dimensions qui admettra comme frontière complète

ces P_m variétés ou quelques-unes d'entre elles. Il y aura donc toujours entre les P_m intégrales correspondantes une relation linéaire à coefficients entiers. On pourrait d'ailleurs faire voir qu'il existe toujours des intégrales de la forme (11) pour lesquelles le nombre maximum des périodes est atteint. Cette manière de faire comprendre la définition des nombres de Betti a été employée par Betti lui-même pour le premier et le dernier de ces nombres, c'est-à-dire pour P_1 et P_{m-1} ; mais nous venons de voir qu'il est aisé de faire de même pour les autres nombres de Betti.

§ 8. — VARIÉTÉS UNILATÈRES ET BILATÈRES.

Considérons une variété V définie à la seconde manière, c'est-à-dire formée d'une chaîne ou d'un réseau de variétés partielles dont chacune est définie elle-même par des relations de la forme (8) et (9).

Soit v_1 une variété partielle définie par les conditions

$$x_i = \theta_i(y_1, y_2, \dots, y_m), \\ |y_k| < \beta_k.$$

Soit v_2 une autre variété partielle et définie par les conditions

$$x_i = \theta'_i(z_1, z_2, \dots, z_m), \\ |z_k| < \gamma_k.$$

Supposons que ces deux variétés aient une partie commune v' formant une variété continue. Je dis qu'à l'intérieur de cette variété le déterminant fonctionnel

$$\Delta = \frac{\partial(y_1, y_2, \dots, y_m)}{\partial(z_1, z_2, \dots, z_m)}$$

est toujours de même signe.

En effet, il ne pourrait changer de signe sans s'annuler ou sans deve-

nir infini. Or on a

$$\Delta = \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_m)}{\partial(z_1, z_2, \dots, z_m)} : \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_m)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_m)},$$

de sorte que Δ est lui-même le rapport de deux déterminants fonctionnels; comme ces deux déterminants fonctionnels sont essentiellement finis, Δ ne pourrait s'annuler que si l'on avait

$$\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_m)}{\partial(z_1, z_2, \dots, z_m)} = 0,$$

et comme rien ne distingue les m premières variables $x_1, x_2, \dots, x_m$ des $n - m$ autres $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$, il faudrait que le déterminant fonctionnel de m quelconque des x par rapport aux z fût nul.

Tous les déterminants fonctionnels des fonctions θ' devraient donc s'annuler à la fois, ce qui n'a jamais lieu par hypothèse. Δ ne peut donc s'annuler, et l'on verrait absolument de même qu'il ne peut pas non plus devenir infini.

Δ est donc toujours de même signe et nous pourrions choisir l'ordre des variables z de telle façon que ce signe soit toujours positif.

Une difficulté pourrait se présenter dans certains cas; supposons que la partie commune à ν_1 et à ν_2 , au lieu de se réduire à une seule variété continue ν' , se compose de plusieurs variétés continues ν', ν'', ν''' ; dans chacune d'elles, le signe de Δ demeurera constant, mais il pourra changer lorsque l'on passera de l'une à l'autre. Dans ce cas, nous dirons que la variété V est *unilatère*.

Supposons que cette circonstance ne se présente pas, et considérons une suite de variétés partielles formant une chaîne fermée

$$\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_q, \nu_1.$$

Soient

$$y_1^i, y_2^i, \dots, y_m^i$$

les m variables qui jouent le rôle de $y_1, y_2, \dots, y_m$ par rapport à ν_i .

Supposons que v_1 et v_2 aient une partie commune v'_1 , v_2 et v_3 une partie commune v'_2 , $\dots$, v_{q-1} et v_q une partie commune v'_{q-1} , et enfin v_q et v_1 une partie commune v'_q .

Soit Δ_i le déterminant fonctionnel de

$$x_1^{i+1}, x_2^{i+2}, \dots, x_m^{i+m}$$

par rapport à

$$x_1^i, x_2^i, \dots, x_m^i.$$

Ce déterminant sera défini à l'intérieur de v'_i .

Je définis de même à l'intérieur de v'_q le déterminant fonctionnel Δ_q de

$$x_1^1, x_2^1, \dots, x_m^1$$

par rapport à

$$x_1^q, x_2^q, \dots, x_m^q.$$

D'après ce que nous venons de voir, nous pouvons toujours choisir l'ordre des variables de telle façon que

$$\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_{q-1}$$

soient toujours positifs. D'autre part, Δ_q est toujours de même signe, mais ce signe constant est-il le signe $+$ ou le signe $-$?

Si c'est le signe $-$, je dirai encore que la variété V est *unilatère*. Je pourrai dire aussi que les variétés $v_1, v_2, \dots, v_q$ forment une chaîne unilatère.

Supposons maintenant que l'on ait construit un certain réseau continu de variétés partielles

$$(4) \quad v_1, v_2, \dots, v_q,$$

de telle sorte que tout point de V soit à l'intérieur (j'exclus la frontière) de l'une des variétés (4) ou de plusieurs d'entre elles. Si, dans la partie commune à deux quelconques des variétés (4), le déterminant Δ est positif, je dirai que la variété V est *bilatère*. Si elle ne l'était pas, il est clair

qu'on pourrait toujours, avec quelques-unes des variétés (4), former une chaîne unilatère et que la variété V serait unilatère. Je pourrai dire aussi que le réseau des variétés (4) forme un système bilatère.

Mais pour justifier complètement notre définition, il faut faire voir que V ne peut pas être à la fois unilatère et bilatère. Il est clair d'abord que, dans le système bilatère (4), on ne peut pas trouver de chaîne unilatère.

Mais il reste à montrer que le système (4) restera unilatère quand on y adjoindra une variété quelconque v_{q+1} faisant partie de V .

Soit v'_i la partie commune à v_i et à v_{q+1} ; tout point de v_{q+1} appartiendra au moins à l'une des variétés v'_i , et comme v_{q+1} est continu, si je considère deux points M_i et M_k de v_{q+1} appartenant respectivement à v'_i et à v'_k , on pourra trouver des variétés intermédiaires que je pourrai appeler (puisque le numérotage reste arbitraire) :

$$v'_1, v'_2, \dots, v'_k,$$

et qui formeront une chaîne.

Je pourrai toujours choisir l'ordre des variables analogues aux y qui définissent la variété v_{q+1} , de telle façon que, dans v'_1 , le déterminant analogue à Δ et relatif à v_i et v_{q+1} soit positif; je l'appellerai Δ_i .

Appelons de même Δ_i le déterminant analogue à Δ et relatif à v_i et v_{q+1} ; Δ_i est défini à l'intérieur de v'_i .

Soit ensuite Δ' le déterminant relatif à v_i et v_2 ; il sera défini dans toute la partie commune à ces deux variétés et, en particulier, dans la partie commune à v'_1 et v'_2 ; il sera positif puisque le système (4) est bilatère.

Alors, dans la partie commune à v'_1 et v'_2 , Δ_i et Δ' seront positifs, il en résulte que leur rapport

$$\Delta_2 = \frac{\Delta_i}{\Delta'}$$

est positif, et comme il conserve toujours le même signe, il sera positif pour tous les points de v'_2 .

On démontrerait de proche en proche que $\Delta_3, \dots, \Delta_k$ sont également positifs.

Le système restera donc bilatère après l'adjonction de v_{q+1} ; il le restera encore si, dans l'expression des équations d'une des variétés v_i , on remplace les variables $y_1, y_2, \dots, y_m$ par des fonctions holomorphes de variables nouvelles $y'_1, y'_2, \dots, y'_m$ dont le déterminant fonctionnel ne s'annule jamais (ce qui est nécessaire si l'on veut qu'à un système de valeurs des y corresponde un seul système de valeurs des y'). Il faut, bien entendu, choisir l'ordre des nouvelles variables y' de telle façon que ce déterminant fonctionnel soit positif.

Le système restant toujours bilatère, on n'y pourra construire de chaîne unilatère, de sorte qu'une variété ne peut pas être à la fois bilatère et unilatère.

C. Q. F. D.

Tout le monde connaît l'exemple de surface unilatère que l'on obtient en pliant un rectangle de papier ABCD (dont les côtés opposés sont AB et CD d'une part, BC et DA d'autre part), et en collant ensuite ensemble les côtés AB et CD de façon que A soit collé avec C et B avec D.

Les exemples de variétés bilatères sont plus aisés encore à former. Ainsi dans l'espace à n dimensions :

- 1° Tout domaine à n dimensions est bilatère;
- 2° Toute courbe à 1 dimension est bilatère;
- 3° Toute surface *fermée* à $n - 1$ dimensions est bilatère.

Mais on peut aller plus loin.

Considérons une variété V définie à la première manière, c'est-à-dire par des égalités et des inégalités de la forme (1). Je dis qu'elle sera toujours bilatère.

Soient, en effet,

$$F_1 = F_2 = \dots = F_p = 0$$

les p égalités qui, avec quelques inégalités que nous n'écrirons pas, définissent V . Partageons V en un certain nombre de variétés partielles v , définies par des relations de la forme (8) et (9). Soient

$$v_1, v_2, \dots, v_q, v_i$$

un certain nombre de variétés partielles formant une chaîne continue, c'est-à-dire telles que chacune d'elles ait avec la suivante une partie commune. Je dis que cette chaîne est toujours bilatère.

En effet, nous avons supposé plus haut que les déterminants fonctionnels des p fonctions F par rapport à p quelconques des variables x ne s'annulent jamais tous à la fois. Je puis donc supposer que les variétés v sont assez petites pour que, à l'intérieur de v_1 , l'un des déterminants fonctionnels (que j'appellerai Δ_1) ne s'annule pas; pour que, à l'intérieur de v_2 , un autre de ces déterminants (que j'appellerai Δ_2) ne s'annule pas, et ainsi de suite.

S'il n'en était pas ainsi, on n'aurait qu'à subdiviser chacune des variétés v en variétés plus petites.

Soit, par exemple,

$$\begin{aligned}\Delta_1 &= \frac{\partial(F_1, F_2, \dots, F_p)}{\partial(x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, \dots, x_{\alpha_p})}, \\ \Delta_2 &= \frac{\partial(F_1, F_2, \dots, F_p)}{\partial(x_{\beta_1}, x_{\beta_2}, \dots, x_{\beta_p})}, \\ &\dots\dots\dots\end{aligned}$$

Comme l'ordre des lettres $x_{\alpha_1}, x_{\alpha_2}, \dots, x_{\alpha_p}$ reste arbitraire et que Δ_1 conserve le même signe à l'intérieur de v_1 , je pourrai toujours supposer que Δ_1 est positif à l'intérieur de v_1 . De même Δ_2 sera positif à l'intérieur de v_2 ; et ainsi de suite.

Posons alors à l'intérieur de v_1

$$(13) \quad \begin{cases} F_1 = 0, & F_2 = 0, & \dots, & F_p = 0, \\ y_1^1 = x_{\alpha_1}', & y_2^1 = x_{\alpha_2}', & \dots, & y_m^1 = x_{\alpha_m}'. \end{cases}$$

Ici $m = n - p$; les variables x_{α_i}' sont les $m = n - p$ variables x qui restent quand on a supprimé les p variables x_{α_i} .

Posons de même à l'intérieur de v_2

$$(14) \quad \begin{cases} F_1 = 0, & F_2 = 0, & \dots, & F_p = 0, \\ y_1^2 = x_{\beta_1}', & y_2^2 = x_{\beta_2}', & \dots, & y_m^2 = x_{\beta_m}'. \end{cases}$$

Les variables x'_{β_i} sont les $m = n - p$ variables x qui restent quand on a supprimé les p variables x_{β_i} .

Et ainsi de suite.

Je supposerai que l'ordre des variables x'_{α_i} ait été choisi de telle sorte que l'on puisse passer de l'ordre normal des variables x , c'est-à-dire de l'ordre

$$x_1, \quad x_2, \quad \dots, \quad x_n$$

à l'ordre

$$x_{\alpha_1}, \quad x_{\alpha_2}, \quad \dots, \quad x_{\alpha_p}, \quad x'_{\alpha_1}, \quad x'_{\alpha_2}, \quad \dots, \quad x'_{\alpha_m},$$

par une substitution du groupe alterné.

Alors, en résolvant les équations (13), on verrait qu'à l'intérieur de v_i les x sont des fonctions holomorphes de

$$y_1^i, \quad y_2^i, \quad \dots, \quad y_m^i$$

et ainsi de suite. En général, à l'intérieur de v_i , les x seront des fonctions holomorphes de

$$y_1^i, \quad y_2^i, \quad \dots, \quad y_m^i.$$

Il s'agit alors de calculer le déterminant

$$\frac{\partial(y_1^2, y_2^2, \dots, y_m^2)}{\partial(y_1^1, y_2^1, \dots, y_m^1)},$$

ou, pour abréger,

$$\frac{\partial y_i^2}{\partial y_i^1}$$

à l'intérieur de la partie commune à v_i et à v_2 .

Pour cela, remplaçons les équations (13) et (14) par les équations plus générales

$$(13 \text{ bis}) \quad \left\{ \begin{array}{l} F_1 = \lambda_1, \quad F_2 = \lambda_2, \quad \dots, \quad F_p = \lambda_p, \\ y_i^1 = x'_{\alpha_i} \end{array} \right.$$

et

$$(14 \text{ bis}) \quad F_k = \lambda_k, \quad y_i^2 = x_{\beta_i}'.$$

Nous ferons ensuite $\lambda_k = 0$.

Réolvons les équations (13 bis), nous aurons les x en fonctions des λ_k et des y_i^1 holomorphes à l'intérieur de v_1 et le déterminant fonctionnel de

$$x_1, \quad x_2, \quad \dots, \quad x_n$$

par rapport à

$$\lambda_1, \quad \lambda_2, \quad \dots, \quad \lambda_p, \quad y_i^1, \quad y_i^2, \quad \dots, \quad y_i^m$$

sera évidemment

$$\frac{1}{\Delta_1}.$$

Réolvons de même les équations (14 bis), nous aurons les x en fonctions des λ_k et des y_i^2 , holomorphes à l'intérieur de v_2 et le déterminant fonctionnel sera $\frac{1}{\Delta_2}$.

Il viendra alors, pour les points communs à v_1 et à v_2 ,

$$\frac{\partial y_i^2}{\partial y_i^1} = \frac{\partial(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p, y_1^2, y_2^2, \dots, y_m^2)}{\partial(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p, y_1^1, y_2^1, \dots, y_m^1)} = \frac{\Delta_1}{\Delta_2}.$$

Il ne reste plus ensuite qu'à faire $\lambda_k = 0$ dans les expressions des x .

On trouverait de même, dans la partie commune à v_h et v_{h+1} ,

$$\frac{\partial y_i^{h+1}}{\partial y_i^h} = \frac{\Delta_h}{\Delta_{h+1}},$$

et dans la partie commune à v_q et à v_1

$$\frac{\partial y_i^1}{\partial y_i^q} = \frac{\Delta_q}{\Delta_1}.$$

Nous avons vu plus haut que l'on peut toujours supposer que Δ_i est,

à l'intérieur de ν , positif. Tous ces rapports sont donc positifs et la chaîne est bilatère.

C. Q. F. D.

Toutes les variétés qui rentrent dans la première définition sont donc bilatères et, comme j'ai cité plus haut un exemple de variété unilatère satisfaisant à la deuxième définition, nous devons conclure que les variétés qui satisfont à la deuxième définition ne satisfont pas toutes à la première. C'est ce que j'avais annoncé plus haut.

Toute variété unilatère est par définition *opposée à elle-même*.

§ 9. — INTERSECTION DE DEUX VARIÉTÉS.

Soient V et V' deux variétés définies à la seconde manière, ayant l'une p dimensions, l'autre $n - p$ dimensions, et soient M_0 et M'_0 deux points appartenant respectivement à V et à V' et ayant respectivement pour coordonnées

$$x_1^0, \quad x_2^0, \quad \dots, \quad x_n^0$$

et

$$x_1'^0, \quad x_2'^0, \quad \dots, \quad x_n'^0.$$

Autour du point M_0 , construisons sur V une variété partielle ν , analogue à celles que nous avons envisagées dans le n° 3, de telle façon qu'en un point $x_1, x_2, \dots, x_n$ de ν on ait

$$x_i = \theta_i(y_1, y_2, \dots, y_p) \quad (i = 1, 2, n).$$

De même autour de M'_0 , construisons sur V' une variété ν' telle qu'en un point $x'_1, x'_2, \dots, x'_n$ de ν' on ait

$$x'_i = \theta'_i(y'_1, y'_2, \dots, y'_{n-p}) \quad (i = 1, 2, n).$$

Envisageons le déterminant

$$\begin{vmatrix} \frac{dx_1}{dy_1} & \frac{dx_2}{dy_1} & \dots & \frac{dx_n}{dy_1} \\ \frac{dx_1}{dy_2} & \frac{dx_2}{dy_2} & \dots & \frac{dx_n}{dy_2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{dx_1}{dy_p} & \frac{dx_2}{dy_p} & \dots & \frac{dx_n}{dy_p} \\ \frac{dx'_1}{dy'_1} & \frac{dx'_2}{dy'_1} & \dots & \frac{dx'_n}{dy'_1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{dx'_1}{dy'_{n-p}} & \frac{dx'_2}{dy'_{n-p}} & \dots & \frac{dx'_n}{dy'_{n-p}} \end{vmatrix}.$$

C'est une fonction de $y_1, y_2, \dots, y_p, y'_1, y'_2, \dots, y'_{n-p}$; cette fonction dépendra donc de la position des points M et M' de coordonnées $x_1, x_2, \dots, x_n$ et $x'_1, x'_2, \dots, x'_n$ sur les variétés v et v' . Je l'appellerai donc

$$f(M, M').$$

Je puis changer de variables en remplaçant $y_1, y_2, \dots, y_p$ par des fonctions holomorphes de p variables nouvelles $z_1, z_2, \dots, z_p$ choisies de telle sorte qu'à un système de valeurs de y corresponde un seul système de valeurs des z . Il faut pour cela que le déterminant fonctionnel des y par rapport aux z ne s'annule pas et je puis toujours supposer, en rangeant les z dans un ordre convenable, que ce déterminant est positif.

La fonction $f(M, M')$ est alors multipliée par ce déterminant fonctionnel et, par conséquent, conserve son signe.

Il en est encore de même quand on fait un changement de variables analogues sur la variété v' .

Considérons maintenant une autre variété v_1 , analogue à v , construite sur V , et une variété v'_1 , analogue à v' , construite sur V' .

Soit M_1 un point de v_1 et M'_1 un point de v'_1 . Nous pourrions construire une fonction analogue à $f(M, M')$ et que j'appellerai $f_1(M_1, M'_1)$.

Supposons maintenant que les variétés ν_i et ν (de même que les variétés ν'_i et ν') aient une partie commune, et que les points M et M_i se confondent, de même que les points M' et M'_i .

Comparons les deux fonctions

$$f(M, M'), \quad f_i(M, M').$$

Supposons que les deux variétés V et V' soient bilatères. Nous pourrions supposer alors (en choisissant convenablement l'ordre des variables y relatives à ν_i), que le déterminant analogue à celui que nous avons appelé Δ dans le n° 8, et relatif à ν et ν_i , est positif dans la partie commune à ν et ν_i , de même le déterminant analogue à Δ et relatif à ν' et ν'_i sera également positif.

Alors f et f_i seront de même signe.

Soit alors

$$S(M, M')$$

une fonction qui sera égale à $+1$, à -1 ou à 0 , selon que $f(M, M')$ sera positif, négatif ou nul. Cette fonction sera alors parfaitement déterminée, elle ne dépendra que de la position des points M et M' sur V et V' ; elle ne dépendra pas de la manière dont les variétés ν et ν' auront été construites autour de M et de M' .

Cela ne serait plus vrai si l'une des variétés V et V' était unilatère, ce que je ne suppose pas.

Supposons, en particulier, que les points M et M' se confondent et, par conséquent, que le point M soit un point d'intersection de V et de V' , la considération de la fonction $S(M, M')$ présente alors un grand intérêt.

Supposons que l'on forme la fonction $S(M, M)$ pour tous les points d'intersection M de V et de V' , et faisons la somme de toutes les fonctions S ainsi obtenues; je désignerai cette somme par

$$N(V, V').$$

Cette définition de $N(V, V')$ s'applique quand les variétés V et V' ont été définies comme au n° 5. Mais on peut la simplifier quand V et V' ont été définies comme au n° 1.

Soient alors

$$F_{\alpha} = 0, \quad \varphi_{\beta} > 0 \quad (\alpha = 1, 2, \dots, p; \beta = 1, 2, \dots, q)$$

les conditions qui définissent V , et soient

$$F'_{\gamma} = 0, \quad \varphi'_{\delta} > 0 \quad (\gamma = 1, 2, \dots, n-p; \delta = 1, 2, \dots, q'),$$

celles qui définissent V' . V aura $n-p$ dimensions et V' en aura p .

Considérons un point M de V ayant pour coordonnées $x_1, x_2, \dots, x_n$ et un point M' de V' ayant pour coordonnées $x'_1, x'_2, \dots, x'_n$ et formons le déterminant

$$\begin{vmatrix} \frac{dF_1}{dx_1} & \frac{dF_2}{dx_1} & \dots & \frac{dF_p}{dx_1} & \frac{dF'_1}{dx'_1} & \frac{dF'_2}{dx'_1} & \dots & \frac{dF'_{n-p}}{dx'_1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{dF_1}{dx_n} & \frac{dF_2}{dx_n} & \dots & \frac{dF_p}{dx_n} & \frac{dF'_1}{dx'_n} & \frac{dF'_2}{dx'_n} & \dots & \frac{dF'_{n-p}}{dx'_n} \end{vmatrix}$$

que j'appellerai $\psi(M, M')$. Quelle relation y a-t-il entre $\psi(M, M')$ et $S(M, M')$?

Pour nous en rendre compte, posons

$$x'_i = x_i + h_i \quad (i = 1, 2, \dots, n);$$

faisons ensuite varier à la fois les x'_i et les x_i , mais de telle façon que leur différence h_i demeure constante.

Posons

$$F_{\alpha}(x_i) = y_{\alpha},$$

$$F'_{\gamma}(x_i + h_i) = y'_{\gamma}.$$

Si le déterminant $\psi(M, M')$ n'est pas nul, nous pourrions résoudre ces

équations par rapport aux x_i et nous en tirerons

$$x_i = \theta_i(y_\alpha, y'_\gamma).$$

Le déterminant fonctionnel des θ_i par rapport aux y_α et aux y'_γ sera alors $\frac{1}{\psi(M, M')}$.

Si nous faisons $y_\alpha = 0$, nous aurons

$$x_i = \theta_i(0, y'_\gamma);$$

ce sera là l'équation d'une variété à $n - p$ dimensions qui fera partie de V ; de même en faisant

$$x'_i = h_i + \theta_i(y_\alpha, 0),$$

on aura l'équation d'une variété à p dimensions qui fera partie de V' .

Si l'on définit de la sorte les variétés v et v' du commencement de ce numéro, on voit que le déterminant fonctionnel des θ_i n'est autre chose que $f(M, M')$, d'où

$$f(M, M') \psi(M, M') = 1.$$

Supposons maintenant que les deux variétés V et V' fassent toutes deux parties d'une variété W d'un plus grand nombre de dimensions. Soient, par exemple,

$$(1) \quad F_\alpha = 0, \quad \varphi_\beta > 0 \quad (\alpha = 1, 2, \dots, p; \beta = 1, 2, \dots, q)$$

les relations qui définissent W qui aura ainsi $n - p$ dimensions.

Soient

$$(2) \quad F'_\gamma = 0, \quad \varphi'_\delta > 0 \quad (\gamma = 1, 2, \dots, p; \delta = 1, 2, \dots, q')$$

les relations qui jointes à (1) définissent V qui aura ainsi $n - p - p'$ dimensions.

Soient enfin

$$(3) \quad F''_\varepsilon = 0, \quad \varphi''_\zeta > 0 \quad (\varepsilon = 1, 2, \dots, p''; \zeta = 1, 2, \dots, q'')$$

les relations qui jointes à (1) définiront V' qui aura ainsi $n - p - p''$ dimensions. Je suppose $p + p' + p'' = n$.

Soit M un point d'intersection de V et de V' .

Je formerai le déterminant fonctionnel des F_α , des F'_γ et des F''_ϵ par rapport aux x , et ce sera ce déterminant que j'appellerai $\psi(M)$.

Alors $S(M)$ sera par définition égal à $+1$ ou à -1 , selon que $\psi(M)$ sera positif ou négatif.

Je désignerai ensuite par

$$N(V, V')$$

la somme de toutes les quantités $S(M)$ relatives à tous les points d'intersection de V et de V' .

Il est clair que, si l'une des variétés V ou V' est remplacée par la variété opposée, l'expression $N(V, V')$ change de signe.

Soit maintenant V une variété fermée à 1 dimension et soit W un domaine à n dimensions dont la frontière complète se compose des variétés à $n - 1$ dimensions

$$V_1, \quad V_2, \quad \dots, \quad V_k,$$

de telle sorte que

$$V_1 + V_2 + \dots + V_k \simeq 0.$$

Je dis que

$$N(V, V_1) + N(V, V_2) + \dots + N(V, V_k) = 0.$$

En effet, la variété V va se composer d'un certain nombre de variétés continues à 1 dimension, c'est-à-dire d'un certain nombre de lignes fermées. Les équations d'une de ces lignes pourront se mettre sous la forme

$$x_i = \theta_i(t),$$

t étant une variable que nous ferons croître de $-\infty$ à $+\infty$.

Comme la ligne est fermée, nous aurons

$$\theta_i(-\infty) = \theta_i(+\infty).$$

Envisageons maintenant un point M d'intersection d'une de ces lignes avec la frontière de W ; si, quand on fait croître t , cette ligne passe de l'intérieur de W à l'extérieur, on aura

$$S(M) = 1.$$

Si elle passe de l'extérieur à l'intérieur $S(M)$ sera égal à -1 . Mais la ligne étant fermée reviendra à son point de départ, de sorte que la somme de tous les $S(M)$ devra être nulle. C. Q. F. D.

Supposons maintenant que toutes les variétés que nous envisageons et, par exemple, $V, W, V_1, V_2, \dots, V_k$ fassent partie d'une variété U et que ce soit cette variété U dont nous étudions les ordres de connexion et par rapport à laquelle nous prenons les homologies.

(Voici ce que je veux dire; quand, au n° 3, j'ai défini les homologies, il y avait une certaine variété V qui jouait dans cette définition un rôle important; eh bien, c'est ici U qui jouera ce rôle.)

Je suppose que U ait h dimensions, V une dimension, W h dimensions, $V_1, V_2, \dots, V_k$ $h-1$ dimensions.

Il n'y a rien à changer à ce qui précède et l'on voit que, si V est fermé et à une dimension et que

$$V_1 + V_2 + \dots + V_k \sim 0,$$

on aura

$$N(V, V_1) + N(V, V_2) + \dots + N(V, V_k) = 0.$$

Je dis que cela sera encore vrai si la variété à une dimension V n'est plus fermée, mais a ses deux extrémités sur la frontière de U et si W n'a aucun point sur la frontière de U .

En effet, U se trouve partagé en deux régions continues ou non, à savoir : W et la région R extérieure à W . Par hypothèse, la frontière de U appartient tout entière à R .

La ligne V n'étant pas fermée, le point initial correspondant à $t = -\infty$ ne coïncidera plus avec le point final correspondant à $t = +\infty$; mais,

par hypothèse, ces deux points appartiennent tous deux à la frontière de U et, par conséquent, à R .

Notre ligne passera donc précisément autant de fois de R dans W que de W dans R ; donc la somme des $S(M)$ est nulle. C. Q. F. D.

Je vais maintenant établir la réciproque.

Soient $V_1, V_2, \dots, V_k$, k variétés fermées à $h - 1$ dimensions situées dans U , U n'ayant aucun point commun avec la frontière de V_i . Supposons que l'on n'ait pas

$$V_1 + V_2 + \dots + V_k \simeq 0,$$

je dis que l'on pourra toujours trouver une ligne V , située dans U , qui sera fermée, on aura ses deux extrémités sur la frontière de U et qui sera telle que

$$N(V, V_1) + N(V, V_2) + \dots + N(V, V_k) \geq 0.$$

En effet, ou bien les variétés $V_1, V_2, \dots, V_k$ ne partageront pas U en plusieurs régions distinctes. Alors on pourra aller d'un point quelconque de U à un autre point quelconque de U sans rencontrer aucune des variétés V_i .

Considérons alors une ligne très petite rencontrant V_1 en un point M et ne rencontrant aucune autre des variétés V_i ; nous pourrions joindre les deux extrémités de cette ligne par une autre ligne continue qui ne rencontrera aucune des variétés V_i ; nous aurons construit ainsi une ligne fermée qui ne rencontrera les variétés V_i qu'en un seul point. La somme des $S(M)$ ne pourra donc être nulle.

Supposons maintenant que les variétés V_i partagent U en plusieurs régions R ; mais cependant qu'elles soient linéairement indépendantes. Dans ce cas, la frontière complète d'aucune des régions R ne pourra être constituée par une partie des variétés V_i , sans quoi il y aurait entre ces variétés une homologie, ce que nous ne supposons pas.

La frontière complète de R se composera donc de quelques-unes des

variétés V_i et d'une partie de la frontière de U . Il en résulte que d'un point quelconque de R on pourra aller à la frontière de U sans sortir de R et sans rencontrer aucune des variétés V_i .

Considérons alors une des variétés V_i, V_j , par exemple, et envisageons une petite ligne coupant V_i en un point M ; soient R et R' les régions auxquelles appartiennent les deux extrémités μ et μ' de cette petite ligne. De μ on pourra aller par une ligne continue à la frontière de U sans sortir de R ; de μ' on pourra aller par une troisième ligne continue à la frontière de U sans sortir de R' .

L'ensemble de ces trois lignes continues ira de la frontière de U à la frontière de U , et si je l'appelle V , on aura

$$N(V, V_i) = 1, \quad N(V, V_j) = 0 \quad (i > j).$$

On peut donc choisir V de telle façon que tous les $N(V, V_i)$ soient nuls, excepté un d'entre eux qui sera égal à 1.

Supposons enfin qu'il y ait entre les V_i un certain nombre d'homologies, 3, par exemple,

$$(\alpha) \quad \Sigma k_i V_i \sim \Sigma k'_i V_i \sim \Sigma k''_i V_i \sim 0.$$

Nous pourrions alors, parmi les k variétés V_i , en trouver $k - 3$ qui soient linéairement indépendantes; soit, par exemple, $V_1, V_2, \dots, V_{k-3}$.

Nous pouvons choisir V de telle façon que tous les $N(V, V_i)$, où $i = 1, 2, \dots, k - 3$, soient nuls à l'exception de l'un quelconque d'entre eux qui sera égal à 1. Les valeurs de

$$N(V, V_{k-2}), \quad N(V, V_{k-1}), \quad N(V, V_k)$$

s'en déduiront à l'aide des relations

$$(\beta) \quad \Sigma k_i N(V, V_i) = \Sigma k'_i N(V, V_i) = \Sigma k''_i N(V, V_i) = 0$$

qui sont une conséquence nécessaire de nos homologies (α) .

Il ne peut pas arriver alors que l'on ait

$$(\gamma) \quad \Sigma N(V, V_i) = 0,$$

quelle que soit celle des $k - 3$ quantités

$$N(V, V_i) \quad (i = 1, 2, \dots, k - 3)$$

qui soit égale à 1. Cela ne pourrait se faire, en effet, que si l'équation (γ) était une conséquence nécessaire des équations β ; mais alors l'homologie

$$(\delta) \quad \Sigma V_i \sim 0$$

serait une conséquence nécessaire des homologies (α) . Or nous avons supposé au début que cette homologie (δ) n'avait pas lieu.

On pourra donc toujours choisir V de manière que l'égalité γ n'ait pas lieu.

C. Q. F. D.

Nous désignerons sous le nom de *coupure* toute variété contenue dans U : 1° si elle est fermée; 2° si elle n'est pas fermée, mais si sa frontière fait partie de la frontière complète de U .

Nous pouvons alors énoncer le théorème suivant qui résume la discussion précédente :

La condition nécessaire et suffisante (si les variétés V_i sont fermées et à $h - 1$ dimensions) pour que l'on puisse choisir la coupure V de telle sorte que l'égalité

$$\Sigma k_i N(V, V_i) = 0$$

n'ait pas lieu, c'est que l'homologie

$$\Sigma k_i V_i \sim 0$$

n'ait pas lieu.

Cherchons maintenant à étendre ce théorème au cas où V a p dimensions et où $V_1, V_2, \dots, V_k$ en ont $h - p$.

Soient

$$F_\alpha = 0, \quad \varphi_\beta > 0 \quad (\alpha = 1, 2, \dots, n - h)$$

les équations de U ; soient

$$F_\alpha = 0, \quad F'_\gamma = 0, \quad \varphi_\beta > 0 \quad (\gamma = 1, 2, \dots, h - p)$$

celles de V .

Quant à $V_1, V_2, \dots, V_k$ nous les définirons de la manière suivante. Nous pourrions toujours trouver $p - 1$ équations

$$\Phi_1 = \Phi_2 = \dots = \Phi_{p-1} = 0$$

auxquelles satisfont tous les points de $V_1, V_2, \dots, V_k$; c'est ainsi que si $h = 3, p = 2$, si U est l'espace ordinaire et si $V_1, V_2, \dots, V_k$ sont des courbes, on pourra toujours, par ces courbes, quelles qu'elles soient, faire passer une surface.

Pour définir V_i nous y adjoindrons une $p^{\text{ième}}$ égalité

$$F''_i = 0.$$

Soit alors U' la variété à $h - p + 1$ dimensions

$$F_\alpha = 0, \quad \Phi_v = 0, \quad \varphi_\beta > 0,$$

et V' la variété à 1 dimension

$$F_\alpha = F'_\gamma = \Phi_v = 0, \quad \varphi_\beta > 0.$$

On aura d'abord

$$N(V', V_i) = N(V, V_i).$$

D'autre part, si l'homologie

$$\sum k_i V_i \sim 0$$

a lieu par rapport à U' , elle aura lieu par rapport à U . Il est vrai que la réciproque n'est pas vraie et que cette homologie peut avoir lieu par rapport à U sans avoir lieu par rapport à U' ; mais, si elle a lieu par rapport à U , on pourra toujours, en choisissant convenablement les fonctions Φ , trouver une variété U' à $h - p + 1$ dimensions par rapport à laquelle elle ait lieu.

Nous devons donc conclure que le théorème est encore vrai quand V a plus d'une dimension.

Si donc V_1 et V_2 sont deux variétés fermées à $h - p$ dimensions, si pour toutes les coupures V à p dimensions, on a

$$N(V, V_1) = N(V, V_2),$$

on aura aussi

$$V_1 \sim V_2$$

et inversement.

Bornons-nous au cas où U est fermée. Alors U n'a pas de frontière et toutes les coupures sont fermées.

Le nombre des coupures de p dimensions linéairement indépendantes est $P_p - 1$.

Soient

$$C_1, C_2, \dots, C_\lambda \quad (\lambda = P_p - 1)$$

ces coupures.

Soient ensuite

$$V_i \quad (i = 1, 2, \dots, \mu)$$

μ variétés fermées à $h - p$ dimensions.

La condition nécessaire et suffisante pour que l'on ait entre elles une homologie

$$\sum k_i V_i \sim 0,$$

c'est que l'on ait :

$$\sum k_i N(C_1, V_i) = \sum k_i N(C_2, V_i) = \dots = \sum k_i N(C_\lambda, V_i) = 0.$$

Or, si le nombre μ des V_i est supérieur à λ , on pourra toujours trouver des entiers k_i satisfaisant à ces conditions, puisque nous aurons μ arbitraires k_i et λ conditions à remplir. Si donc les V_i sont linéairement indépendantes, on aura

$$\mu \leq \lambda.$$

Donc

$$P_{h-p} \leq P_p;$$

mais, en changeant p en $h - p$, on trouve,

$$P_p \leq P_{h-p}.$$

Donc

$$P_p = P_{h-p}.$$

Par conséquent, pour une variété fermée, les nombres de Betti également distants des extrêmes sont égaux.

Ce théorème n'a, je crois, jamais été énoncé; il était cependant connu de plusieurs personnes qui en ont même fait des applications.

Voyons maintenant ce qui se passe quand h est pair pour le nombre moyen $P_{\frac{h}{2}}$. Supposons que h soit multiple de $4 + 2$, de telle façon que $\frac{h}{2}$ soit impair.

On sait que, quand, dans un déterminant, on fait un nombre impair de permutations de lignes, il change de signe. Quand on permutera V et V_1 , qui ont $\frac{h}{2}$ dimensions, le déterminant $f(M, M)$ changera de signe; on aura donc

$$N(V, V_1) = -N(V_1, V);$$

on en déduit

$$N(V, V) = 0.$$

Le symbole $N(V, V)$ n'a, par lui-même, aucun sens, puisque, les deux variétés V et V coïncidant, le nombre des points d'intersection est infini;

il faut donc précisément la définition; nous poserons donc

$$N(V, V) = N(V, V'),$$

où

$$V \sim V'.$$

Cela posé, je dis que $P_{\frac{h}{2}}$ est impair. Supposons, en effet, qu'il soit pair et soient

$$V_1, \quad V_2, \quad \dots, \quad V_\mu$$

les μ variétés linéairement indépendantes à $h - 1$ dimensions où

$$\mu = P_{\frac{h}{2}} - 1$$

est impair.

Formons le déterminant où le $i^{\text{ème}}$ terme de la $k^{\text{ème}}$ colonne est $N(V_i, V_k)$. Ce déterminant serait gauche; c'est-à-dire que les termes de la diagonale principale seraient nuls et que deux termes symétriques par rapport à cette diagonale seraient égaux et de signe contraire. Comme le nombre des colonnes serait impair, ce déterminant serait nul. Il en résulterait, contrairement à l'hypothèse, que les variétés $V_1, V_2, \dots, V_\mu$ ne seraient pas linéairement indépendantes.

Donc $P_{\frac{h}{2}}$ est impair.

Cela ne serait plus vrai ni si h était multiple de 4, ni si la variété U était unilatère; car tous nos raisonnements supposent les variétés bilatères. Nous en verrons plus loin des exemples.

§ 10. — REPRÉSENTATION GÉOMÉTRIQUE.

Il y a une manière de se représenter les variétés à trois dimensions situées dans l'espace à quatre dimensions, manière qui en facilite singulièrement l'étude.

Considérons, dans l'espace ordinaire, un certain nombre de po-

lyèdres

$$P_1, P_2, \dots, P_n.$$

Nous pouvons supposer qu'il existe, dans l'espace à quatre dimensions, un certain nombre de variétés à trois dimensions

$$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$$

respectivement homéomorphes à $P_1, P_2, \dots, P_n$.

Soient F_1 une face du polyèdre P_1 et Φ_1 l'ensemble des points de la frontière de Q_1 qui correspondent aux divers points de F_1 . Soient de même F_2 une face de P_2 et Φ_2 l'*image* de cette face sur la frontière de Q_2 .

Il peut se faire que Φ_1 coïncide avec Φ_2 . Dans ce cas les deux variétés Q_1 et Q_2 sont contiguës, et l'on passe de l'intérieur de l'une à l'intérieur de l'autre en franchissant Φ_1 .

Dans ce cas, nous dirons que les faces F_1 et F_2 sont *conjuguées*.

Il pourra arriver que les faces F_1 et F_2 appartiennent à un *même* polyèdre P_1 . Alors la variété à deux dimensions Φ_1 , qui ne diffère pas de la variété à deux dimensions Φ_2 , séparera l'une de l'autre deux portions de la variété Q_1 .

On le comprendra mieux si je compare avec un exemple se passant dans l'espace ordinaire. Considérons un rectangle ABCD et un tore, sur lequel nous tracerons deux coupures, à savoir : une circonférence méridienne et un parallèle; soit H le point d'intersection de ce parallèle et de ce méridien. La surface du tore ainsi découpée sera homéomorphe au rectangle; les deux lèvres de la coupure formée par le méridien correspondront aux deux côtés AB et CD du rectangle; les deux lèvres de la coupure formée par le parallèle correspondront aux deux autres côtés AD et BC. On voit l'analogie avec ce qui précède : le rectangle correspond au polyèdre P_1 , le tore découpé à la variété Q_1 , les côtés AB et CD aux deux faces F_1 et F_2 , les deux lèvres de la coupure méridienne aux deux variétés Φ_1 et Φ_2 qui, comme on le voit, coïncident.

Cela posé, imaginons que parmi les faces des n polyèdres P_i il y en ait

un certain nombre qui soient conjuguées deux à deux, et un certain nombre qui restent *libres*.

Considérons la variété totale V formée par l'ensemble des variétés Q_i . Comme quelques-unes de ces variétés Q_i sont contiguës, il pourra se faire que la variété totale V soit continue : c'est ce que je supposerai.

Si parmi les faces des P_i il n'y en a aucune qui reste *libre*, la variété V sera fermée. Dans le cas contraire, les points qui correspondront aux faces restées libres formeront la frontière complète de V .

On conçoit que la connaissance des polyèdres P_i et celle du mode de conjugaison de leurs faces nous fournissent, dans l'espace ordinaire, une image de la variété V et que cette image suffise pour l'étude de ses propriétés au point de vue de l'*Analysis Situs*.

Voyons comment doit être défini le mode de conjugaison des faces. Il est clair d'abord que, pour que deux faces puissent être conjuguées, il faut qu'elles aient le même nombre de côtés. Ensuite, pour connaître complètement le mode de conjugaison, il ne suffit pas de savoir que telle face est conjuguée de telle autre; il faut savoir, en outre, quel est le sommet ou le côté de cette face qui correspond à tel sommet ou à tel côté de sa conjuguée.

Alors seulement le mode de conjugaison sera complètement défini.

A deux faces conjuguées correspond, par définition, une même variété à deux dimensions intérieure à V . Il peut se faire aussi qu'à plusieurs arêtes des polyèdres P corresponde une même ligne intérieure à V , ou qu'à plusieurs sommets de ces polyèdres corresponde un même point intérieur à V . Nous dirons alors que ces arêtes ou ces sommets appartiennent à un même cycle.

Voici comment on peut former les cycles d'arêtes et les cycles de sommets.

Soit A_1 une arête, F'_1 l'une des deux faces qui passent par A_1 , F_2 la conjuguée de F'_1 , A_2 l'arête de F_2 qui correspond à A_1 ; F'_2 l'autre face qui passe par A_2 ; F_3 la conjuguée de F'_2 , A_3 l'arête correspondant à A_2 , etc.

On s'arrêtera quand on arrivera à une face libre ou quand on sera

revenu à l'arête A_1 . Toutes les arêtes $A_1, A_2, A_3, \dots$ formeront un cycle.

De même pour les sommets. Soient S_1 un sommet, F'_1 l'une des faces qui passent par S_1 , F_2 la conjuguée de F'_1 ; S_2 le sommet correspondant à S_1 ; F'_2 une des faces qui passent par $S_2, \dots$

$S_1, S_2, S_3, \dots$ appartiendront à un même cycle.

Seulement ici il passe par chaque sommet plus de deux faces; alors F'_2 , par exemple, peut être choisie de plusieurs manières; on ne devra s'arrêter qu'après avoir épuisé tous les choix possibles.

L'analogie avec la formation des cycles dans la théorie des groupes fuchsien est évidente. Elle le devient plus encore, si l'on suppose qu'il n'y a qu'un seul polyèdre P_1 .

Premier exemple.

L'exemple le plus simple est celui où l'on n'a qu'un seul polyèdre P_1 et où ce polyèdre est un cube $ABCD A'B'C'D'$ dont les sommets ont respectivement pour coordonnées

A	0	0	0	A'	0	0	1
B	0	1	0	B'	0	1	1
C	1	0	0	C'	1	0	1
D	1	1	0	D'	1	1	1

Je suppose que les faces opposées soient conjuguées et cela de la façon suivante :

$$(1) \quad \begin{cases} ABDC \equiv A'B'D'C', \\ ACC'A' \equiv BDD'A', \\ CDD'C' \equiv ABB'A'. \end{cases}$$

Voici ce que j'entends par cette notation : la relation

$$ABDC \equiv A'B'D'C'$$

signifie :

J. E. P., 2^e s. (C. n° 1).

- 1° Que les faces $ABDC$ et $A'B'D'C'$ sont conjuguées ;
- 2° Que les sommets se rencontrant sur la première de ces faces se rencontrent dans l'ordre circulaire $ABDC$;
- 3° Que les sommets A et A' , B et B' , D et D' , C et C' se correspondent.

Observons en passant que les sommets $ABDC$ se rencontrent sur la première de ces faces dans un ordre circulaire tel qu'en parcourant le périmètre dans le sens correspondant on ait la face à sa gauche. Au contraire, les sommets correspondants $A'B'D'C'$ se rencontrent sur la seconde face dans un ordre tel qu'en parcourant le périmètre dans ce sens on ait la face à sa droite.

Cette condition doit toujours être remplie *si l'on veut que V soit bilatère*. Si deux faces F_1 et F_2 sont conjuguées et si un point décrit le périmètre de F_1 de façon à laisser la face à sa gauche, le point correspondant sur F_2 devra décrire le périmètre de cette face en la laissant à sa droite.

Cela posé, supposons donc que le mode de conjugaison soit défini par les relations (1). Il est aisé de voir alors que tous les sommets forment un seul cycle et qu'il y a trois cycles d'arêtes, comprenant respectivement celles des arêtes qui sont parallèles à l'axe des x , à celui des y et à celui des z .

Deuxième exemple.

Conservons toujours notre cube, mais changeons le mode de conjugaison et définissons-le par les relations

$$(2) \quad \begin{cases} ABDC \equiv B'D'C'A', \\ ABB'A' \equiv DD'C'C, \\ ACC'A' \equiv DD'B'B; \end{cases}$$

il y aura alors deux cycles d'arêtes et deux cycles de sommets et je résume les résultats par les relations suivantes; j'ai mis le signe $\equiv$ entre deux arêtes (ou deux sommets) pour exprimer qu'elles font partie d'un même cycle.

Deux cycles d'arêtes :

$$\begin{aligned} AB &\equiv B'D' \equiv C'C \equiv B'A' \equiv AC \equiv DD', \\ AA' &\equiv DC \equiv C'A' \equiv B'B \equiv C'D' \equiv DB. \end{aligned}$$

Deux cycles de sommets :

$$\begin{aligned} A &\equiv B' \equiv C' \equiv D, \\ B &\equiv D' \equiv C \equiv A'. \end{aligned}$$

Nous verrons plus tard pour quelles raisons ce mode de conjugaison est inadmissible.

Troisième exemple.

Conservons notre cube avec le mode de conjugaison suivant :

$$(3) \quad \begin{cases} ABDC \equiv B'D'C'A', \\ ABB'A' \equiv DD'C'C, \\ ACC'A' \equiv DD'B'B. \end{cases}$$

On trouve alors :

Quatre cycles d'arêtes :

$$\begin{aligned} AB &\equiv B'D' \equiv C'A', & AA' &\equiv C'D' \equiv DB, \\ AC &\equiv DD' \equiv B'A', & CD &\equiv BB' \equiv A'C'. \end{aligned}$$

Deux cycles de sommets :

$$\begin{aligned} A &\equiv B' \equiv C' \equiv D, \\ B &\equiv D' \equiv A' \equiv C. \end{aligned}$$

Quatrième exemple.

Soit maintenant

$$(5) \quad \begin{cases} ABDC \equiv B'D'C'A', \\ ABB'A' \equiv CDD'C', \\ ACC'A' \equiv BDD'B'. \end{cases}$$

On trouve :

Trois cycles d'arêtes :

$$AA' \equiv CC' \equiv BB' \equiv DD',$$

$$AB \equiv CD \equiv B'D' \equiv A'C',$$

$$AC \equiv BD \equiv D'C' \equiv B'A',$$

et un seul cycle de sommets.

Cinquième exemple.

Soit un octaèdre régulier; il aura six sommets dont quatre formeront un carré BCED (les lettres sont rangées dans l'ordre circulaire dans lequel on rencontre les quatre sommets en parcourant le périmètre du carré) et dont deux, A et P, sont en dehors du carré. Soit

$$(6) \quad \left\{ \begin{array}{l} ABC \equiv FED, \\ ACE \equiv FDB, \\ AED \equiv FBC, \\ ADB \equiv FCE \end{array} \right.$$

le mode de conjugaison; on trouvera six cycles d'arêtes et trois cycles de sommets; chaque arête formera un cycle avec l'arête opposée, c'est-à-dire avec sa symétrique par rapport au centre de symétrie de l'octaèdre, et chaque sommet formant un cycle avec le sommet opposé.

Il est inutile de multiplier davantage les exemples; je me propose de reconnaître maintenant si tous les modes de conjugaison sont admissibles.

Appelons *aster* la figure formée par un certain nombre d'angles solides ayant même sommet et disposés autour de ce sommet de telle sorte que tout point de l'espace appartienne à un et à un seul de ces angles solides.

Dans la figure, on distinguera donc, outre les angles solides eux-mêmes et leur sommet, un certain nombre de faces communes à deux angles solides et un certain nombre d'arêtes communes à plusieurs angles solides.

Je pourrai supposer que les arêtes et les faces sont prolongées indéfiniment, ou bien qu'on les arrête à la surface d'une sphère ayant son centre au sommet commun des angles solides. Alors ces divers angles solides vont découper sur la sphère un certain nombre de polygones sphériques, de sorte que la surface de la sphère sera subdivisée en polygones sphériques. Cette surface ainsi subdivisée pourra être regardée comme homéomorphe à un polyèdre convexe dont les faces correspondront aux polygones sphériques que je viens de définir.

Alors aux angles solides de l'aster correspondront les faces du polyèdre; aux faces de l'aster correspondront les arêtes du polyèdre et, aux arêtes de l'aster, ses sommets.

Soient S , F et A le nombre des angles solides, des faces et des arêtes de l'aster. Comme le polyèdre doit satisfaire au théorème d'Euler, on devra avoir

$$S - F + A = 2.$$

Revenons maintenant à nos polyèdres

$$P_1, P_2, \dots, P_n$$

et envisageons un cycle de sommets; à tous les sommets de ce cycle correspondra un même point de V que j'appelle M . Parmi les variétés

$$Q_1, Q_2, \dots, Q_n,$$

il y en aura un certain nombre qui auront le point M sur leur frontière; je les appellerai les variétés Q_α et ce seront celles qui correspondront à des polyèdres P_α auxquels appartiendront les divers sommets du cycle.

Considérons maintenant deux des variétés Q_α qui soient contiguës, et la variété à deux dimensions qui leur sert de frontière commune. Les variétés à deux dimensions ainsi définies, je les appellerai les Φ_α ; elles correspondront à celles des faces des polyèdres P_α auxquelles appartiennent les divers sommets du cycle.

Nous envisagerons enfin les variétés à une dimension qui sont l'inter-

section de deux variétés Φ_α et que j'appellerai les L_α . Elles correspondront à celles des arêtes des polyèdres P_α auxquelles appartiennent les divers sommets du cycle.

Envisageons la figure formée par les variétés Q_α , Φ_α , L_α ou plutôt par les points de ces variétés qui satisfont à l'inégalité

$$(7) \quad (x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2 + (x_3 - x_3^0)^2 + (x_4 - x_4^0)^2 < \varepsilon^2.$$

ε est une très petite quantité; $x_1^0, x_2^0, x_3^0, x_4^0$ sont les coordonnées du point M.

Cette figure est évidemment homéomorphe à un aster dont les faces et les arêtes seraient limitées à une sphère. Soit A cet aster.

Considérons une quelconque des variétés Q_α et, en outre, la variété W formée par ceux de ses points qui satisfont à l'inégalité (7). Cette variété sera continue ou ne le sera pas. Si elle ne l'est pas, je la décomposerai en plusieurs variétés continues, et les diverses variétés continues que l'on pourra ainsi former, je les appellerai les Q'_α . (Le nombre des Q'_α peut ainsi être plus grand que celui des Q_α si l'une des variétés W n'est pas continue.)

Je définirai de même les Φ'_α et les L'_α .

Soient $q_\alpha, \varphi_\alpha, l_\alpha$ le nombre des Q'_α , des Φ'_α et des L'_α ; ce sera aussi celui des angles solides, des faces et des arêtes de l'aster A.

D'où cette conclusion :

Pour qu'un mode de conjugaison soit admissible, il faut que, pour tous les cycles de sommets, on ait

$$q_\alpha - \varphi_\alpha + l_\alpha = 2.$$

Voyons maintenant comment on pourra calculer les nombres $q_\alpha, \varphi_\alpha, l_\alpha$ pour un cycle de sommets quelconque α .

1° q_α sera le nombre des sommets du cycle.

2° Pour avoir φ_α , on n'a qu'à faire la somme des nombres des faces qui vont passer par les divers sommets du cycle et à diviser par deux. Si,

par exemple, le cycle α se compose de trois sommets a, b, c appartenant respectivement aux polyèdres P_1, P_2 et P_3 ; si le point a est le sommet d'un angle trièdre de sorte que trois faces de P_1 aillent passer par a ; si quatre faces de P_2 vont passer par b et cinq faces de P_3 par c , on aura

$$\varphi_\alpha = \frac{3+4+5}{2} = 6.$$

3° Pour avoir l_α , on énumérera les arêtes qui aboutissent aux divers sommets du cycle de la manière suivante : toutes les arêtes d'un même cycle d'arêtes ne compteront que pour une seule, si l'une des extrémités appartient au cycle α ; elles compteront pour deux si les deux extrémités appartiennent au cycle α .

Appliquons ces règles aux six exemples dont nous nous sommes occupés plus haut, nous aboutirons au Tableau suivant :

Exemple.	q_α .	φ_α .	l_α .
Premier.....	8	12	6
Deuxième.....	4	6	2
Troisième.....	4	6	4
Quatrième.....	8	12	6
Cinquième... ..	2	4	4

Il est à remarquer que, dans les exemples 2, 3 et 5, il y a plusieurs cycles de sommets, mais il arrive que les trois nombres q_α , φ_α et l_α ont mêmes valeurs pour tous les cycles d'un même exemple.

Ce Tableau montre que la relation

$$q_\alpha - \varphi_\alpha + l_\alpha = 2$$

est satisfaite pour tous nos exemples, sauf pour le second. Le mode de conjugaison du second exemple doit donc être rejeté.

§ 11. — REPRÉSENTATION PAR UN GROUPE DISCONTINU.

Voici un autre mode de représentation qui peut aussi être employé dans certains cas.

Soit (x, y, z) un point de l'espace ordinaire; considérons une série de substitutions qui changent respectivement x, y et z en

$$\begin{array}{lll} \varphi_1(x, y, z), & \psi_1(x, y, z), & \chi_1(x, y, z), \\ \varphi_2(x, y, z), & \dots\dots\dots, & \dots\dots\dots, \\ \dots\dots\dots, & \dots\dots\dots, & \dots\dots\dots, \\ \varphi_n(x, y, z), & \psi_n(x, y, z), & \chi_n(x, y, z), \\ \dots\dots\dots, & \dots\dots\dots, & \dots\dots\dots \end{array}$$

Supposons que l'ensemble de ces substitutions forme un groupe proprement discontinu. L'espace va se trouver partagé en une infinité de domaines

$$D_0, \quad D_1, \quad D_2, \quad \dots,$$

et cela de telle sorte qu'à chaque domaine D_i corresponde une substitution du groupe S_i qui change D_0 en D_i .

Considérons une surface Σ formant une portion de la frontière de D_0 séparant ce domaine D_0 du domaine D_i ; la substitution S_i^{-1} inverse de S_i change D_i en D_0 et, comme les points de Σ appartiennent à la frontière de D_i , la transformée de la surface Σ sera une autre partie de la frontière de D_0 .

La frontière de D_0 va ainsi se trouver partagée en portions de surface qui seront conjuguées deux à deux, de telle façon que chacune d'elles sera la transformée de sa conjuguée par une des substitutions du groupe.

Le domaine D_0 , avec sa frontière ainsi subdivisée, sera homéomorphe à un polyèdre dont les faces seront conjuguées deux à deux, comme dans le numéro précédent. On pourra alors, comme dans le numéro précédent, faire correspondre à ce polyèdre ou, par conséquent, au domaine D_0 , une variété fermée à trois dimensions située dans l'espace à quatre dimensions, et que l'on obtiendra en transportant D_0 dans l'espace à quatre dimensions, puis en déformant ce domaine jusqu'à ce qu'on puisse *coller* l'une contre l'autre les portions conjuguées de sa frontière.

L'analogie avec la théorie des groupes fuchsien est trop évidente pour qu'il soit nécessaire d'insister; je me bornerai à un seul exemple :

Sixième exemple.

Considérons le groupe dérivé des trois substitutions

$$(1) \quad \begin{cases} (x, y, z; x+1, y, z), \\ (x, y, z; x, y+1, z), \\ (x, y, z; \alpha x + \beta y, \gamma x + \delta y, z+1), \end{cases}$$

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ étant des entiers tels que

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1.$$

J'appellerai ce groupe le groupe $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$.

Je dis qu'il est proprement discontinu.

Pour nous en rendre compte, cherchons comment sont distribués dans l'espace les transformés d'un même point

$$x = a, \quad y = b, \quad z = c.$$

D'abord, tous les transformés de ce point, par une combinaison quelconque des deux premières substitutions, seront compris dans la formule

$$(2) \quad x = a + k, \quad y = b + k_1, \quad z = c,$$

k et k_1 étant deux entiers; il est facile de voir d'ailleurs que ces deux substitutions sont permutable.

Transformons maintenant l'ensemble des points (2) par la troisième substitution; nous trouverons

$$(3) \quad x = \alpha(a+k) + \beta(b+k_1), \quad y = \gamma(a+k) + \delta(b+k_1), \quad z = c+1.$$

Si nous posons, pour abréger,

$$\alpha a + \beta b = a_1, \quad \gamma a + \delta b = b_1,$$

de sorte que le point (a_1, b_1) soit le transformé du point (a, b) par la sub-

stitution

$$(x, y; \alpha x + \beta y, \gamma x + \delta y),$$

que j'appellerai s .

Nous pourrions alors remplacer les équations (3) par les suivantes :

$$(4) \quad x = a + k', \quad y = b_1 + k'_1, \quad z = c + 1,$$

k' et k'_1 étant deux entiers nouveaux ; en appliquant à ces points les deux premières substitutions, on retombe donc toujours sur les mêmes points.

Appliquons-leur la troisième substitution.

Soit

$$a_2 = \alpha a_1 + \beta b_1, \quad b_2 = \gamma a_1 + \delta b_1,$$

de telle sorte que le point a_2, b_2 soit le transformé du point a_1, b_1 par s .

Alors les transformés des points (4) par la troisième substitution seront compris dans la formule

$$(5) \quad x = a_2 + k'', \quad y = b_2 + k''_1, \quad z = c + 2,$$

k'' et k''_1 étant deux entiers.

En général, supposons que les transformés successifs du point (a, b) par la substitution s soient $a_1, b_1; a_2, b_2; \dots; a_n, b_n; \dots$ et de même que les transformés successifs par la substitution inverse soient $a_{-1}, b_{-1}; a_{-2}, b_{-2}; \dots$

Alors tous les transformés du point (a, b, c) par les substitutions du groupe (1) seront donnés par la formule

$$x = a_n + k, \quad y = b_n + k_1, \quad z = c + n,$$

où n, k et k_1 sont trois entiers arbitraires.

On voit aisément d'ailleurs que le groupe dérivé des deux premières substitutions est permutable à la troisième.

Le domaine fondamental D_0 est un cube dont le côté est égal à 1 et limité par les six plans

$$x; y; z = 0; 1.$$

Le cas le plus simple est celui où

$$\alpha = \delta = 1, \quad \beta = \gamma = 0,$$

parce qu'alors nos trois substitutions se réduisent à

$$(x, y, z; x + 1, y, z; x, y + 1, z; x, y, z + 1).$$

Chacune d'elles change une des faces du cube en la face opposée; nous retombons donc tout simplement sur notre premier exemple.

Mais la manière dont la superficie du cube D_0 se subdivise en régions conjuguées n'est pas toujours aussi simple.

Supposons, par exemple,

$$\alpha = \beta = \delta = 1, \quad \gamma = 0;$$

chacune des faces parallèles à l'axe des z sera encore conjuguée de la face opposée; mais pour les faces $z = 0$, $z = 1$ perpendiculaires à l'axe des z , cela sera plus compliqué.

Supposons que les points ABCD, A'B'C'D' aient mêmes coordonnées que dans nos quatre premiers exemples. Chacune des faces ABCD, A'B'C'D' devra être partagée en deux triangles, à savoir : ABC et BCD d'une part, A'D'C' et A'B'D' d'autre part, et la loi de conjugaison des faces sera exprimée par les relations

$$ACC'A' \equiv BDD'A',$$

$$CDD'C' \equiv ABB'A',$$

$$ABC \equiv A'D'C',$$

$$BCD \equiv B'A'D'.$$

Plus généralement les faces parallèles à l'axe des z resteront conjuguées deux à deux, mais les faces perpendiculaires à l'axe des z devront être décomposées en polygones plus petits, d'autant plus nombreux que les nombres $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ seront plus grands et qui seront conjugués deux à deux suivant une loi plus ou moins compliquée.

Un cas simple est celui-ci :

$$\alpha = \delta = 0, \quad \beta = 1, \quad \gamma = -1.$$

Dans ce cas, le mode de conjugaison est le même que dans notre quatrième exemple.

§ 12. — GROUPE FONDAMENTAL.

Nous sommes ainsi conduit à la notion du groupe fondamental d'une variété.

Soient

$$F_1, \quad F_2, \quad \dots, \quad F_\lambda,$$

λ fonctions des coordonnées $x_1, x_2, \dots, x_n$ d'un point M d'une variété V définie par les relations

$$f_\alpha = 0, \quad \varphi_\beta > 0.$$

Je ne suppose pas que les fonctions F soient uniformes. Lorsque le point M, partant de sa position initiale M_0 , reviendra à cette position, après avoir parcouru un chemin quelconque, il pourra se faire que les fonctions F ne reviennent pas à leurs valeurs primitives.

Mais pour mieux fixer les idées et bien que cela n'ait rien d'essentiel, supposons que les fonctions F soient définies de la manière suivante. Elles devront satisfaire à des équations différentielles de la forme

$$(1) \quad dF_i = X_{i,1} dx_1 + X_{i,2} dx_2 + \dots + X_{i,n} dx_n,$$

où les coefficients $X_{i,k}$ seront des fonctions données des x_k et des F_i . Ces fonctions devront être uniformes, finies et continues, ainsi que leurs dérivées pour toutes les valeurs des F ainsi que pour tous les points de V et même pour tous les points suffisamment voisins de V.

Je suppose également que, pour tous les points suffisamment voisins de V, les équations (1) satisfassent aux conditions d'intégrabilité, qui

peuvent s'écrire

$$\begin{aligned} \frac{dX_{i,k}}{dx_q} + \frac{dX_{i,k}}{dF_1} X_{1,q} + \frac{dX_{i,k}}{dF_2} X_{2,q} + \dots + \frac{dX_{i,k}}{dF_\lambda} X_{\lambda,q} \\ = \frac{dX_{i,q}}{dx_k} + \frac{dX_{i,q}}{dF_1} X_{1,k} + \frac{dX_{i,q}}{dF_2} X_{2,k} + \dots + \frac{dX_{i,q}}{dF_\lambda} X_{\lambda,k}. \end{aligned}$$

Si alors le point M décrit sur la variété V un contour infiniment petit, les fonctions F reviendront à leurs valeurs primitives. Il en sera encore de même, si le point M décrit sur la variété V un *lacet*, c'est-à-dire s'il va d'abord de M_0 en M_1 par un chemin quelconque M_0BM_1 , s'il décrit ensuite un contour infiniment petit, et si enfin il revient de M_1 à M_0 par le *même* chemin M_1BM_0 .

Mais il pourra n'en plus être de même s'il décrit un contour fermé fini.

Supposons, par exemple, que nous soyons dans l'espace ordinaire et que notre variété V soit un tore. On pourra évidemment imaginer que les fonctions F reviennent à leurs valeurs primitives, quand le point M décrira un lacet sur ce tore, mais qu'il n'en soit plus de même si le point M décrit une circonférence méridienne ou un parallèle.

Les valeurs finales des fonctions F , quand le mobile M , partant d'un point initial M_0 , y reviendra après avoir décrit un contour fermé; ces valeurs finales, dis-je, dépendront naturellement des valeurs initiales.

Soient donc F_a^0 et F_a^1 les valeurs initiale et finale de F_a . Les F_a^1 seront des fonctions des F_a^0 , ou, en d'autres termes, les fonctions F subiront, quand le point M décrira le contour fermé considéré, une certaine substitution, qui changera les F_a^0 en F_a^1 .

L'ensemble de toutes les substitutions que les fonctions F subiront ainsi, quand le point M décrira tous les contours fermés que l'on peut tracer sur la variété V en partant du point initial M_0 , formera évidemment un groupe que j'appelle g .

Maintenant considérons un contour fermé M_0BM_0 tracé sur V et partant du point initial M_0 . Si ce contour fermé se réduit à un lacet, je con-

viendrai d'écrire

$$M_0 B M_0 = 0.$$

Si maintenant $M_0 A M_1$, $M_0 B M_1$, $M_0 C M_1$ sont trois chemins différents tracés sur V et allant de M_0 à M_1 , je conviendrai d'écrire

$$M_0 A M_1 C M_0 \equiv M_0 A M_1 B M_0 + M_0 B M_1 C M_0.$$

Il importe de remarquer que $M_0 A M_1 C M_0$ n'est pas la même chose que $M_0 C M_1 A M_0$, ni $M_0 A M_1 B M_0 + M_0 B M_1 C M_0$ la même chose que

$$M_0 B M_1 C M_0 + M_0 A M_1 B M_0;$$

on ne peut pas intervertir l'ordre des termes d'une somme.

Il résulte de cette convention que l'on aura

$$M_0 B M_0 \equiv 0,$$

si le contour fermé $M_0 B M_0$ constitue la frontière complète d'une variété et deux dimensions faisant partie de V ; et, en effet, ce contour fermé pourra alors être décomposé en un nombre très grand de lacets.

Nous sommes ainsi conduit à envisager des relations de la forme

$$k_1 C_1 + k_2 C_2 \equiv k_3 C_3 + k_4 C_4,$$

où les k sont des entiers et les C des contours fermés tracés sur V et partant de M_0 . Ces relations, que j'appellerai des *équivalences*, ressemblent aux homologies que j'ai étudiées plus haut. Elles en diffèrent :

1° Parce que, dans les homologies, les contours peuvent partir d'un point initial quelconque.

2° Parce que, dans les homologies, on a le droit d'intervertir l'ordre des termes d'une somme.

On pourra ajouter deux équivalences, l'une à l'autre, mais à la condition de ne pas intervertir l'ordre des termes, si donc on a

$$A \equiv B$$

et

$$C \equiv D,$$

on pourra en conclure

$$A + C \equiv B + D,$$

mais non

$$C + A \equiv B + D.$$

Ajoutons que de

$$2A \equiv 0$$

on n'a pas le droit de conclure

$$A \equiv 0.$$

Cela posé, il est clair que l'on peut imaginer un groupe G satisfaisant aux conditions suivantes :

1° A chaque contour fermé, $M_0 B M_0$ correspondra une substitution S du groupe;

2° La condition nécessaire et suffisante pour que S se réduise à la substitution identique, c'est que

$$M_0 B M_0 \equiv 0;$$

3° Si S et S' correspondent aux contours C et C' et si

$$C'' \equiv C + C',$$

la substitution correspondant à C'' sera SS' .

Le groupe G s'appellera le *groupe fondamental* de la variété V .

Comparons-le au groupe g des substitutions subies par les fonctions F .

Le groupe g sera isomorphe à G .

L'isomorphisme pourra être holoédrique.

Il pourra être méridrique si un contour fermé $M_0 B M_0$ non décomposable en lacets ramène les fonctions F à leurs valeurs primitives.

§ 15. — ÉQUIVALENCES FONDAMENTALES.

Le groupe G sera dérivé d'un certain nombre de substitutions princi-

pales $S_1, S_2, \dots, S_p$. A chacune d'elles correspondra un contour fermé, de sorte que nous aurons p contours fermés fondamentaux $C_1, C_2, \dots, C_p$ et qu'un contour fermé quelconque soit équivalent à une combinaison des contours fondamentaux se succédant dans un certain ordre.

Ces contours fondamentaux ne sont pas en général tout à fait indépendants et il y a entre eux certaines relations que j'appellerai *équivalences fondamentales*.

Supposons, par exemple, qu'on ait entre les contours fondamentaux, l'équivalence

$$k_1 C_1 + k_2 C_2 + k'_1 C_1 + k_3 C_3 \equiv 0.$$

Cela signifie que la substitution

$$S_1^{k_1} S_2^{k_2} S_1^{k'_1} S_3^{k_3}$$

du groupe G se réduit à la substitution identique.

Les équivalences fondamentales nous font donc connaître la forme du groupe G .

Supposons que la variété V ait été définie par le mode de représentation du n° 10 et que nous n'ayons qu'un seul polyèdre P_1 . Il est clair qu'on obtiendra tous les contours fondamentaux de la manière suivante. Soient M_0 un point intérieur à P_1 , A un point d'une des faces de P_1 , A' le point correspondant sur la face conjuguée. On ira de M_0 à A , puis de A' à M_0 sans sortir de P_1 ; le chemin correspondant sur la variété V sera fermé.

Il y aura donc autant de contours fondamentaux que de paires de faces.

Voici maintenant comment on formera les équivalences fondamentales.

Considérons un cycle d'arêtes. Soit, par exemple, une arête, intersection des faces F_1 et F'_μ , et que je désignerai pour cette raison sous le nom d'*arête* $F_1 F'_\mu$; soient F'_1 la face conjuguée de F_1 et F_2, F'_1 l'arête correspondante à $F_1 F'_\mu$ sur cette face; soient F'_2 la face conjuguée de F_2 et F_3, F'_2 l'arête correspondante à $F_2 F'_1$ sur cette face; et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on retombe sur la face F'_μ et l'arête $F_1 F'_\mu$.

Remarquons qu'en faisant cette opération l'on pourra retomber, plusieurs fois, sur la même face.

Soient A_i un point de F_i et A'_i le point correspondant de F'_i ; soit C_i le contour fondamental

$$M_0 A_i + A'_i M_0.$$

Alors, on aura l'équivalence fondamentale

$$C_1 + C_2 + \dots + C_\mu \equiv 0.$$

Il y aura donc autant d'équivalences fondamentales que de cycles d'arêtes.

Quand on aura formé ainsi les équivalences fondamentales, on en déduira les homologies fondamentales qui n'en diffèrent que parce que l'ordre des termes est indifférent. La connaissance de ces homologies fera immédiatement connaître le nombre de Betti P_1 .

Appliquons ces principes aux exemples cités plus haut, et remarquons que, toutes les variétés citées dans ces exemples étant fermées et à trois dimensions, on aura

$$P_1 = P_2.$$

Premier exemple.

$$\begin{array}{ll} (C_1) & ABDC \equiv A'B'D'C', \\ (C_2) & ABB'A' \equiv CDD'C', \\ (C_3) & ACC'A' \equiv BDD'B'. \end{array}$$

Voici ce que j'entends par la notation

$$(C_1) \quad ABDC \equiv A'B'D'C'.$$

Je veux dire que la face $ABDC$ est conjuguée de $A'B'D'C'$ et que α désignant un point de $ABDC$ et α' un point de $A'B'D'C'$, le contour fondamental $M_0 \alpha + \alpha' M_0$ est désigné par C_1 .

Équivalences fondamentales.

$$C_1 + C_2 \equiv C_2 + C_1, \quad C_1 + C_3 \equiv C_3 + C_1, \quad C_2 + C_3 \equiv C_3 + C_2.$$

Les homologies fondamentales se réduisent à des identités

$$P_1 = P_2 = 4.$$

Je passe tout de suite au troisième exemple, puisque nous avons vu que le second doit être rejeté.

Troisième exemple.

$$(C_1) \quad ABDC \equiv B'D'C'A',$$

$$(C_2) \quad ABB'A' \equiv DD'C'C,$$

$$(C_2) \quad ACC'A' \equiv DD'B'B.$$

Équivalences fondamentales.

$$C_1 + C_3 + C_2 \equiv 0, \quad C_1 - C_3 - C_2 \equiv 0,$$

$$C_2 - C_1 - C_3 \equiv 0, \quad C_3 - C_2 - C_1 \equiv 0,$$

ce qui peut aussi s'écrire

$$2C_1 \equiv 2C_2 \equiv 2C_3, \quad 4C_1 = 0.$$

Homologies fondamentales.

$$C_1 \sim C_2 \sim C_3 \sim 0,$$

$$P_1 = P_2 = 1.$$

On peut donner de ce résultat une interprétation géométrique simple. Le groupe G est d'ordre fini et se compose seulement de huit substi-

tutions distinctes correspondant aux contours suivants :

$$0, \quad C_1, \quad C_2, \quad C_3, \quad 2C_4, \quad 3C_1, \quad 3C_2, \quad 3C_3.$$

Le groupe est isomorphe au groupe suivant

$$\begin{aligned} (x, y, z, t; & -y, x, -t, z; \\ & -t, -z, y, x; z, -t, -x, y; \\ & -x, -y, -z, -t; y, -x, t, -z; \\ & t, z, -y, -x; -z, t, x, -y). \end{aligned}$$

Ce groupe, qui transforme en lui-même l'hypercube à quatre dimensions, dont les huit faces ont pour équations

$$x = \pm 1, \quad y = \pm 1, \quad z = \pm 1, \quad t = \pm 1,$$

pourrait être appelé le groupe *hypercubique*.

Quatrième exemple.

$$\begin{aligned} (C_1) \quad & ABDC \equiv B'D'C'A', \\ (C_2) \quad & ABB'A' \equiv CDD'C', \\ (C_3) \quad & ACC'A' \equiv BDD'B'. \end{aligned}$$

Equivalences fondamentales.

$$C_2 + C_3 \equiv C_3 + C_2, \quad C_3 + C_1 \equiv C_1 + C_3, \quad -C_2 + C_1 \equiv C_1 + C_3.$$

Homologies fondamentales.

$$C_2 \smile C_3 \smile 0,$$

d'où

$$P_1 = P_2 = 2.$$

Cinquième exemple.

$$\begin{array}{ll}
(C_1) & ABC \equiv FED, \\
(C_2) & ACE \equiv FDB, \\
(C_3) & AED \equiv FBC, \\
(C_4) & ADB \equiv FCE.
\end{array}$$

Équivalences fondamentales.

$$\begin{array}{l}
C_1 \equiv C_2 \equiv C_3 \equiv C_4, \quad 2C_1 \equiv 0, \\
d'où \quad C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4 \cup 0, \\
et \quad P_1 = P_2 = 1.
\end{array}$$

Le groupe G se réduit à deux substitutions correspondant aux contours

$$0 \quad \text{et} \quad C_1.$$

Sixième exemple.

Le groupe G est évidemment holomorphe au groupe $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$.

Les trois substitutions

$$\begin{aligned}
& (x, y, z; x+1, y, z), \\
& (x, y, z; x, y+1, z), \\
& (x, y, z; \alpha x + \beta y, \gamma x + \delta y, z+1)
\end{aligned}$$

correspondront respectivement aux contours fondamentaux C_1 , C_2 et C_3 .

Nous avons d'abord les équivalences fondamentales

$$\begin{aligned}
C_1 + C_2 &\equiv C_2 + C_1, \\
C_1 + C_3 &\equiv C_3 + \alpha C_1 + \gamma C_2, \\
C_2 + C_3 &\equiv C_1 + \beta C_1 + \delta C_2,
\end{aligned}$$

d'où il résulte d'abord que toute combinaison des contours fondamentaux peut se mettre sous la forme

$$m_3 C_3 + m_1 C_1 + m_2 C_2,$$

les m étant des entiers. Et comme cette expression ne pourrait être équivalente à 0, que si les trois entiers m étaient nuls, il en résulte que nous possédons là toutes les équivalences fondamentales.

Homologies fondamentales.

$$\begin{aligned} (\alpha - 1)C_1 + \gamma C_2 &\simeq 0, \\ \beta C_1 + (\delta - 1)C_2 &\simeq 0. \end{aligned}$$

Si ces deux homologies ne sont pas distinctes, on aura

$$C_1 \simeq C_2 \simeq 0;$$

d'où

$$P_1 = P_2 = 2;$$

c'est ce qui arrive dans le cas général et particulièrement pour notre quatrième exemple.

Si le déterminant de ces homologies est nul, c'est-à-dire que

$$(\alpha - 1)(\delta - 1) - \beta\gamma = 0$$

ou

$$\alpha + \delta = 2,$$

on aura

$$P_1 = P_2 = 3,$$

sauf dans le cas où les deux homologies se réduiraient à des identités. C'est ce qui arrive pour

$$\alpha = \delta = 1, \quad \beta = \gamma = 0,$$

c'est-à-dire pour notre premier exemple; on a alors

$$P_1 = P_2 = 4.$$

§ 14. — CONDITIONS DE L'HOMÉOMORPHISME.

On sait que deux variétés fermées à deux dimensions qui ont même nombre de Betti sont homéomorphes. C'est ce qui résulte, par exemple, de l'étude des périodes des fonctions abéliennes. Considérons une surface de Riemann R et soit z la variable imaginaire correspondante; on pourra introduire une variable imaginaire nouvelle t , telle que z soit une fonction fuchsienne de t et que t , considéré comme fonction de z , n'ait aucun point singulier sur la surface R . Tous les groupes fuchsien correspondant à diverses surfaces de Riemann ayant même ordre de connexion seront isomorphes.

Ce groupe fuchsien ne sera, d'ailleurs, évidemment autre chose que le groupe fondamental g , relatif à la surface R considérée comme une variété à deux dimensions.

On remarquera que tous les groupes fuchsien ne sont pas susceptibles de définir ainsi une variété fermée à deux dimensions. Considérons le polygone fuchsien fondamental R_0 auquel, si la fonction fuchsienne existe dans tout le plan, il faudra adjoindre son symétrique R'_0 par rapport à l'axe des quantités réelles; mais alors le domaine $R_0 + R'_0$ ne sera plus toujours simplement connexe. A chaque point de la variété fermée V devrait correspondre un point de R_0 (ou de $R_0 + R'_0$) et un seul, et réciproquement. Supposons qu'il existe un ou plusieurs cycles de sommets et que la somme des angles de ce cycle soit zéro ou $\frac{2\pi}{n}$, n étant un entier plus grand que 1; soit alors M le point de V qui correspond à ce cycle de sommets et envisageons un lacet infiniment petit enveloppant M . D'après la définition du groupe g , à ce lacet doit correspondre, dans le groupe g , la substitution identique et, dans le groupe fuchsien, une substitution non identique. Le groupe fuchsien ne peut donc être isomorphe à g .

Restent alors les groupes fuchsien de la première famille tels que la somme des angles d'un cycle quelconque soit 2π , et ceux de la troisième famille. Mais ceux-ci doivent également être rejetés. En effet, si le groupe est de la troisième famille, le domaine $R_0 + R'_0$ n'est plus simplement

connexe. Soit C un contour fermé tracé dans ce domaine et tel que l'on n'ait pas

$$C \sim 0.$$

A ce contour correspondra, dans le groupe fuchsien, une substitution identique (puisque la variable z sera revenue à son point de départ) et, dans le groupe g , une substitution non identique. Ici encore, le groupe fuchsien ne peut être isomorphe à g .

Il ne reste donc que les groupes de la première famille et tels que la somme des angles de chaque cycle soit égale à 2π .

Tous ceux de ces groupes qui sont du même genre sont isomorphes entre eux, et c'est pour cette raison que toutes les variétés fermées à deux dimensions qui ont même nombre de Betti sont homéomorphes.

En est-il de même quand le nombre des dimensions est plus grand; deux variétés fermées à h dimensions ($h > 2$) qui ont mêmes nombres de Betti sont-elles homéomorphes?

Nous allons voir que non et c'est ce qui nous fait voir combien les questions d'*Analysis Situs* se compliquent quand le nombre des dimensions s'accroît.

Il est clair d'abord que, si deux variétés sont homéomorphes, leurs groupes g seront isomorphes.

Revenons maintenant à notre sixième exemple et recherchons si deux groupes $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ peuvent être isomorphes.

Soient $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ et $(\alpha', \beta', \gamma', \delta')$ ces deux groupes; soient C_1, C_2, C_3 ; C'_1, C'_2, C'_3 les trois contours fondamentaux de chacun de ces groupes;

$$(1) \quad \begin{cases} C_1 + C_2 \equiv C_2 + C_1, \\ C_1 + C_3 \equiv C_3 + \alpha C_1 + \gamma C_2, \\ C_2 + C_3 \equiv C_3 + \beta C_1 + \delta C_2, \end{cases}$$

$$(1 \text{ bis}) \quad \begin{cases} C'_1 + C'_2 \equiv C'_2 + C'_1, \\ C'_1 + C'_3 \equiv C'_3 + \alpha' C'_1 + \gamma' C'_2, \\ C'_2 + C'_3 \equiv C'_3 + \beta' C'_1 + \delta' C'_2, \end{cases}$$

les équivalences fondamentales des deux groupes

Supposons les deux groupes isomorphes et soient

$$\begin{aligned} a_3 C_3 + a_1 C_1 + a_2 C_2, \\ b_3 C_3 + b_1 C_1 + b_2 C_2, \\ c_3 C_3 + c_1 C_1 + c_2 C_2 \end{aligned}$$

les contours du premier groupe qui correspondent respectivement aux contours C'_1 , C'_2 et C'_3 du second groupe; les a , les b et les c sont des entiers; nous avons vu en effet, plus haut, que tout contour du premier groupe peut se mettre sous cette forme.

Pour que l'isomorphisme ait lieu, il faut qu'en substituant, dans les équivalences (1 bis), $a_3 C_3 + a_1 C_1 + a_2 C_2 + \dots$ à la place de C'_1 , C'_2 , C'_3 , on retrouve les équivalences (1).

Il faut donc d'abord que les substitutions (que je désigne par les mêmes signes que les contours correspondants)

$$\begin{aligned} a_3 C_3 + a_1 C_1 + a_2 C_2, \\ b_3 C_3 + b_1 C_1 + b_2 C_2 \end{aligned}$$

soient permutables. Pour simplifier l'écriture, je vais employer la notation suivante :

Je poserai

$$a_3 = h, \quad b_3 = k, \quad a_1 C_1 + a_2 C_2 = S_0; \quad b_1 C_1 + b_2 C_2 = T_0,$$

de sorte que nos deux premières substitutions se réduisent à $h C_3 + S_0$, $k C_3 + T_0$.

Je désignerai par S_1 ce que devient S_0 quand on y fait subir aux coefficients la substitution linéaire $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$, c'est à-dire quand on remplace a_1 et a_2 par

$$\alpha a_1 + \beta a_2 \quad \text{et} \quad \gamma a_1 + \delta a_2.$$

S_2 sera ce que devient S_1 quand on fait subir à ses coefficients la même substitution et ainsi de suite; de même T_1 , T_2 , ..., seront les transformés successifs de T_0 .

Cela posé, on aura, en vertu des équivalences (1),

$$S_0 + hC_3 = hC_3 + S_h.$$

Pour que nos substitutions soient permutables, il faut donc que

$$hC_3 + S_0 + kC_3 + T_0 = kC_3 + T_0 + hC_3 + S_0$$

ou

$$(k + h)C_3 + S_k + T_0 \equiv (k + h)C_3 + T_h + S_0$$

ou

$$(\lambda) \quad S_k + T_0 \equiv T_h + S_0.$$

Supposons d'abord que h soit égal à k et différent de 0; l'équivalence précédente pourra être remplacée par les égalités

$$\begin{aligned} (\alpha_h - 1)(a_1 - b_1) + \beta_h(a_2 - b_2) &= 0, \\ \gamma_h(a_1 - b_1) + (\delta_h - 1)(a_2 - b_2) &= 0, \end{aligned}$$

où j'ai désigné par

$$\begin{vmatrix} \alpha_h & \beta_h \\ \gamma_h & \delta_h \end{vmatrix}$$

les coefficients de la puissance $h^{\text{ième}}$ de la substitution linéaire

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix}.$$

Ces égalités peuvent être satisfaites de deux manières :

1° Ou bien si

$$a_1 = b_1, \quad a_2 = b_2,$$

auquel cas les deux substitutions

$$hC_3 + S_0, \quad kC_3 + T_0$$

seraient identiques;

2° Ou bien si le déterminant

$$\begin{vmatrix} \alpha_h - 1 & \beta_h \\ \gamma_h & \delta_h - 1 \end{vmatrix}$$

est nul. Mais cela ne peut arriver que si l'on a

$$s^h = 1,$$

s étant une des racines de l'équation

$$(2) \quad \begin{vmatrix} \alpha - s & \beta \\ \gamma & \delta - s \end{vmatrix} = 0,$$

c'est-à-dire si la substitution $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ est *elliptique*; ce qui veut dire que les racines de l'équation (2) en s sont imaginaires (dans l'espèce, elles doivent être égales à une racine $h^{\text{ième}}$ de l'unité) ou *parabolique*, ce qui veut dire que les racines de l'équation (2) sont égales.

Supposons donc que $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ soit *hyperbolique*, c'est-à-dire que les racines de l'équation en s soient réelles; et ne supposons plus $h = k$.

Alors la puissance $k^{\text{ième}}$ de

$$hC_3 + S_0$$

et la puissance $h^{\text{ième}}$ de

$$kC_3 + T_0$$

devront être permutables; soient

$$h'C_3 + S'_0,$$

$$h'C_3 + T'_0$$

ces deux puissances; comme on aura

$$h' = k' = hk,$$

ces deux puissances, d'après ce qui précède, devraient être identiques. Dans le groupe $(\alpha', \beta', \gamma', \delta')$ supposé isomorphe, la puissance $k^{\text{ième}}$ de C'_1

devrait être identique à la puissance $h^{\text{ième}}$ de C'_2 . Comme il ne saurait en être ainsi, on devra avoir

$$h = k = 0,$$

c'est-à-dire

$$a_3 = b_3 = 0.$$

Passons au cas des substitutions elliptiques auxquelles nous assimilons la substitution

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}.$$

Alors le déterminant

$$\begin{vmatrix} \alpha_h - 1 & \beta_h \\ \gamma_h & \delta_h - 1 \end{vmatrix}$$

peut s'annuler pour une certaine valeur de h que j'appelle ν .

Mais alors la substitution

$$\begin{vmatrix} \alpha_\nu & \beta_\nu \\ \gamma_\nu & \delta_\nu \end{vmatrix}$$

se réduit à la substitution identique, c'est-à-dire que l'on a

$$\alpha_\nu = \delta_\nu = 1, \quad \beta_\nu = \gamma_\nu = 0.$$

Alors il arrive d'abord que νC_3 est permutable à C_1 et à C_2 et plus généralement que deux substitutions

$$\begin{aligned} a_3 C_3 + a_1 C_1 + a_2 C_2, \\ b_3 C_3 + b_1 C_1 + b_2 C_2 \end{aligned}$$

sont permutables, pourvu que a_3 et b_3 soient divisibles par ν . Cette condition suffisante est d'ailleurs nécessaire, en excluant, comme nous l'avons fait plus haut, le cas où deux puissances de nos deux substitutions seraient identiques.

Pour le démontrer, je vais encore employer une notation plus abrégée; le symbole

$$m_1 C_1 + m_2 C_2$$

n'a de sens que si m_1 et m_2 sont entiers; mais le suivant

$$\mu(a'_1 C_1 + a'_2 C_2) + \rho(b'_1 C_1 + b'_2 C_2)$$

peut avoir un sens alors même que μ , ρ , les a' et les b' ne sont pas entiers, pourvu que

$$\mu a'_1 + \rho b'_1, \quad \mu a'_2 + \rho b'_2$$

soient entiers. Il est évident que ce qui nous permet d'agir ainsi, c'est que C_1 et C_2 sont permutable.

Choisissons alors

$$\xi_0 = a'_1 C_1 + a'_2 C_2,$$

$$\tau_0 = b'_1 C_1 + b'_2 C_2,$$

de telle sorte que

$$\xi_1 = \xi_0 s, \quad \tau_1 = \tau_0 s^{-1};$$

ξ_1 et τ_1 sont, d'après nos conventions, les transformées de ξ_0 et τ_0 par la substitution linéaire $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$; s est une des racines de l'équation (2). D'après la théorie des substitutions linéaires, on peut toujours choisir les nombres a' et b' (qui seront généralement irrationnels et même imaginaires) de façon qu'il en soit ainsi; posons alors

$$S_0 = \mu \xi_0 + \rho \tau_0, \quad T_0 = \mu' \xi_0 + \rho' \tau_0.$$

On aura

$$\mu \xi_0 + \rho \tau_0 + h C_3 \equiv h C_3 + \mu s^h \xi_0 + \rho s^{-h} \tau_0$$

et

$$k(h C_3 + \mu \xi_0 + \rho \tau_0) \equiv kh C_3 + \mu \frac{s^{kh} - 1}{s^h - 1} \xi_0 + \rho \frac{s^{-kh} - 1}{s^{-h} - 1} \tau_0.$$

Cela posé, l'équivalence (λ) peut s'écrire

$$\mu(s^h - 1) = \mu'(s^h - 1),$$

$$\rho(s^{-h} - 1) = \rho'(s^{-h} - 1).$$

Si k et h ne sont pas divisibles par v , ces relations ne sont pas satis-

faites identiquement et nous pourrions poser

$$\mu = (s^h - 1)\varepsilon, \quad \mu' = (s^h - 1)\varepsilon, \quad \rho = (s^{-h} - 1)\zeta, \quad \rho' = (s^{-h} - 1)\zeta.$$

Mais alors

$$\begin{aligned} k(hC_3 + S_0) &\equiv khC_3 + \varepsilon(s^{kh} - 1)\xi_0 + \zeta(s^{-kh} - 1)\tau_0, \\ h(kC_3 + T_0) &\equiv khC_3 + \varepsilon(s^{kh} - 1)\xi_0 + \zeta(s^{-kh} - 1)\tau_0, \end{aligned}$$

ce qui montre que la puissance $k^{\text{ième}}$ de notre première substitution est identique à la puissance $h^{\text{ième}}$ de la seconde. Comme nous excluons ce cas, nous concluons que l'on doit avoir

$$a_3 \equiv b_3 \equiv 0 \pmod{\nu}.$$

Mais on peut aller plus loin; d'abord, si nous appelons C'_1 et C'_2 nos deux premières substitutions, nous pouvons les remplacer par

$$\omega_1 C'_1 + \omega_2 C'_2, \quad \omega'_1 C'_1 + \omega'_2 C'_2,$$

les ω étant des entiers tels que $\omega_1 \omega'_2 - \omega_2 \omega'_1 = 1$. Nous pouvons donc toujours supposer que

$$b_3 = 0$$

(sans quoi l'on remplacerait C'_1 et C'_2 par $\omega_1 C'_1 + \omega_2 C'_2$ et $\omega'_1 C'_1 + \omega'_2 C'_2$ en choisissant les ω de façon à annuler le nouveau b_3).

Mais le sous-groupe dérivé de C'_1 et de C'_2 , à cause de l'isomorphisme avec $(\alpha', \beta', \gamma', \delta')$, doit être permutable à toutes les substitutions du groupe et en particulier à C_3 .

Écrivons donc que la substitution

$$-C_3 + C'_2 + C_3$$

fait partie du sous-groupe dérivé de C'_1 et de C'_2 . Nous avons

$$\begin{aligned} C'_2 &= \mu' \xi_0 + \rho' \tau_0, \\ -C_3 + C'_2 + C_3 &= \mu' s \xi_0 + \rho' s^{-1} \tau_0. \end{aligned}$$

Pour que cette seconde substitution fasse partie de son groupe, il faut, si a_3 n'est pas nul, que cette dernière substitution soit un multiple de C'_2 .

Or, cela ne peut évidemment avoir lieu que si $s = s^{-1} = -1$.

Si on laisse ce cas de côté, on devra avoir

$$a_3 = b_3 = 0.$$

Si donc nous laissons de côté le cas où

$$\alpha + \delta = \pm 2$$

[substitutions paraboliques et substitution $(-1, 0, 0, -1)$], nous devrons avoir

$$a_3 = b_3 = 0.$$

J'ajoute que c_3 devra être égal à 1, sans quoi les combinaisons des trois substitutions fondamentales

$$\begin{aligned} a_1 C_1 + a_2 C_2 &\equiv C'_1, \\ b_1 C_1 + b_2 C_2 &\equiv C'_2, \\ c_3 C_3 + c_1 C_1 + c_2 C_2 &\equiv C'_3 \end{aligned}$$

ne pourraient pas reproduire toutes les substitutions

$$m_3 C_3 + m_1 C_1 + m_2 C_2$$

du groupe $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$, mais seulement celles où l'entier m_3 serait divisible par c_3 .

Maintenant toute substitution du groupe $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ doit pouvoir être mise sous la forme

$$m_3 C'_3 + m_1 C'_1 + m_2 C'_2.$$

Pour que C_1 puisse être mis sous la forme, il faut d'abord que m_3 soit nul; et ensuite que l'on ait identiquement

$$C_1 = m_1 (a_1 C_1 + a_2 C_2) + m_2 (b_1 C_1 + b_2 C_2),$$

et de même

$$C_2 = m'_1(a_1 C_1 + a_2 C_2) + m'_2(b_1 C_1 + b_2 C_2).$$

Comme les m et les m' sont entiers, j'en conclurai que le déterminant

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = 1.$$

Mais j'ai dit plus haut que l'on pouvait remplacer C'_1 et C'_2 par

$$\omega_1 C'_1 + \omega_2 C'_2, \quad \omega'_1 C'_1 + \omega'_2 C'_2.$$

Si $a_1 b_2 - a_2 b_1$ est égal à 1, nous pourrions choisir les ω de telle façon que

$$\omega_1 C'_1 + \omega_2 C'_2 = C_1, \quad \omega'_1 C'_1 + \omega'_2 C'_2 = C_2,$$

c'est-à-dire que nous pourrions toujours supposer

$$a_1 = b_2 = 1, \quad a_2 = b_1 = 0.$$

Mais alors l'équivalence (1 bis) :

$$C'_1 + C'_3 = C'_3 + \alpha' C'_1 + \gamma' C'_2$$

devient

$$C_1 + C_3 = C_3 + \alpha' C_1 + \gamma' C_2,$$

d'où

$$\alpha = \alpha', \quad \gamma = \gamma';$$

on trouverait de même

$$\beta = \beta', \quad \delta = \delta'.$$

Nous devons donc conclure que les deux groupes $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ et $(\alpha', \beta', \gamma', \delta')$ ne peuvent être isomorphes que si l'on peut passer de l'un à l'autre en changeant C'_1 et C'_2 en

$$\omega_1 C'_1 + \omega_2 C'_2, \quad \omega'_1 C'_1 + \omega'_2 C'_2.$$

Cela peut s'énoncer d'une autre manière.

Soit

$$S = \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix}$$

une substitution linéaire à coefficients entiers et telle que

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1.$$

Soit

$$T = \begin{vmatrix} \omega_1 & \omega_2 \\ \omega'_1 & \omega'_2 \end{vmatrix}$$

une autre substitution linéaire à coefficients entiers et telle que

$$\omega_1\omega'_2 - \omega'_1\omega_2 = 1.$$

La substitution

$$T^{-1}ST,$$

qui s'appelle la *transformée* de S par T , est aussi linéaire à coefficients entiers et a pour déterminant 1.

Si deux substitutions linéaires S et S' à coefficients entiers et de déterminant 1 sont transformées l'une de l'autre par une substitution de la forme T , je dirai que S et S' appartiennent à la même classe.

Il est clair d'abord que S et S' ne peuvent appartenir à la même classe que si la somme $\alpha + \delta$ a la même valeur pour l'une et pour l'autre, mais cette condition n'est pas suffisante et à une même valeur entière de $\alpha + \delta$ correspondront plusieurs classes de substitutions linéaires, de la même façon qu'à un même déterminant correspondent plusieurs classes de formes quadratiques.

Ainsi la condition nécessaire et suffisante pour que les deux groupes $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$, $(\alpha', \beta', \gamma', \delta')$ soient isomorphes, c'est que les deux substitutions linéaires $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$, $(\alpha', \beta', \gamma', \delta')$ appartiennent à la même classe.

Nous avons laissé de côté le cas où

$$\alpha + \delta = \pm 2.$$

Si $\alpha + \delta = 2$, la substitution $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ sera de la même classe que $(1, h, 0, 1)$; le groupe $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ sera isomorphe à $(1, h, 0, 1)$.

Celui-ci contient une substitution remarquable C_2 , qui n'est multiple d'aucune autre et qui est permutable à toutes les substitutions du groupe. On voit d'ailleurs sans peine que, si h n'est pas nul, C_2 est la seule substitution qui jouisse de cette propriété.

Nous pouvons d'ailleurs laisser de côté le cas où h est nul, car le groupe $(1, 0, 0, 1)$, dont toutes les substitutions sont permutables deux à deux, ne peut être évidemment isomorphe à aucun autre groupe $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$.

Si $\alpha + \delta = -2$, le groupe $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ sera isomorphe à $(-1, h, 0, -1)$. Celui-ci contient une substitution remarquable C_2 , qui n'est multiple d'aucune autre, qui n'est pas permutable à toutes les substitutions du groupe, mais qui est permutable *au double* de toutes ces substitutions. Si h n'est pas nul, C_2 est la seule substitution qui jouisse de cette propriété. Si, au contraire, h est nul, il y en a une infinité, ce qui prouve déjà que $(-1, 0, 0, -1)$ ne peut être isomorphe à $(-1, h, 0, -1)$.

De même, la présence de cette substitution remarquable C_2 dans $(1, h, 0, 1)$ et l'absence de toute substitution jouissant de la même propriété dans $(-1, h', 0, -1)$ montrent que ces deux groupes ne sauraient être isomorphes.

Il me reste deux questions à résoudre :

1° Les groupes $(1, h, 0, 1)$ et $(1, h', 0, 1)$ ou $|h| \geq 0$, $|h'| \geq 0$, $|h| \geq |h'|$, peuvent-ils être isomorphes?

2° Même question pour les groupes $(-1, h, 0, -1)$, $(-1, h', 0, -1)$.

Commençons par la première question.

J'observe d'abord que, C_2 étant la seule substitution du premier groupe qui jouisse de la propriété caractéristique énoncée plus haut, on devra avoir

$$C'_2 \equiv C_2$$

(ou $C'_2 \equiv -C_2$, mais alors on changerait C'_1 et C'_2 en $-C'_1$ et $-C'_2$).

Maintenant, pour que l'on puisse, en combinant

$$C'_1 \equiv a_3 C_3 + a_1 C_1 + a_2 C_2,$$

$$C'_2 \equiv C_2,$$

$$C'_3 \equiv c_3 C_3 + c_1 C_1 + c_2 C_2,$$

retrouver toutes les substitutions du premier groupe, il faut que

$$a_3 c_1 - c_3 a_1 = 1.$$

On démontre alors aisément que

$$C'_1 + C'_3 \equiv C'_3 + C'_1 + h C'_2,$$

ce qui prouve que les deux groupes ne peuvent être isomorphes, que si

$$h = \pm h'.$$

Passons à la seconde question.

On verrait, comme tout à l'heure, que l'on doit avoir

$$C'_2 \equiv C_2,$$

$$a_3 c_1 - c_3 a_1 = 1$$

Il vient ensuite

$$C'_1 + C'_3 \equiv (a_3 + c_3) C_3 + (c_1 + a_1 \varepsilon) C_1 + (c_2 + a_2 \varepsilon - a_1 c_3 h \varepsilon) C_2,$$

où

$$\varepsilon = (-1)^{c_3}$$

et

$$\begin{aligned} C'_3 - C'_1 \equiv & (c_3 - a_3) C_3 + (c_1 - a_1) \varepsilon' C_1 \\ & + [(c_2 - a_2) \varepsilon' + (a_1 + c_1) a_3 \varepsilon' h] C_2, \end{aligned}$$

où

$$\varepsilon' = (-1)^{a_3}.$$

Si l'on veut que

$$C'_1 + C'_3 \equiv C'_3 - C'_1 + h' C'_2,$$

il faut que

$$a_3 = 0, \quad \varepsilon' = 1, \quad \varepsilon = -1, \quad a_1 c_3 = -1, \quad h = h'.$$

Donc nos deux groupes ne pourront être isomorphes que si

$$h = \pm h'.$$

Le résultat énoncé plus haut est donc général et s'étend aux substitutions paraboliques.

Si les deux substitutions linéaires $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$, $(\alpha', \beta', \gamma', \delta')$ ne sont pas de la même classe, les deux groupes correspondants ne peuvent être isomorphes.

Il résulte de cette longue discussion que les différents groupes $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ peuvent donner naissance à une infinité de variétés fermées V distinctes, c'est-à-dire non homéomorphes. Or, le nombre P_1 ne peut prendre que l'une des trois valeurs 2, 3 ou 4.

Pour que deux variétés fermées soient homéomorphes, il ne suffit donc pas qu'elles aient mêmes nombres de Betti.

C'est ce que nos autres exemples mettent également en évidence.

Dans le troisième exemple, le groupe G se réduit à huit substitutions et dans le cinquième exemple, à deux substitutions seulement.

Considérons, au contraire, l'hypersphère

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1;$$

c'est une variété dont le groupe G se réduit à une seule substitution, la substitution identique.

Voilà donc trois variétés, dont les groupes G sont d'ordre fini; mais ces groupes ne sont pas isomorphes; de sorte que ces variétés ne seront

pas homéomorphes; et cependant elles auront mêmes nombres de Betti :

$$P_1 = P_2 = 1.$$

Il paraîtra naturel de restreindre le sens du mot *simplement connexe* et de le réserver aux variétés, dont le groupe G se réduit à la substitution identique.

Alors une variété fermée de plus de deux dimensions pourra avoir son groupe G d'ordre fini sans être simplement connexe.

Cela n'arriverait pas avec les variétés de deux dimensions : leur groupe G ne pouvait être d'ordre fini sans se réduire à une seule substitution.

Nous avons vu pourquoi un groupe fuchsien, qui admet un cycle de sommets dont la somme des angles est égale à $\frac{2\pi}{n}$ ($n > 1$), ne peut être le groupe G d'une variété fermée à deux dimensions.

Il en est de même pour la même raison de tout groupe d'ordre fini ou plus généralement de tout groupe contenant une substitution, dont une puissance entière se réduit à la substitution identique.

Il pourrait être intéressant de traiter les questions suivantes :

1° Étant donné un groupe G défini par un certain nombre d'équivalences fondamentales, peut-il donner naissance à une variété fermée à n dimensions?

2° Comment doit-on s'y prendre pour former cette variété?

3° Deux variétés d'un même nombre de dimensions, qui ont même groupe G , sont-elles toujours homéomorphes?

Ces questions exigeraient de difficiles études et de longs développements. Je n'en parlerai pas ici.

Je veux toutefois attirer l'attention sur un point.

Riemann a rattaché l'étude des courbes algébriques à celle des variétés à deux dimensions au point de vue de l'*Analysis Situs*.

De même, l'étude des surfaces algébriques se rattache à celle des variétés à quatre dimensions. Ces variétés ont trois nombres de Betti :

$$P_1 = P_3 \quad \text{et} \quad P_2.$$

M. Picard a montré que si la surface algébrique est la plus générale de son degré, le nombre P_1 se réduit à 1; il ne prend une valeur plus grande que 1 que dans certains cas particuliers. La connexion multiple se présentait ainsi comme un cas particulier de la connexion simple.

Ce résultat semble paradoxal; peut-être nous le paraîtra-t-il un peu moins maintenant; un groupe G peut être beaucoup plus complexe qu'un autre groupe G' et cependant correspondre à une valeur plus petite du nombre P_1 .

§ 15. — AUTRES MODES DE GÉNÉRATION.

On peut donner des variétés d'autres définitions, qui sont, pour ainsi dire, intermédiaires entre les deux premières.

Par exemple, on peut envisager une variété V formée de l'ensemble des points qui satisfont à certaines inégalités et aux équations

[illegible]

où les x sont des coordonnées d'un point et les y des paramètres arbitraires; le nombre des dimensions de V est alors $n - p + q$.

On peut aussi adjoindre aux équations (1) les relations

$$\varphi_\alpha(y_1, y_2, \dots, y_\sigma) = 0 \quad (\alpha = 1, 2, \dots, \lambda)$$

entre les y . Les y ne sont plus alors des paramètres entièrement arbitraires, et le nombre des dimensions de V devient égal à $n - p + q - \lambda$.

On peut encore envisager une variété V définie par certaines inégalités et par les relations

$$(2) \quad x_i = \theta_i(y_1, y_2, \dots, y_p) \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

les y étant des paramètres liés par λ équations

$$\varphi_\alpha(y_1, y_2, \dots, y_p) = 0 \quad (\alpha = 1, 2, \dots, \lambda).$$

Le nombre des dimensions de V est alors $p - \lambda$.

Considérons un instant $y_1, y_2, \dots, y_p$ comme les coordonnées d'un point P dans l'espace à p dimensions. Les égalités

$$\varphi_\alpha = 0$$

définiront alors dans cet espace à p dimensions une certaine variété W .

A chaque point de W correspondra un point de V , puisque les équations (2) expriment les x en fonction des y .

Le cas le plus simple est celui où, réciproquement, à un point de V correspond un seul point de W . Mais un cas, qui est aussi très intéressant, est le suivant.

Supposons que la variété W demeure inaltérée, quand les y subissent les substitutions d'un certain groupe G . Soient P un point de W , $P_1, P_2, \dots, P_h$ les transformées de P par les substitutions de G .

L'ensemble des points $P, P_1, P_2, \dots, P_h$ formeront ce que j'appellerai un *système de points*.

Si les fonctions θ_i ne sont pas altérées par les substitutions de G , il est clair qu'aux divers points d'un même système correspondra un même point de V .

Le cas intéressant est celui où à un point de V correspond un seul système de points de W .

Étant donnée une variété W et un groupe G qui ne l'altère pas, on peut toujours construire une variété V , de telle façon qu'à tout point de V corresponde un système de points de W et un seul.

Pour que V soit bilatère, il faut et il suffit que la variété W soit bilatère et que toutes les substitutions de G jouissent de la propriété suivante.

Soient $y_1, y_2, \dots, y_p$ les coordonnées de P , $y'_1, y'_2, \dots, y'_p$ celles de son transformé; le déterminant fonctionnel des y' par rapport aux y doit être positif.

Septième exemple.

Soit

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 1$$

l'équation de la variété W , qui sera ainsi une sphère dans l'espace ordinaire.

Cette sphère n'est pas altérée, quand on change y_1, y_2, y_3 en $-y_1, -y_2, -y_3$. Ce sera là notre groupe G .

Si alors nous posons, par exemple,

$$\begin{aligned} x_1 &= y_1^2, & x_2 &= y_2^2, & x_3 &= y_3^2, \\ x_4 &= y_2 y_3, & x_5 &= y_1 y_3, & x_6 &= y_1 y_2, \end{aligned}$$

les x ne changeront pas, quand les y changeront de signe, et nous aurons défini une variété V à deux dimensions dans l'espace à 6 dimensions.

Cette variété sera fermée; elle sera *unilatère*.

Soit, en effet, P un point de W , dont les coordonnées seront y_1, y_2, y_3 . Pour définir la position de ce point sur la sphère W , il suffira de connaître deux de ces coordonnées, par exemple y_1 et y_2 ; car l'équation de la sphère nous fait connaître y_3 en fonction de y_1 et y_2 .

Son transformé P' , dont les coordonnées sont $-y_1, -y_2$ et $-y_3$, est diamétralement opposé. Mais il ne faut pas se servir, pour définir la position du point P , de y_1 et de y_2 , parce que y_3 n'est pas une fonction uniforme de ces deux variables. Il vaut mieux poser

$$\begin{aligned} y_1 &= \cos \varphi \sin \theta, \\ y_2 &= \sin \varphi \sin \theta, \\ y_3 &= \cos \theta. \end{aligned}$$

Les coordonnées du point P dans ce nouveau système sont φ et θ ; celles de P' sont $\varphi + \pi$ et $\pi - \theta$. On voit alors que

$$\frac{\partial(\varphi + \pi, \pi - \theta)}{\partial(\varphi, \theta)} = -1 < 0.$$

La variété V est donc unilatère.

Huitième exemple.

Soient $y_1, y_2, \dots, y_q; z_1, z_2, \dots, z_q$, $2q$ paramètres liés par les relations

$$(3) \quad \begin{cases} y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_q^2 = 1, \\ z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_q^2 = 1. \end{cases}$$

Si nous regardons ces $2q$ paramètres comme les coordonnées d'un point dans l'espace à $2q$ dimensions, ces équations (3) représenteront une variété fermée W à $2q - 2$ dimensions.

Si nous regardons $y_1, y_2, \dots, y_q$ et $z_1, z_2, \dots, z_q$ comme les coordonnées de deux points Q et Q' dans l'espace à q dimensions, ces deux points devront se trouver tous deux sur l'*hypersphère* S qui a pour équation

$$y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_q^2 = 1,$$

et qui est une variété fermée à $q - 1$ dimensions.

A chaque couple de points de S correspondra ainsi un point de W et un seul et inversement, *pourvu que je convienne de regarder les deux couples de points QQ' et $Q'Q$ comme distincts.*

Considérons maintenant les $\frac{q(q+3)}{2}$ combinaisons

$$y_i + z_i, \quad y_i z_i, \quad y_i z_k + y_k z_i \quad (i, k = 1, 2, \dots, q),$$

égalons-les à $\frac{q(q+3)}{2} = n$ variables

$$x_1, \quad x_2, \quad \dots, \quad x_n.$$

Nous aurons ainsi défini une variété V à $2q - 2$ dimensions dans l'espace à n dimensions.

Quand on change y_i en z_i et z_i en y_i (c'est-à-dire quand on permute les deux points Q et Q'), ces $\frac{q(q+3)}{2}$ combinaisons ne changent pas.

A chaque couple de points de l'hypersphère correspond ainsi un point et un seul de la variété V et inversement, mais *à la condition de ne pas regarder comme distincts les deux couples QQ' et $Q'Q$.*

Cette variété V est-elle fermée? Je vais montrer qu'elle ne l'est pas pour $q = 2$ et qu'elle l'est pour $q > 2$.

On a alors

$$\begin{aligned}x_1 &= y_1 + z_1, & x_2 &= y_1 z_1, & x_3 &= y_2 + z_2, \\x_4 &= y_2 z_2, & x_5 &= y_1 z_2 + y_2 z_1.\end{aligned}$$

On reconnaît alors que l'on doit avoir pour que les y et les z soient réels

$$x_1^2 > 4x_2, \quad x_3^2 > 4x_4.$$

On aurait des inégalités analogues pour $q > 2$; mais dans quels cas ces inégalités définissent-elles une véritable frontière pour notre variété V ?

Pour mieux nous en rendre compte, je vais traiter d'abord un exemple plus simple.

Soit d'abord, dans l'espace ordinaire, le cercle

$$x^2 + y^2 = 1, \quad z = 0.$$

Si l'on convient de ne conserver que les points de cette droite pour lesquels y est positif, alors nous aurons les relations suivantes :

$$x^2 + y^2 = 1, \quad z = 0, \quad y > 0,$$

qui définiront une variété à une dimension (qui, dans ce cas, est une demi-circonférence).

Cette variété n'est pas fermée, elle admet deux points frontières :

$$x = \pm 1, \quad y = z = 0.$$

Considérons au contraire la surface suivante :

$$(4) \quad x^2 + y^2 - z^2 + (x^2 + y^2 + z^2)^2 = 0.$$

C'est la surface engendrée par la révolution d'une lemniscate autour de son grand axe. Elle se compose de deux nappes distinctes N_1 et N_2 ayant un point conique commun qui est l'origine; on ne peut aller d'une nappe à l'autre qu'en passant par l'origine. Adjoignons alors à l'équation (4) l'inégalité

$$(5) \quad z > 0.$$

Les relations (4) et (5) définissent une variété à deux dimensions qui n'est autre chose que la nappe N_1 . Cette variété doit être regardée comme fermée; elle est homéomorphe à une sphère; on ne doit pas regarder le point conique

$$x = y = z = 0$$

comme un véritable point frontière.

En général, si une variété à p dimensions n'est pas fermée, sa frontière sera formée par une ou plusieurs variétés à $p - 1$ dimensions. Si l'ensemble des points qu'on peut soupçonner d'être des points frontières forme une ou plusieurs variétés à moins de $p - 1$ dimensions, c'est qu'ils ne sont pas de véritables points frontières au point de vue qui nous occupe actuellement, et que la variété donnée est fermée.

Or, on obtiendra ici les points qu'on peut soupçonner d'être frontières, quand on supposera que les points Q et Q' se confondent, c'est-à-dire que

$$y_1 = z_1, \quad y_2 = z_2, \quad \dots, \quad y_q = z_q.$$

On obtiendra ainsi une variété à $q - 1$ dimensions. Ainsi la frontière complète de V n'aura que $q - 1$ dimensions, tandis que V en a $2q - 2$. V sera donc fermée, à moins que

$$2q - 2 = (q - 1) + 1$$

ou

$$q = 2.$$

Pour mieux nous en rendre compte, comparons les deux exemples $q = 2$ et $q = 3$.

Soit d'abord $q = 2$ et envisageons notre variété dans le voisinage du point

$$y_1 = z_1 = 0, \quad y_2 = z_2 = 1,$$

c'est-à-dire du point

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 2, \quad x_4 = 1, \quad x_5 = 0.$$

Observons d'abord que, pour les valeurs petites de x_1 et de x_2 , les trois autres variables x_3 , x_4 et x_5 sont développables suivant les puissances de x_1 et de x_2 ; il nous suffira donc d'étudier les variations de x_1 et de x_2 .

Nous voyons alors que x_1 et x_2 peuvent prendre toutes les valeurs qui satisfont à

$$x_1^2 > 4x_2,$$

Le plan des x_1, x_2 se trouve ainsi partagé en deux régions par la ligne

$$x_1^2 = 4x_2,$$

qui est une véritable ligne frontière.

On obtiendrait le même résultat si l'on étudiait la variété V dans le voisinage d'un autre point frontière quelconque. Cette variété n'est donc pas fermée.

Soit maintenant $q = 3$ et

$$\begin{aligned} x_1 &= y_1 + z_1, & x_2 &= y_1 z_1, & x_3 &= y_2 + z_2, & x_4 &= y_2 z_2, & x_5 &= y_1 z_2 + y_2 z_1, \\ x_6 &= y_3 + z_3, & x_7 &= y_3 z_3, & x_8 &= y_1 z_3 + y_3 z_1, & x_9 &= y_2 z_3 + y_3 z^2. \end{aligned}$$

Étudions la variété V dans le voisinage du point P_0 qui est tel que

$$y_1 = z_1 = y_2 = z_2 = 0, \quad y_3 = z_3 = 1,$$

d'où

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = x_8 = x_9 = 0, \quad x_6 = 2, \quad x_7 = 1.$$

Nous voyons que, dans le voisinage de ce point, x_6, x_7, x_8, x_9 sont développables suivant les puissances de x_1, x_2, x_3, x_4 et x_5 , de sorte qu'il suffit d'étudier les variations de ces cinq dernières variables.

Pour ne conserver que trois variables et rendre possible une représentation géométrique, je coupe ma variété V par la variété plane

$$x_1 = 0, \quad x_3 = 0,$$

de sorte que l'intersection sera une variété à deux dimensions V' .

Soient x_2, x_4 et x_5 les coordonnées d'un point de V' ; nous pourrions regarder ces trois variables comme les coordonnées d'un point dans l'espace ordinaire et nous aurons ainsi une représentation géométrique de la variété V' ou plutôt de la portion de cette variété qui est voisine de P_0 .

On trouve alors

$$y_1 = -z_1, \quad y_2 = -z_2,$$

puisque x_1 et x_3 sont supposés nuls, et par conséquent

$$x_2 = -y_1^2, \quad x_4 = -y_2^2, \quad x_5 = -2y_1y_2,$$

d'où

$$4x_2x_4 - x_5^2 = 0.$$

C'est l'équation d'un cône du second degré, mais une seule nappe de ce cône convient parce qu'on doit avoir

$$x_2 < 0, \quad x_4 < 0.$$

La portion du cône qui convient est ainsi séparée de celle qui ne convient pas par le sommet qui ne saurait être regardé comme un véritable point frontière. C'est ainsi que la variété V' , de même que V , est encore fermée.

On obtiendrait un résultat analogue en étudiant V dans le voisinage d'un autre point frontière, ou en coupant V par d'autres variétés planes que la variété

$$x_1 = x_2 = 0.$$

Je n'ai voulu donner qu'un exemple destiné à éclaircir le raisonnement qui précède.

En résumé, la variété V est fermée si $q > 2$ et ne l'est pas si $q = 2$.

La variété V est-elle unilatère ou bilatère?

Je me propose d'établir qu'elle est bilatère si q est impair et qu'elle est au contraire unilatère si q est pair.

Posons

$$\begin{aligned} y_1 &= \cos \theta_1, & z_2 &= \cos \theta'_1, \\ y_2 &= \sin \theta_1 \cos \theta_2, & z_2 &= \sin \theta'_1 \cos \theta'_2, \\ y_3 &= \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, & z_3 &= \sin \theta'_1 \sin \theta'_2 \cos \theta'_3, \\ &\dots\dots\dots, & &\dots\dots\dots, \\ y_{q-1} &= \sin \theta_1 \sin \theta_2 \dots \sin \theta_{q-2} \cos \theta_{q-1}, & z_{q-1} &= \sin \theta'_1 \sin \theta'_2 \dots \sin \theta'_{q-2} \cos \theta'_{q-1}, \\ y_q &= \sin \theta_1 \sin \theta_2 \dots \sin \theta_{q-2} \sin \theta_{q-1}, & z_p &= \sin \theta'_1 \sin \theta'_2 \dots \sin \theta'_{q-1} \sin \theta'_{q-1}. \end{aligned}$$

La position d'un point sur W est définie par les $2q - 2$ coordonnées

$$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{p-1}, \quad \theta'_1, \theta'_2, \dots, \theta'_{q-1}.$$

D'autre part, le groupe G se compose (outre la substitution identique) de l'unique substitution qui permute θ_i avec θ'_i . Pour que la variété V soit bilatère, il faut donc et il suffit que le déterminant fonctionnel

$$\frac{\partial(\theta_i, \theta'_i)}{\partial(\theta_i, \theta_i)}, \quad (i = 1, 2, \dots, q - 1)$$

soit positif. Or il est égal à

$$(-1)^{q-1},$$

c'est-à-dire à $+1$ si q est impair et à -1 si q est pair. Donc

V est bilatère si q est impair.

V est unilatère si q est pair. C. Q. F. D.

Occupons-nous maintenant de déterminer le nombre de Betti

$$P_{q-1}.$$

Déterminons d'abord les nombres de Betti pour W .

Nous pouvons construire sur W deux variétés à $q-1$ dimensions de la manière suivante. On sait que tout point de W correspond à un couple de points QQ' de l'hypersphère S . Aux couples Q_0Q' où Q_0 est fixe et où Q' décrit l'hypersphère tout entière correspondra alors une variété fermée U_1 à $q-1$ dimensions et faisant partie de W . De même aux couples QQ_0 , où Q décrit l'hypersphère entière pendant que Q_0 est fixe, correspondra une variété fermée U_2 à $q-1$ dimensions faisant partie de W .

Ces deux variétés seront linéairement indépendantes (au point de vue des homologies).

Considérons, en effet, l'intégrale d'ordre $q-1$

$$J = \int \sin^{q-2}\theta_1 \sin^{q-3}\theta_2 \dots \sin^2\theta_{q-3} \sin\theta_{q-1} d\theta_1 d\theta_2 \dots d\theta_{q-1},$$

et soit J' l'intégrale d'ordre $q-1$ obtenue en remplaçant dans J les θ_i par les θ'_i .

Envisageons ensuite l'intégrale

$$J + \lambda J',$$

où λ est un nombre incommensurable.

Nous connaissons les x en fonction des θ et des θ' ; réciproquement, nous pouvons calculer les θ et les θ' en fonctions des x et cela de telle sorte que l'intégrale $J + \lambda J'$ prenne la forme

$$\int \sum X dx,$$

X étant une fonction entière par rapport aux x , et δ le produit de $q - 1$ différentielles dx_i .

J'observe en outre que l'intégrale $J + \lambda J'$ est nulle quand elle est étendue à une variété fermée infiniment petite faisant partie de W .

Étendue à U_2 , elle est égale à σ (surface de l'hypersphère S) ; étendue à U_1 , elle est égale à $\lambda\sigma$; et comme il n'y a aucune relation linéaire entre σ et $\lambda\sigma$; c'est que U_1 et U_2 sont linéairement indépendantes.

Le nombre de Betti P_{q-1} est donc au moins égal à 3.

Pour aller plus loin, considérons la variété W' obtenue en supprimant dans W tous les points des deux variétés U_1 et U_2 ; je me propose d'établir que W' est simplement connexe.

Considérons de même la variété S' en supprimant, dans l'hypersphère S , le point Q_0 . A tout couple de points QQ' de la variété S' correspondra un point de W' et réciproquement.

Mais S' est homéomorphe au domaine D ,

$$\eta_1^2 + \eta_2^2 + \dots + \eta_{q-1}^2 < 1,$$

faisant partie de l'espace à $q - 1$ dimensions où les coordonnées sont désignées par $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{q-1}$.

C'est ainsi que la surface d'une sphère ordinaire, quand on en supprime un point, devient homéomorphe à la surface d'un cercle.

A chaque couple de points du domaine D correspondra un point de W' , d'où il suit que W' est homéomorphe au domaine Δ défini par les inégalités

$$\begin{aligned} \eta_1^2 + \eta_2^2 + \dots + \eta_{q-1}^2 &< 1, \\ \zeta_1^2 + \zeta_2^2 + \dots + \zeta_{q-1}^2 &< 1, \end{aligned}$$

et situé dans l'espace à $2q - 2$ dimensions, où les coordonnées sont désignées par η_i et ζ_i .

Or le domaine Δ est simplement connexe parce qu'il est convexe. Soit, en effet, ν une variété fermée d'un nombre quelconque de dimensions et faisant partie de Δ ; je dis qu'on peut, en la déformant d'une manière con-

tinue, la réduire à un point sans qu'elle sorte de Δ . Construisons une variété ν' en multipliant par un facteur positif k plus petit que 1 les coordonnées de tous les points de ν (la variété ν' sera homothétique à ν , le centre d'homothétie étant l'origine, et le rapport d'homothétie étant égal à k). La variété ν' sera tout entière à l'intérieur de Δ et, quand k décroîtra de 1 à 0; elle coïncidera d'abord avec ν et finira par se réduire à un point.

C. Q. F. D.

Donc Δ et par conséquent W' sont simplement connexes. Déterminons maintenant les nombres de Betti pour W et d'abord le nombre P_h où $h < q - 1$. Considérons donc une variété fermée à h dimensions contenue dans W ; cette variété, qu'elle rencontre ou non U_1 et U_2 , peut toujours être regardée comme homologue à une variété fermée à h dimensions, ne rencontrant ni U_1 ni U_2 ; celle-ci sera homologue à 0 dans W' (puisque W' est simplement connexe) et *a fortiori* dans W .

Ainsi P_h est égal à 1.

Comme, d'autre part, les nombres de Betti également distincts des extrêmes sont égaux, P_h sera encore égal à 1 si h est plus grand que $q - 1$.

Il reste à déterminer P_{q-1} .

Considérons une variété fermée ν à $q - 1$ dimensions, faisant partie de W .

Si elle ne rencontre ni U_1 , ni U_2 , elle sera homologue à 0; en effet, elle fait partie de W' , et par conséquent sera homologue à 0 par rapport à W' et *a fortiori* par rapport à W .

Supposons qu'elle rencontre U_1 et U_2 .

Les points de W , qui correspondront au couple $Q_1 Q'_1$, où Q_1 est fixe et où Q'_1 décrit l'hypersphère entière, formeront une variété U'_1 , qui sera homologue à U_1 . Par tout point de W passe une variété U'_1 et une seule.

Les points de W qui correspondent au couple $Q Q_2$, où Q_2 est fixe et où Q décrit l'hypersphère entière formeront une variété U'_2 , qui sera homologue à U_2 . Par tout point de W passe une variété U'_2 et une seule.

Deux variétés U'_1 et U'_2 ont un point commun et un seul (à savoir le point qui correspond au couple $Q_1 Q_2$). Au contraire, deux variétés U'_1 (ou deux variétés U'_2) ne se rencontrent pas.

Cela posé, revenons à la variété v et supposons, pour fixer les idées, qu'elle coupe U_1 en deux points M' et M'' et U_2 en un point N' . Par le point M' je puis faire passer une variété U'_1 , par le point M'' une variété analogue U''_1 ; par le point N' une variété U'_2 .

Je puis ensuite, en déformant infiniment peu la variété v , m'arranger pour qu'elle ne coupe toujours U_1 et U_2 qu'aux points M' , M'' et N' , et pour qu'elle admette autour de M' une petite partie commune u'_1 avec U'_1 ; autour de M'' une petite partie commune u''_1 avec U''_1 ; autour de N' une petite partie commune u'_2 avec U'_2 .

Alors l'ensemble des variétés

$$U'_1 - u'_1, \quad U'_2 - u'_2, \quad U''_1 - u''_1, \quad v - u'_1 - u'_2 - u''_1$$

formera une variété fermée, qui ne rencontrera ni U_1 , ni U_2 , et qui sera, par conséquent, homologue à 0; on aura donc

$$U'_1 - u'_1 + U'_2 - u'_2 + U''_1 - u''_1 \sim v - u'_1 - u'_2 - u''_1,$$

d'où

$$v \sim U'_2 + U'_1 + U''_1 \sim U_1 + 2U_2.$$

Il pourrait aussi se faire que, par exemple, le nombre que nous avons appelé plus haut $S(M)$ n'ait pas la même valeur pour le point M' considéré comme point d'intersection de v et de U_1 , ou pour le point M' considéré comme point d'intersection de U'_1 et de U_1 . Dans ce cas, il faudrait remplacer U'_1 par la variété opposée et l'on aura

$$v \sim U'_1 - U'_2 + U''_1 \sim U_1.$$

Dans tous les cas, v , U_1 et U_2 ne seront pas linéairement indépendants et l'on aura

$$P_{q-1} = 3.$$

Déterminons enfin les nombres de Betti pour V .

Aux couples QQ' et $Q'Q$ correspond un seul et même point de V ; il

en résulte qu'à U_1 et à U_2 correspond dans V une seule et même variété, de sorte que je puis écrire

$$U_1 \sim U_2.$$

D'autre part, l'intégrale $J + J'$, étendue à cette variété, n'est pas nulle; ce qui montre que l'on n'a pas

$$U_1 \sim 0.$$

Le nombre P_{q-1} est donc au moins égal à 2.

A toute variété fermée v , faisant partie de V , correspondra une variété ω faisant partie de W ; mais deux cas peuvent se présenter; nous savons qu'à chaque point de V correspondent deux points de W ; et je pourrai dire, pour abréger le langage, que ces deux points sont *symétriques*, puisqu'on passe de l'un à l'autre en permutant les y_i avec les z_i .

Nous construirons ω en prenant pour chaque point de v *un* des deux points qui lui correspondent dans ω ; il pourra se faire alors ou bien que ω soit fermé ou bien que ω ne soit pas fermé, mais que sa frontière se compose de parties symétriques deux à deux.

Considérons d'abord le cas où ω est fermé.

Si le nombre des dimensions est différent de $q - 1$, ω (et, par conséquent, v) pourra, par déformation continue, se réduire à un point et l'on aura

$$v \sim 0.$$

Si le nombre des dimensions est égal à $q - 1$, on aura, par rapport à W ,

$$\omega \sim mU_1 + nU_2,$$

m et n étant entiers; mais par rapport à V , U_1 est homologue à U_2 .

On aura donc, par rapport à V ,

$$v \sim (m + n)U_1.$$

Considérons maintenant le cas où ω n'est pas fermé. Nous admettrons

que le nombre des dimensions est inférieur ou égal à $q - 1$; le cas où ce nombre serait supérieur à $q - 1$ s'y ramène aisément, puisque les nombres de Betti sont égaux deux à deux. La frontière f de ω aura alors moins de $q - 1$ dimensions.

Soit H la variété à $q - 1$ dimensions, faisant partie de W , qui se compose des points qui sont leur propre symétrique, c'est-à-dire des points

$$y_i = z_i.$$

La frontière f peut se déformer d'une manière continue, sans que ses points cessent d'être symétriques deux à deux, et de telle sorte qu'à la fin de la déformation la frontière déformée fasse partie de H .

Donc ω peut se déformer d'une manière continue, sans cesser de correspondre à une variété ν fermée, et de telle sorte qu'à la fin de la déformation la variété ω déformée soit fermée.

Donc ν est toujours homologue à une variété ν correspondant à une variété ω fermée.

Donc on a, suivant les cas,

$$\nu \sim 0, \quad \nu \sim (m + n) U_1.$$

Donc tous les nombres de Betti de V sont égaux à 1, sauf P_{q-1} qui est égal à 2.

De là deux conséquences :

1° Soit q impair, V sera bilatère; d'où il suit que, pour une variété bilatère à $4k$ dimensions, le nombre P_{2k} n'est pas forcément impair.

2° Si q est pair, V sera unilatère; d'où il suit que, pour une variété unilatère à $4k + 2$ dimensions, le nombre P_{2k+1} n'est pas forcément impair, ainsi que cela aurait lieu pour une variété bilatère.

J'avais annoncé ces résultats à la fin du n° 9.

§ 16. — THÉORÈME D'EULER.

On connaît le théorème d'Euler, d'après lequel, si S , A et F sont le nombre des sommets, des arêtes et des faces d'un polyèdre convexe, on doit avoir

$$S - A + F = 2.$$

Ce théorème a été généralisé par M. l'amiral de Jonquières, pour le cas des polyèdres non convexes. Si un polyèdre forme une variété fermée à deux dimensions, dont le nombre de Betti est P_1 , on aura

$$S - A + F = 3 - P_1.$$

Le fait que les faces sont planes n'a évidemment aucune importance, le théorème s'applique également aux polyèdres curvilignes; il s'applique encore à la subdivision d'une surface fermée quelconque en régions simplement connexes; ces régions correspondent alors aux faces du polyèdre; les lignes, qui servent de frontière à deux de ces régions, correspondent aux arêtes, et les extrémités de ces lignes aux sommets.

Je me propose de généraliser ces résultats pour un espace quelconque.

Soit donc V une variété fermée à p dimensions. Subdivisons-la en un certain nombre de variétés ν_p à p dimensions; ces variétés ν_p ne seront pas fermées et leurs frontières seront formées par un certain nombre de variétés ν_{p-1} à $p - 1$ dimensions; les frontières des ν_{p-1} seront formées à leur tour par un certain nombre de variétés ν_{p-2} à $p - 2$ dimensions, et ainsi de suite; j'arriverai ensuite à un certain nombre de variétés ν_1 à une dimension, qui auront pour frontières un certain nombre de points isolés ou de variétés à 0 dimension que j'appellerai ν_0 .

La variété V peut avoir des nombres de Betti quelconques, mais je suppose expressément que les variétés $\nu_p, \nu_{p-1}, \dots, \nu_1$ sont simplement connexes.

J'appellerai $\alpha_p, \alpha_{p-1}, \dots, \alpha_1$ et α_0 le nombre des ν_p , des $\nu_{p-1}, \dots$, des ν_1 et des ν_0 .

La figure formée par toutes ces variétés pourra s'appeler un polyèdre; car l'analogie avec les polyèdres ordinaires est évidente. Un polyèdre ordinaire est, en effet, une variété fermée V à 2 dimensions, qui est subdivisée en un certain nombre de variétés ν_2 , qui sont les faces. Les faces ont pour frontières un certain nombre de variétés ν_1 , qui sont les arêtes et qui admettent à leur tour pour frontières un certain nombre de variétés ν_0 appelées *sommets*.

Je me propose de calculer le nombre

$$N = \alpha_p - \alpha_{p-1} + \alpha_{p-2} - \dots \mp \alpha_1 \pm \alpha_0.$$

J'introduirai ici quelques dénominations nouvelles, peut-être mal justifiées, mais commodes.

Si deux polyèdres sont obtenus en subdivisant de deux manières différentes une variété V , je dirai qu'ils sont *congruents*.

Soit maintenant le polyèdre P formé par la variété V , par les régions ν_p et par leurs frontières successives $\nu_{p-1}, \dots, \nu_1, \nu_0$.

Subdivisons les ν_p en régions plus petites ν'_p ; les frontières complètes des ν'_p se composeront d'un certain nombre de régions nouvelles ν''_p , et, en outre, de régions ν'_{p-1} obtenues en subdivisant les ν_{p-1} ; les frontières complètes des ν'_{p-1} et des ν''_p se composeront d'un certain nombre de régions nouvelles ν''_{p-2} et, en outre, de régions ν'_{p-2} obtenues en subdivisant les ν_{p-2} , et ainsi de suite; nous arriverons enfin aux ν'_1 et aux ν''_1 , dont les frontières complètes se composeront d'un certain nombre de points nouveaux ν''_0 et, en outre, des points ν_0 .

Soit P' le polyèdre formé par l'ensemble des régions $\nu'_p, \nu'_{p-1}, \nu''_{p-1}, \nu'_{p-2}, \nu''_{p-2}, \dots, \nu'_1, \nu''_1, \nu_0, \nu''_0$.

Je dirai alors que le polyèdre P' est *dérivé* du polyèdre P .

J'éclaircirai cette définition par un exemple emprunté à la Géométrie ordinaire. Considérons un tétraèdre régulier T . Dans chacune des faces, je joins chaque sommet au milieu du côté opposé. Chaque face se trouvera ainsi décomposée en six triangles; en tout vingt-quatre triangles. Le polyèdre à vingt-quatre faces ainsi obtenu sera *dérivé* de T .

Soient maintenant P et P' deux polyèdres congruents, c'est-à-dire obtenus par deux modes de décomposition différents d'une même variété V ; il existera toujours un polyèdre P'' qui sera dérivé à la fois de P et de P' et qu'on obtiendra en combinant les deux modes de décomposition; de telle façon que, si nous appelons ν_p , ν'_p et ν''_p les subdivisions de V dans les trois modes de décomposition qui correspondent aux trois polyèdres P , P' et P'' , la condition nécessaire et suffisante pour que deux points appartiennent à la même région ν''_p , c'est qu'ils appartiennent à la fois à la même région ν_p et à la même région ν'_p .

Je me propose d'établir que le nombre N est le même pour deux polyèdres congruents et, comme nous venons de voir que deux polyèdres congruents ont toujours un dérivé commun, il nous suffira de montrer que le nombre N est le même pour un polyèdre et pour tous ses dérivés.

Si, dans le polyèdre P , nous envisageons une des régions ν_{p-1} , elle appartiendra toujours à deux régions ν_p et à deux seulement qu'elle séparera l'une de l'autre. Au contraire, une région ν_{p-2} appartiendra, en général, à plus de deux régions ν_p et à plus de deux régions ν_{p-1} . C'est ainsi que dans les polyèdres ordinaires, une arête sépare toujours deux faces l'une de l'autre, tandis qu'un sommet appartient en général à plus de deux faces et à plus de deux arêtes.

Nous n'excluons pas toutefois le cas où une région ν_{p-2} appartiendrait à deux régions ν_{p-1} seulement. Ainsi pour un polyèdre ordinaire, nous n'excluons pas le cas où le milieu d'une arête serait regardé comme un sommet et où cette arête serait par conséquent regardée comme formée de deux arêtes juxtaposées.

Les régions ν_{p-2} , qui n'appartiendraient ainsi qu'à deux régions ν_{p-1} , seront dites *singulières*. Soit donc ν_{p-2} une région singulière appartenant à deux régions ν_{p-1} que j'appelle ν'_{p-2} et ν''_{p-2} . Il est clair que ν'_{p-2} séparera l'une de l'autre les deux mêmes régions ν_p qui sont séparées par ν''_{p-2} ; de sorte que ν_{p-2} n'appartiendra aussi qu'à deux régions ν_p seulement.

De même je dirai que la variété ν_q est *singulière* si elle n'appartient qu'à deux variétés ν_{q+1} ; et dans ce cas elle n'appartiendra non plus qu'à deux variétés ν_{q+2} , ν_{q+3} , ..., ν_p .

Soit maintenant une variété v_h ; à cette variété appartiendront un certain nombre de variétés v_{h-1} ; si l'une d'elles est singulière, je dirai que la variété v_h est *irrégulière*; elle sera régulière dans le cas contraire.

Considérons donc le polyèdre P avec les régions $v_p, v_{p-1}, \dots$ et le polyèdre dérivé P' avec les régions $v'_p, v'_{p-1}, \dots$. Cherchons à remonter du polyèdre P' au polyèdre P. Soient deux régions v'_p que j'appellerai α et β ; je suppose qu'elles soient séparées l'une de l'autre par une région v'_{p-1} que j'appellerai γ ; qu'elles soient par conséquent contiguës et qu'elles fassent partie d'une même région v_p . (Comme α et β font partie d'une même région v_p , la région γ n'est pas une subdivision de l'une des régions v_{p-1} qui séparent les régions v_p les unes des autres; cette région γ est donc une de celles que j'avais appelées v''_p , dans la définition des polyèdres dérivés; mais ici je ne fais plus cette distinction et je désigne les variétés que j'avais appelées alors v''_p , aussi bien que celles que j'avais appelées alors v'_{p-1} par la même notation v'_{p-1} .)

Cela posé, supprimons la région γ , qui sert de frontière à α et à β , et *annexons* la région α à la région β . Nous aurons ainsi supprimé une région v'_p et une région v'_{p-1} . D'autre part, nous n'aurons supprimé aucune région v'_{p-2} si la région γ est régulière; si, en effet, aucune des régions v'_{p-2} n'est singulière, chacune d'elles appartiendra au moins à trois régions v'_{p-1} et, après la suppression de γ , elle appartiendra encore au moins à deux régions v'_{p-1} . De même toute région v'_q (où $q < p - 2$) faisant partie de γ appartiendra au moins à trois régions v'_{p-1} et, après la suppression de γ , elle appartiendra encore au moins à deux régions v'_{p-1} . La suppression de γ ne supprime donc aucune des régions v'_q ; *elle ne change donc pas la valeur du nombre N.*

Si au contraire la région γ est irrégulière, nous n'avons plus le droit de la supprimer, car il existera alors une région v'_{p-2} qui appartiendra seulement à γ et à une autre région v'_p ; après la suppression de γ , elle n'appartiendrait plus qu'à une seule région v'_{p-1} , ce qui est inadmissible.

Que faudra-t-il faire alors? La région γ sépare deux régions v_p que j'ai appelées α et β ; mais elle ne constitue pas à elle seule la frontière entre α et β ; en effet, comme γ est irrégulière, il existera une région v'_{p-2} singu-

lière que j'appellerai δ et qui appartiendra à γ et à une autre région ν'_{p-1} que j'appellerai γ' . Cette région γ' , d'après ce que nous avons vu plus haut, sépare les mêmes régions que γ , c'est-à-dire α et β .

Si la région δ est régulière, nous pourrons la supprimer et annexer γ à γ' . La région $\gamma + \gamma'$ séparera alors α de β . Nous aurons ainsi diminué α_{p-1} et β_{p-2} d'une unité, tandis que les autres nombres α_i n'auront pas changé. N n'aura donc pas changé non plus.

Si δ est irrégulière, il y aura une région ν'_{p-3} singulière que j'appellerai ε et qui la séparera d'une autre région δ' ; nous supprimerons ε et annexerons δ à δ' , et ainsi de suite.

Nous pourrons ainsi supprimer une région ν'_q , qui sépare l'une de l'autre deux régions ν'_{q+1} , et annexer ces deux régions ν'_{q+1} l'une à l'autre, mais à deux conditions :

- 1° Si q est plus petit que $p - 1$, il faut que la région ν'_q soit singulière ;
- 2° Et dans tous les cas, il faut qu'elle soit régulière.

Cela posé, voici dans quel ordre nous ferons les opérations :

Je veux remonter du polyèdre P' au polyèdre P . Je puis sans inconvénient supposer que le polyèdre P n'admet pas de région singulière, mais le polyèdre P' et les polyèdres intermédiaires en admettront.

Par une série de suppressions et d'annexions successives, nous remonterons de P' à P en passant par une série de polyèdres intermédiaires que j'appellerai

$$P_0 = P', P_1, P_2, \dots, P_{m-1}, P_m.$$

Comment passerons-nous du polyèdre P_i au polyèdre P_{i+1} ?

Si dans P_i il y a des ν'_0 singuliers, j'en supprimerai un. S'il n'y en a pas, tous les ν'_1 seront réguliers ; s'il y a des ν'_1 singuliers, j'en supprimerai un.

S'il n'y a pas de ν'_1 singulier, tous les ν'_2 seront réguliers ; s'il y a des ν'_2 singuliers, j'en supprimerai un.

Et ainsi de suite.

Si enfin il n'y a pas de ν'_{p-2} singulier, tous les ν'_p seront réguliers et l'on aura le droit de supprimer un quelconque d'entre eux ; si l'une des régions ν_p est subdivisée en plusieurs régions ν'_p , je choisirai deux de ces

régions ν'_p qui seront contiguës et séparées l'une de l'autre par une région ν'_{p-1} qui sera leur frontière commune; je les annexerai l'une à l'autre en supprimant cette frontière commune.

Aucune de ces opérations ne peut altérer le nombre N .

On ne sera arrêté que quand il n'y aura plus de région singulière et que, d'autre part, aucune des régions ν_p ne sera plus subdivisée en plusieurs régions ν'_p . Mais alors on sera arrivé au polyèdre P .

Aucune de ces opérations ne peut altérer le nombre N .

Ce nombre a donc la même valeur pour P et pour P' . C. Q. F. D.

Cette démonstration pourrait donner lieu à certaines objections, car on pourrait se demander si, dans cette série d'opérations, toutes les régions resteront simplement connexes; mais, avant de modifier notre démonstration de façon à me mettre à l'abri de ces objections, je veux déterminer quelle doit être la valeur du nombre N pour un polyèdre simplement connexe.

Si notre théorème est vrai, le nombre N doit avoir la même valeur pour deux polyèdres obtenus en subdivisant deux variétés homéomorphes; il a donc même valeur pour deux polyèdres simplement connexes quelconques.

Il nous suffira donc de faire cette détermination pour un polyèdre simplement connexe arbitrairement choisi.

Je choisirai le tétraèdre généralisé.

J'appelle ainsi le polyèdre formé par la frontière complète du domaine

$$\begin{aligned} x_1 > 0, \quad x_2 > 0, \quad \dots, \quad x_p > 0, \\ x_{p+1} > 0, \quad x_1 + x_2 + \dots + x_p + x_{p+1} < 0. \end{aligned}$$

On a alors

$$\begin{aligned} \alpha_p &= p + 2, \quad \alpha_{p-1} = \frac{(p+1)(p+2)}{2}, \quad \dots, \\ \alpha_q &= \frac{(p+2)!}{(q+2)!(p-q)!}, \quad \dots, \quad \alpha_1 = \frac{(p+1)(p+2)}{2}, \quad \alpha_0 = p + 2, \end{aligned}$$

c'est-à-dire que les nombres α_q sont égaux aux coefficients du binôme.

On aura donc

$$(1 - 1)^{p+2} = 1 - \alpha_p + \alpha_{p-1} - \dots \pm \alpha_1 \mp \alpha_0 \pm 1 = 1 - N \pm 1.$$

On doit prendre devant le dernier terme le signe $+$ si p est pair, et le signe $-$ si p est impair.

On aura donc $N = 2$ si p est pair, $N = 0$ si p est impair.

Je serais arrivé au même résultat en choisissant le cube généralisé. J'appelle ainsi le polyèdre formé par la frontière complète du domaine

$$-1 < x_i < 1, \quad (i = 1, 2, \dots, p+1).$$

On a alors

$$\alpha_p = 2(p+1), \quad \alpha_{p-1} = 2^2 \frac{p(p+1)}{2}, \quad \dots, \quad \alpha_q = 2^{p-p+1} \frac{(p+1)!}{(q+1)!(p-q)!}, \quad \dots,$$

$$\alpha_1 = 2^p(p+1), \quad \alpha_0 = 2^{p+1}.$$

d'où

$$(1 - 2)^{p+1} = 1 - \alpha_p + \alpha_{p-1} - \dots \pm \alpha_1 \mp \alpha_0 = 1 - N,$$

d'où

$$N = 1 - (-1)^{p+1},$$

c'est-à-dire

$$N = 2 \text{ si } p \text{ est pair,}$$

$$N = 0 \text{ si } p \text{ est impair.}$$

Ainsi, pour un polyèdre simplement connexe, le nombre N est égal à 2 si p est pair et à 0 si p est impair.

Cela posé, pour établir notre théorème d'une façon complète et rigoureuse, je vais supposer qu'il soit vrai pour les variétés de moins de p dimensions.

Considérons donc notre polyèdre P et une région v_q à q dimensions appartenant à ce polyèdre. Cette région v_q fera partie d'un certain nombre de régions v_{q+1} , d'un certain nombre de régions v_{q+2} , $\dots$, d'un certain nombre de régions v_p . L'ensemble de toutes ces régions formera ce que j'appellerai l'*aster* de v_q .

Je désignerai par γ_h le nombre des régions v_h ($h > q$) qui font ainsi partie de l'aster de v_q .

Soit $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ un point de v_q ; considérons l'hypersphère S qui a pour équation

$$(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2 + \dots + (x_n - x_n^0)^2 = \varepsilon^2,$$

ε étant très petit.

Soit Π la variété plane définie par les q équations

$$A_i^1(x_1 - x_1^0) + A_i^2(x_2 - x_2^0) + \dots + A_i^n(x_n - x_n^0) = 0, \\ (i = 1, 2, \dots, q),$$

où les A_i^k sont des constantes quelconques.

L'intersection de S, Π et V sera une variété à $p - q - 1$ dimensions que j'appellerai W et qui sera simplement connexe. Les intersections de S et Π avec les diverses régions qui forment l'aster de v_q formeront par leur ensemble un polyèdre dû à la subdivision de W et qui sera simplement connexe.

Pour ce polyèdre, le nombre α_h sera égal à γ_{h+q+1} ; comme il a moins de p dimensions, notre théorème lui sera applicable, de sorte que nous pourrons écrire

$$(A) \quad \gamma_p - \gamma_{p-1} + \dots \pm \gamma_{q+2} \mp \gamma_{q+1} = 2 \text{ ou } 0,$$

suivant que $p - q$ sera pair ou impair.

Définissons maintenant un polyèdre Q qui sera formé par une opération que l'on pourra appeler un *quadrillage*.

Soit V une variété à p dimensions située dans l'espace à n dimensions. Construisons une infinité de variétés planes définies par les équations

$$(B) \quad x_i = a_{k,i}, \\ (i = 1, 2, \dots, n; \quad K = -\infty, \dots, -1, 0, +1, +2, \dots, +\infty).$$

Ces variétés planes décomposeront l'espace en une infinité de domaines D_n assimilables à des parallélépipèdes rectangles. Les frontières des D_n seront formées par un certain nombre de domaines D_{n-1} à $n - 1$ dimensions faisant partie des diverses variétés planes $x_i = a_{k,i}$ et également assimilables à des parallélépipèdes rectangles. Les frontières des D_{n-1} seront formées par un certain nombre de domaines D_{n-2} assimilables à des parallélépipèdes rectangles dans l'espace à $n - 2$ dimensions, et ainsi de suite.

Alors le polyèdre Q sera défini de la façon suivante : les régions v_p seront formées par les intersections de V avec les domaines D_n , les régions v_{p-1} par les intersections de V avec les domaines D_{n-1} , et ainsi de suite ; enfin, les régions v_0 par les intersections de V avec les domaines D_{n-1} .

Il résulte de cette définition que le polyèdre Q n'admet pas de région singulière.

Je considérerai en outre un polyèdre P quelconque congruent à Q , et un polyèdre P' dérivé à la fois de P et de Q .

Je vais remonter, d'une part, de P' à P et, d'autre part, de P' à Q , et j'établirai que, dans ces deux opérations, le nombre N n'a pas changé.

Remontons d'abord de P' à P .

Soit $x_i = a$ une des variétés planes définies par l'équation (B). Classons les régions v'_q d'un nombre quelconque de dimensions qui composent le polyèdre P' en quatre sortes.

Celles de la première sorte sont celles qui font partie de la variété

$$x_i = a.$$

Celles de la deuxième sorte sont celles qui admettent des points tels que

$$x_i = a + \varepsilon,$$

ε étant positif et très petit.

Celles de la troisième sorte sont celles qui admettent des points tels que

$$x_i = a - \varepsilon.$$

Toutes les autres sont de la quatrième sorte.

Soient $\delta_q, \delta'_q, \delta''_q$ le nombre des variétés à q dimensions qui sont respectivement de la première, de la deuxième et de la troisième sorte.

Toute variété de la deuxième sorte sera contiguë à une variété de la troisième sorte et leur frontière commune sera une variété de la première sorte qui aura une dimension de moins. Les variétés des trois premières sortes se correspondent donc chacune à chacune et l'on a

$$\delta'_q = \delta''_q = \delta_{q-1}.$$

Il est clair d'ailleurs que $\delta'_0 = \delta''_0 = \delta_p = 0$.

Si dans l'ensemble des variétés planes (B) qui constituent le quadrillage et qui ont donné naissance aux polyèdres Q et P', on avait supprimé la variété $x_i = a$, on aurait obtenu deux polyèdres Q_i et P'_i plus simples que les premiers. Comparons P'_i à P'.

Quand on supprime la variété plane $x_i = a$, on supprime les variétés de la première sorte et l'on *annexe* chaque variété de la troisième sorte à la variété correspondante de la deuxième sorte. Donc en passant de P' à P'_i , le nombre α_q diminue de

$$\delta''_q + \delta_q = \delta_q + \delta_{q-1}.$$

En particulier, les nombres extrêmes α_p et α_0 diminuent de δ_{p-1} et δ_0 . Il résulte de là que le nombre N diminue de

$$\delta_{p-1} - (\delta_{p-1} + \delta_{p-2}) + (\delta_{p-2} + \delta_{p-3}) - \dots \pm (\delta_1 + \delta_0) \mp \delta_0 = 0.$$

Donc N ne change pas. Ainsi, en supprimant la variété $x_i = a$, on ne change pas N, mais, en supprimant de la sorte toutes les variétés planes définies par (B), on remontera au polyèdre P. Le nombre N est donc le même pour P' et pour P.

Remontons maintenant de P' à Q.

Soient $\omega_p, \omega_{p-1}, \dots, \omega_1, \omega_0$ les variétés, dont l'ensemble constitue le polyèdre Q; soient de même $\omega'_p, \omega'_{p-1}, \dots, \omega'_1, \omega'_0$ les variétés dont l'ensemble constitue le polyèdre P'.

Nous répartirons les variétés ω'_q en $p+1$ classes.

Celles de la première classe seront celles qui feront partie d'une des régions ω_p sans faire partie d'une des régions ω_{p-1} . Le polyèdre P' étant dérivé de Q , nous rangerons dans cette première classe toutes les variétés ν'_p (qui sont toutes des subdivisions des ω_p); celles des variétés ν'_{p-1} , qui séparent l'une de l'autre deux variétés ν'_p faisant partie d'une même région ω_p ; et leurs intersections.

Celles de la deuxième classe seront celles qui feront partie d'une des régions ω_{p-1} ; sans faire partie d'une des régions ω_{p-2} .

Celles de la troisième classe seront celles qui feront partie d'une des régions ω_{p-2} , sans faire partie d'une des régions ω_{p-3} , etc.

Celles de la $p^{\text{ième}}$ classe seront celles qui feront partie d'une des régions ω_1 , sans être un des points ω_0 .

Enfin, la $(p+1)^{\text{ième}}$ classe comprendra les points ω_0 .

Pour remonter de P' à Q , voici ce que je vais faire : je commencerai par supprimer toutes les variétés de la première classe qui ont moins de p dimensions, ce qui a pour effet de réunir en une seule, par annexion, toutes les régions ν'_p , qui sont les subdivisions d'une même région ω_p .

Je dis que cette opération n'altère pas le nombre N .

En effet, je puis supposer que les mailles du quadrillage qui a donné naissance à Q sont assez serrées, pour qu'à l'intérieur d'une de ces mailles D_p , c'est-à-dire à l'intérieur d'une des régions ω_p , on ne puisse trouver des points appartenant à deux variétés différentes ν_{p-1} , sauf dans le cas où l'on y trouve des points appartenant à l'intersection de ces deux variétés. (Je désigne toujours par ν_q les variétés dont l'ensemble forme P .) Plus généralement, je puis supposer qu'on ne peut pas trouver dans une région ω_p des points appartenant à plusieurs variétés ν_q ($q < p$) à moins qu'on n'y puisse trouver des points appartenant à l'intersection de ces diverses variétés.

Dans une région ω_p , nous pourrions donc avoir des points d'une région ν_q et de toutes les régions ν_h ($h > q$), qui font partie de son aster.

Mais nous ne pourrions avoir des points de deux régions ν_q , ou des points de ν_q et d'une région ν_h ($h > q$) ne faisant partie de l'aster de ν_q , sans avoir, en outre, des points d'une région ν_{q-1} .

Si alors je suppose que q est la plus petite valeur que l'on puisse donner au nombre des dimensions d'une région ν_q , pour que cette région ait des points à l'intérieur de ω_p , si je suppose cela, dis-je, nous n'aurons dans ω_p que des points d'une *seule* région ν_q et des régions de son aster.

Considérons alors une région ω_p , contenant des points de ν_q et des régions de l'aster de ν_q . Soient

$$\gamma_{q+1}, \quad \gamma_{q+2}, \quad \dots, \quad \gamma_p$$

les nombres que nous avons définis plus haut en définissant l'aster.

Il en résulte qu'à l'intérieur de ω_p nous aurons

1	région	ν'_q	de la première classe,
γ_{q+1}	»	ν'_{q+1}	»
γ_{q+2}	»	ν'_{q+2}	»
.....			
γ_p	»	ν'_p	»

En supprimant les régions de la première classe de moins de p dimensions et en annexant les unes aux autres les γ_p régions ν'_p , dont l'ensemble constitue ω_p , nous diminuons α_p de $\gamma_p - 1$, α_{p-1} de γ_{p-1} , ..., α_{q+1} de γ_{q+1} , α_q de 1. Donc, en vertu de l'équation (A), le nombre N ne change pas.

Cela fait, nous supprimerons toutes les variétés de la deuxième classe de moins de $p - 1$ dimensions, en annexant les unes aux autres toutes les variétés ν'_{p-1} de la deuxième classe, qui font partie d'une même région ω_{p-1} . Ensuite, nous supprimerons toutes les variétés de la troisième classe de moins de $p - 2$ dimensions, en annexant les unes aux autres toutes les variétés ν'_{p-2} qui font partie d'une même région ω_{p-2} ; et ainsi de suite.

Nous arriverons enfin ainsi au polyèdre Q .

On montrerait de la même manière que plus haut qu'aucune de ces opérations n'altère le nombre N .

Le nombre N est donc le même pour P' et Q ; il est donc aussi le même

pour P et Q et, par conséquent, pour deux polyèdres congruents quelconques.

C. Q. F. D.

§ 17. — CAS OU p EST IMPAIR.

Je vais définir à l'égard d'un polyèdre quelconque P de nouveaux nombres remarquables que j'appellerai $\beta_{\lambda,\mu}$.

Soit d'abord $\lambda > \mu$; je considérerai toutes les variétés v_λ ; pour chacune d'elles, j'envisagerai le nombre des variétés v_μ qui en font partie; je ferai la somme de tous ces nombres relativement aux diverses variétés v_λ et ce sera cette somme que j'appellerai $\beta_{\lambda,\mu}$.

Comme les variétés v_λ sont toutes par hypothèse simplement connexes, on aura

$$\beta_{\lambda,\lambda-1} - \beta_{\lambda,\lambda-2} + \dots \pm \beta_{\lambda,1} \mp \beta_{\lambda,0} = 2\alpha_\lambda \quad \text{ou} \quad 0,$$

selon que λ sera impair ou pair.

Soit maintenant $\lambda < \mu$; je considérerai toutes les variétés v_λ ; pour chacune d'elles, j'envisagerai le nombre des variétés v_μ , dont elle fait partie (c'est-à-dire le nombre γ_μ relatif à l'aster de v_λ); je ferai la somme de tous ces nombres relatifs aux diverses variétés v_λ et ce sera cette somme que j'appellerai $\beta_{\lambda,\mu}$.

En vertu de l'équation (A) du numéro précédent, on aura

$$\beta_{\lambda,p} - \beta_{\lambda,p-1} + \dots \pm \beta_{\lambda,\lambda+2} \mp \beta_{\lambda,\lambda+1} = 2\alpha_\lambda \quad \text{ou} \quad 0,$$

selon que $p - \lambda$ sera impair ou pair.

Il résulte de cette définition que

$$\beta_{\lambda,\mu} = \beta_{\mu,\lambda}.$$

Cela posé, formons le Tableau suivant

$+\beta_{p,p-1},$	$-\beta_{p,p-2},$	$+\beta_{p,p-3},$	$\dots,$	$\pm\beta_{p,1},$	$\mp\beta_{p,0},$
	$+\beta_{p-1,p-2},$	$-\beta_{p-1,p-3},$	$\dots,$	$\mp\beta_{p-1,1},$	$\pm\beta_{p-1,0},$
	$\dots\dots\dots,$	$\dots\dots\dots,$	$\dots,$	$\dots\dots\dots,$	$\dots\dots\dots,$
		$\dots\dots\dots,$	$\dots,$	$\dots\dots\dots,$	$\dots\dots\dots,$
			$\dots,$	$\dots\dots\dots,$	$\dots\dots\dots,$
				$+\beta_{2,1},$	$-\beta_{2,0},$
					$+\beta_{1,0}.$

On voit que, dans chaque ligne et dans chaque colonne, chaque terme est affecté alternativement du signe $+$ et du signe $-$, de telle façon que $\beta_{\lambda,\mu}$ est affecté du signe $+$, si $\lambda - \mu$ est impair et du signe $-$ dans le cas contraire.

Faisons la somme des termes de ce Tableau; cette somme peut s'effectuer de deux manières; en sommant d'abord les lignes et en sommant d'abord les colonnes.

La somme des termes des diverses lignes du Tableau est, en commençant par le haut :

$$2\alpha_p, \quad 0, \quad 2\alpha_{p-2}, \quad 0, \quad \dots, \quad 2\alpha_3, \quad 0, \quad 2\alpha_1$$

si p est impair, et

$$0, \quad 2\alpha_{p-1}, \quad 0, \quad 2\alpha_{p-3}, \quad \dots, \quad 2\alpha_3, \quad 0, \quad 2\alpha_1$$

si p est pair. La somme des termes du Tableau est donc :

$$2\alpha_1 + 2\alpha_3 + \dots + 2\alpha_p$$

si p est impair, et

$$2\alpha_1 + 2\alpha_3 + \dots + 2\alpha_{p-1}$$

si p est pair.

La somme des termes des diverses colonnes du Tableau est, en commençant par la gauche :

$$2\alpha_{p-1}, \quad 0, \quad 2\alpha_{p-3}, \quad 0, \quad \dots, \quad 2\alpha_2, \quad 0, \quad 2\alpha_0$$

si p est impair, et

$$2\alpha_{p-1}, \quad 0, \quad 2\alpha_{p-3}, \quad 0, \quad \dots, \quad 0, \quad 2\alpha_1, \quad 0$$

si p est pair.

La somme des termes du Tableau est donc :

$$2\alpha_0 + 2\alpha_2 + \dots + 2\alpha_{p-1}$$

si p est impair et

$$2\alpha_1 + 2\alpha_3 + \dots + 2\alpha_{p-1}$$

si p est pair.

En égalant les deux expressions de cette somme, on obtiendra une identité, si p est pair, et l'équation

$$N = 0$$

si p est impair.

D'où cette conséquence :

Le nombre N est nul et indépendant des nombres de Betti si p est impair; il dépend, au contraire, des nombres de Betti si p est pair.

§ 18. — DEUXIÈME DÉMONSTRATION.

La deuxième démonstration va nous apprendre comment il en dépend.

Pour bien la faire comprendre, je vais d'abord l'exposer pour les polyèdres ordinaires avec α_0 sommets, α_1 arêtes et α_2 faces.

A chacun des α_0 sommets, je fais correspondre un nombre arbitraire; à chacune des α_1 arêtes, je fais correspondre un nombre δ égal à la différence des nombres correspondant à ses deux sommets.

Nous aurons ainsi α_1 différences δ ; mais elles ne pourront pas toutes être choisies arbitrairement; en effet, elles seront déterminées, quand on connaîtra les α_0 nombres affectés aux divers sommets et même quand on connaîtra les excès de $\alpha_0 - 1$ de ces nombres sur le dernier. Il y aura donc en tout $\alpha_0 - 1$ différences δ , qui pourront être choisies arbitrairement.

Il doit donc y avoir entre les différences δ

$$\alpha_1 - \alpha_0 + 1$$

relations linéaires.

Il est clair que l'on pourra obtenir toutes ces relations linéaires de la manière suivante : Considérons une suite d'arêtes formant un contour fermé; la somme algébrique des différences δ relations aux diverses arêtes de cette suite devra être nulle.

Cherchons donc à construire des contours fermés formés d'arêtes.

Nous avons d'abord les contours polygonaux de chaque face; ils sont au nombre de α_2 .

Si ensuite le polyèdre n'est pas simplement connexe, nous pourrons tracer à sa surface $P_1 - 1$ contours fermés linéairement indépendants au sens donné à ce mot dans le paragraphe sur les homologies. Soit C l'un de ces contours, il traversera successivement différentes faces; soient $a_1 a_2, a_2 a_3, \dots, a_{n-1} a_n, a_n a_1$ les arcs de ce contour, qui sont dans chacune de ces faces.

Prenons le premier de ces arcs $a_1 a_2$ et F la face correspondante.

Le point a_1 et le point a_2 sont sur le périmètre de cette face; nous pouvons alors aller de a_1 en a_2 en suivant ce périmètre par un chemin que j'appellerai $a_1 m_1 a_2$. Nous aurons alors

$$a_1 m_1 a_2 + a_2 a_1 \sim 0,$$

c'est-à-dire que, dans le contour C , on peut remplacer l'arc $a_1 a_2$ par l'arc $a_1 m_1 a_2$; opérons de même pour les autres arcs de C ; nous aurons finalement remplacé C par le contour homologue

$$a_1 m_1 a_2 + a_2 m_2 a_3 + \dots + a_n m_n a_1,$$

que j'appellerai C' . Ce contour C' se composera d'un certain nombre d'arêtes et de portions d'arêtes. Par exemple, l'arc $a_1 m_1 a_2$ se composera d'un segment d'arête joignant a_1 au sommet le plus voisin, puis d'un certain nombre d'arêtes complètes, puis d'un segment Sa_2 joignant a_2 au sommet le plus voisin.

Mais ce segment Sa_2 se retrouvera parcouru en sens contraire dans l'arc $a_2 m_2 a_3$. Les portions d'arêtes, qui font partie de C' , sont donc parcourues deux fois en sens contraires; nous pouvons donc les supprimer et nous obtenons ainsi un contour C'' exclusivement formé d'arêtes complètes et homologue à C ou à C' .

Nous aurons $P_1 - 1$ contours analogues à C'' , qui nous donneront $P_1 - 1$ relations entre les δ .

Nous obtenons ainsi $\alpha_2 + P_1 - 1$ contours fermés formés d'arêtes; je dis que tous les autres contours possibles n'en sont que des combinaisons.

Soit d'abord un contour fermé formé d'arêtes et homologue à 0, il

partagera la surface du polyèdre en deux régions. Soit R l'une d'elles, elle sera évidemment formée d'un certain nombre q de faces, puisque le contour est exclusivement formé d'arêtes; nous pourrions donc remplacer le contour donné par q contours partiels formés par les périmètres de ces q faces.

Si maintenant le contour donné n'est pas homologue à 0, nous pourrions toujours le remplacer par une combinaison des contours C'' et par un contour homologue à 0.

Nous avons donc

$$\alpha_2 + P_1 - 1$$

relations entre nos δ et nous n'en avons pas d'autres; mais sont-elles toutes distinctes?

Pour le reconnaître, il faut voir si l'on peut former une combinaison linéaire de ces relations qui se réduise à une identité, ou, ce qui revient au même, si l'on peut former une combinaison de nos $\alpha_2 + P_1 - 1$ contours, une combinaison telle que chaque arête soit parcourue deux fois en sens contraire (ou, si elle l'est plus de deux fois, qu'elle le soit autant de fois dans un sens que dans l'autre).

Peut-on d'abord former une telle combinaison avec les α_2 périmètres Π ? Dire que chaque arête est parcourue ainsi deux fois en sens contraire, c'est dire que l'ensemble des polygones, dont on parcourt ainsi les périmètres, forme un polyèdre fermé.

Or, on ne peut évidemment construire de la sorte qu'un seul polyèdre fermé, qui est le polyèdre donné.

Avec les α_2 relations correspondant aux α_2 périmètres Π , nous pouvons donc former une combinaison linéaire identique et une seule.

Peut-on former maintenant de pareilles combinaisons avec les périmètres Π et les contours C'' ? Si cela était, l'ensemble des polygones, dont on parcourt ainsi les périmètres, formerait une surface polyédrique non fermée, dont la frontière complète serait formée par une combinaison des contours C'' . Or, cela est impossible, puisque les contours C'' sont linéairement indépendants.

On peut donc former avec nos $\alpha_2 + P_1 - 1$ relations une combinaison identique et une seule. Il y a donc entre les δ

$$(\alpha_2 + P_1 - 1) - 1$$

relations distinctes. Le nombre des δ arbitraires est donc

$$\alpha_1 - (\alpha_2 + P_1 - 1) + 1,$$

de sorte qu'il vient

$$\alpha_0 - 1 = \alpha_1 - (\alpha_2 + P_1 - 1) + 1,$$

ou

$$N = 3 - P_1.$$

Étendons cette démonstration au cas où nous avons un polyèdre à trois dimensions, où l'on distinguera :

Les sommets ν_0	au nombre de α_0 ,
les variétés ν_1	» α_1 ,
» ν_2	» α_2 ,
» ν_3	» α_3 .

A chacun des ν_0 , faisons correspondre un nombre, et à chacun des ν_1 la différence δ des nombres correspondant à ces deux sommets. Nous aurons ainsi α_1 différences δ , dont $\alpha_0 - 1$ seront arbitraires.

On obtiendra les relations linéaires qui ont lieu entre les δ , en construisant tous les contours fermés exclusivement formés avec des ν_1 .

Nous aurons d'abord les périmètres Π des ν_2 , qui seront au nombre de α_2 ; soit ensuite C un contour fermé quelconque non homologue à 0, il traversera successivement différents ν_3 ; soient $a_1, a_2, a_2 a_3, \dots$ les arcs de C qui se trouvent dans chacun de ces ν_3 .

Considérons l'arc $a_1 a_2$ qui se trouve dans un des ν_3 , que j'appelle Φ , et dont les extrémités a_1 et a_2 se trouvent dans deux des ν_2 , qui servent de frontière à Φ , à savoir a_1 dans φ_1 et a_2 dans φ_2 .

Soient b_1 un sommet de φ_1 , b_2 un sommet de φ_2 ; joignons a_1 à b_1 par

une ligne quelconque $a_1 b_1$, puis b_1 à b_2 par une ligne $b_1 b_2$ formée exclusivement par des ν_1 appartenant à la frontière de Φ , et b_2 à a_2 par une ligne quelconque $a_2 b_2$; on aura

$$a_1 a_2 \curvearrowright a_1 b_1 + b_1 b_2 + b_2 a_2,$$

de sorte que nous pourrions remplacer l'arc $a_1 a_2$ par l'arc $a_1 b_1 b_2 a_2$; opérons de même pour les autres arcs de C . Nous aurons remplacé C par le contour homologue

$$a_1 b_1 b_2 a_2 + a_2 b_2 b_3 a_3 + \dots$$

que j'appelle C' . Le contour C' se compose d'un certain nombre de ν_1 et d'arcs analogues à $a_1 b_1$, $a_2 b_2$, $\dots$, parcourus chacun deux fois en sens contraire. On peut donc supprimer ces arcs, et il reste un contour C'' homologue à C et exclusivement formé de ν_1 .

Il y aura $P_1 - 1$ contours C'' .

Je dis maintenant que tout contour fermé K formé de ν_1 est une combinaison des Π et des C'' . Si

$$K \curvearrowright 0,$$

le contour K sera la frontière complète d'une certaine région R à deux dimensions. Cette région R pourra être subdivisée en un certain nombre de variétés r , chacune des régions r étant la portion de R qui se trouve à l'intérieur de l'un des ν_3 . Considérons une des variétés r , et soit φ la région ν_3 dans laquelle elle se trouve; la frontière complète de r sera une variété fermée u à une dimension, qui fera partie de la frontière complète de φ . Comme φ est simplement connexe, u partagera la frontière complète de φ en deux régions; soit r' l'une de ces régions; elle se composera d'un certain nombre de ν_2 qui en feront partie tout entières et d'un certain nombre de portions de ν_2 (puisque, parmi les ν_2 qui forment la frontière complète de φ , il y en a qui sont partagées en deux parties par u). On voit que r est homologue à r' ; nous pourrions remplacer r par r' ; si nous opérons de même pour toutes les régions r , nous aurons obtenu une va-

riété R' homologue à R et qui se composera d'un certain nombre de v_2 complètes et d'un certain nombre de portions de v_2 prises chacune deux fois en sens contraire. Nous pourrions supprimer ces portions de v_2 et nous obtiendrions ainsi une variété R'' homologue à R et limitée par le même contour K . Cette variété R'' pourra être décomposée en un certain nombre de polygones v_2 , de sorte que le contour K pourra être remplacé par les périmètres Π de ces polygones.

Si K n'est pas homologue à 0, on pourra le remplacer par un certain nombre de contours C'' et par un contour analogue à 0.

Nous avons donc

$$\alpha_2 + P_1 - 1$$

relations entre les δ , que j'écrirai

$$\varepsilon = 0,$$

et nous n'en aurons pas d'autres. Mais sont-elles toutes distinctes?

En d'autres termes, pouvons-nous former une combinaison linéaire des ε qui soit identiquement nulle, ou encore une combinaison des Π et des C'' où chaque v_1 figure deux fois en sens contraire?

Si dans cette combinaison devaient figurer des C'' , l'ensemble des polygones v_2 , dont les périmètres Π figureraient dans la combinaison, formerait une variété à deux dimensions, qui ne serait pas fermée et dont la frontière complète serait formée par un certain nombre de contours C'' . Or cela n'est pas possible, puisque les C'' sont linéairement indépendants.

Il me reste donc à examiner les combinaisons où ne figureraient que des Π ; l'ensemble des polygones v_2 dont les périmètres Π y figureraient formerait alors une variété fermée.

Nous sommes ainsi conduits à examiner les variétés fermées exclusivement formées de v_2 .

Nous avons d'abord les frontières complètes des v_3 , frontières complètes que j'appellerai Φ et qui sont au nombre de α_3 .

Soit ensuite D une variété quelconque à deux dimensions, non homo-

logue à 0. Traitons-la comme nous avons traité R; nous verrons qu'elle est homologue à une variété D'' fermée et à deux dimensions, exclusivement formée de v_2 .

Le nombre des D'' est $P_2 - 1$.

Je dis maintenant que toute variété fermée K formée de v_2 est une combinaison des Π et des D'' . Si, en effet, elle est homologue à 0, elle limite une région S à trois dimensions qui se composera d'un certain nombre de v_3 , puisque K se compose d'un certain nombre de v_2 ; on pourra donc remplacer K par les frontières complètes Φ de ces v_3 . Si K n'est pas homologue à 0, on pourra la remplacer par un certain nombre de D'' et par une variété homologue à 0 et exclusivement formée de v_2 .

Nous avons donc, entre les ε ,

$$\alpha_3 + P_2 - 1$$

relations linéaires, que j'écrirai

$$\zeta = 0,$$

et nous n'en aurons pas d'autres. Sont-elles distinctes?

Pour former une combinaison linéaire des ζ qui soit identiquement nulle, il faut former une combinaison des Φ et des D'' telle que chaque v_2 y figure deux fois en sens contraire. Nous verrons, comme plus haut, que les D'' ne peuvent pas figurer dans cette combinaison et que l'ensemble des v_3 , dont les frontières Φ y figurent, doit former une variété fermée à trois dimensions. Or, nous ne pouvons construire qu'une seule variété de cette sorte : c'est le polyèdre donné lui-même.

Il y a donc une combinaison linéaire des ζ qui s'annule identiquement.

Il y aura donc

$$(\alpha_3 + P_2 - 1) - 1$$

relations linéaires distinctes entre les ε ,

$$(\alpha_2 + P_1 - 1) - (\alpha_3 + P_2 - 1) + 1$$

relations linéaires distinctes entre les δ .

Parmi les δ , il en restera donc

$$\alpha_1 - (\alpha_2 + P_1 - 1) + (\alpha_3 + P_2 - 1) - 1$$

qui seront arbitraires; on trouve ainsi

$$\alpha_0 - 1 = \alpha_1 - (\alpha_2 + P_1 - 1) + (\alpha_3 + P_2 - 1) - 1$$

et l'on trouverait

$$\alpha_0 - 1 = \alpha_1 - (\alpha_2 + P_1 - 1) + (\alpha_3 + P_2 - 1) - (\alpha_4 + P_3 - 1) + 1$$

pour les polyèdres à quatre dimensions.

On a donc

$$N = P_2 - P_1$$

pour les polyèdres à trois dimensions, et

$$N = 3 - P_1 + P_2 - P_3$$

pour les polyèdres à quatre dimensions.

En général, on aura

$$N = P_{p-1} - P_{p-2} + \dots + P_2 - P_1$$

si p est impair, et

$$N = 3 - P_1 + P_2 - \dots + P_{p-1}$$

si p est pair.

Si nous observons maintenant que les nombres de Betti, également distants des extrêmes, sont égaux, on verra que l'on doit avoir

$$N = 0$$

si p est impair, comme nous l'avons déjà vu dans le numéro précédent



TABLE DES MATIÈRES

DU MÉMOIRE DE M. POINCARÉ.

	Pages.
INTRODUCTION	1
§ 1. — Première définition des variétés.....	4
§ 2. — Homéomorphisme.....	7
§ 3. — Deuxième définition des variétés.....	9
§ 4. — Variétés opposées.....	15
§ 5. — Homologies.....	18
§ 6. — Nombres de Betti	19
§ 7. — Emploi des intégrales	21
§ 8. — Variétés unilatères et bilatères	25
§ 9. — Intersection de deux variétés	33
§ 10. — Représentation géométrique	46
§ 11. — Représentation par un groupe discontinu.....	55
§ 12. — Groupe fondamental.....	60
§ 13. — Équivalences fondamentales.....	63
§ 14. — Conditions de l'homéomorphisme.....	70
§ 15. — Autres modes de génération.....	85
§ 16. — Théorème d'Euler	100
§ 17. — Cas où p est impair.....	112
§ 18. — Deuxième démonstration	114

JOURNAL
DE
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
PUBLIÉ
PAR LE CONSEIL D'INSTRUCTION
DE CET ÉTABLISSEMENT.

TABLE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LES 64 PREMIERS CAHIERS FORMANT 45 VOLUMES
SUIVIE
D'UNE TABLE ANALYTIQUE ET D'UNE TABLE GÉNÉRALE PAR NOMS D'AUTEURS.

TOME PREMIER.

1^{er} Cahier. (1794.)

	Pages
<i>Monge</i> , Stéréotomie.....	1
<i>Lamblardie</i> et <i>Baltard</i> , Architecture.....	15
<i>Obenheim</i> , Fortification.....	38
<i>Neveu</i> , Cours relatif aux arts du Dessin.....	78
<i>Prony</i> , Cours d'Analyse appliquée à la Mécanique.....	92
<i>Hassenfratz</i> , <i>Welter</i> , <i>Bonjour</i> , et <i>Hachette</i> , Sur la congélation du mercure.....	123
<i>Fourcroy</i> , <i>Chaptal</i> , <i>Berthollet</i> , <i>Guyton</i> , <i>Vauquelin</i> et <i>Chaussier</i> , Chimie. Substances salines, végétales, animales, minérales.....	129
<i>Dupuis</i> , Mémoire sur la détermination géométrique des teintes dans les dessins.....	167
<i>J. E. P.</i> , 2 ^e S. (C. n ^o 1).	1

2^e Cahier. (Décembre 1795.)

	Pages.
<i>Prony</i> , Cours d'Analyse (suite).....	I
<i>Prony</i> , Sur les lois de la dilatabilité des fluides élastiques et sur celle de la force expansive de la vapeur.....	24
<i>Say</i> , Fortification.....	77
<i>Eisenman</i> , Stéréotomie.....	100
<i>Neveu</i> , Arts du Dessin (suite).....	107
<i>Griffet la Baume</i> , Architecture.....	124
<i>Barruel</i> , Physique générale.....	128
<i>Monge</i> , Sur les lignes de courbure de la surface de l'ellipsoïde.....	145
<i>Guyton</i> , Description d'un eudiomètre à sulfure de potasse.....	166
<i>Vauquelin</i> , <i>Chaussier</i> et <i>Guyton</i> , Chimie. Substances salines, végétales et minérales.	169
<i>Prony</i> , Notice sur les nouveaux Éléments d'Analyse de Lagrange.....	206

3^e Cahier. (Mai 1796.)

Organisation de l'École Polytechnique.....	I
État nominatif des principaux agents de l'Ecole Polytechnique.....	XVII
<i>Prony</i> , Cours d'Analyse (suite).....	209
<i>Berthollet</i> , Observations sur les propriétés eudiométriques du phosphore.....	274
<i>Guyton</i> , Résumé sur la théorie de la cristallisation.....	278
<i>Guyton</i> , Analyse de la calcédoine du Creusot.....	287
<i>Guyton</i> , Expériences comparatives sur les terres pour déterminer leur fusibilité.....	298
<i>Neveu</i> , Cours relatif aux arts du Dessin (suite).....	315
<i>Barruel</i> , Physique générale.....	337
<i>Griffet</i> , Architecture.....	345
<i>Say</i> , Fortification.....	346
<i>Vauquelin</i> , <i>Chaussier</i> et <i>Guyton</i> , Chimie. Substances salines, végétales et minérales.	349
<i>Bonjour</i> , Expériences sur la formation du principe colorant prussique.....	436
<i>Eisenman</i> , Stéréotomie.....	440

4^e Cahier. (Septembre 1796.)

Lois et arrêtés du Gouvernement concernant l'École Polytechnique.....	IX
<i>Fourcroy</i> et <i>Vauquelin</i> , Des propriétés de l'acide sulfureux et de ses combinaisons avec les bases terreuses et alcalines.....	445
<i>Prony</i> , Leçons d'Analyse (suite).....	459
<i>Hassenfratz</i> , Observations sur la neige et la pluie, leur influence sur la végétation et leur combinaison avec l'oxygène.....	570
<i>Baltard</i> , Architecture.....	577

	Pages.
<i>Say</i> , Mémoire sur le défilement des fortifications.....	588
<i>Say</i> , Fortification.....	617
<i>Eisenman</i> , Stéréotomie.....	619
<i>Barruel</i> , Physique générale.....	623
<i>Vauquelin</i> , <i>Fourcroy</i> , <i>Chaussier</i> et <i>Guyton</i> , Chimie (suite).....	646
<i>Neveu</i> , Cours relatif aux arts du Dessin (suite).....	698

TOME DEUXIÈME.

5^e Cahier. (Mai 1798.)

<i>Prony</i> , Mécanique.....	1
<i>Fourier</i> , Mémoire sur le principe des vitesses virtuelles et la théorie des moments...	20
<i>Lamblardie</i> , Extrait d'un Mémoire de Brémontier sur le moyen de fixer les dunes..	61
<i>Bernard (S.)</i> , Description sur la manière dont se polissent et s'étament les glaces...	71
<i>Fourcroy</i> , Sur le principe de l'odeur des végétaux.....	82
<i>Lagrange</i> , Essai d'analyse numérique sur la transformation des fractions.....	93
<i>Lagrange</i> , Sur le principe des vitesses virtuelles.....	115
<i>Neveu</i> , Cours relatif aux arts du Dessin (suite).....	119
<i>Laplace</i> , Mémoire sur un plan qui reste toujours parallèle à lui-même.....	155
<i>Regnier</i> , Description et usage du dynamomètre.....	160
<i>Prony</i> , Éloge de Lamblardie.....	179
<i>Guyton</i> , Éloge de Bertrand Pelletier.....	185
<i>Prony</i> , Sur le principe des vitesses virtuelles et la décomposition des mouvements circulaires.....	191

6^e Cahier. (Juillet 1799.)

Discours prononcés à l'École Polytechnique par les divers professeurs.....	209
<i>Lagrange</i> , Solutions de quelques questions relatives aux triangles sphériques.....	270
<i>Prony</i> , Théorie du mouvement autour d'un axe libre de rotation.....	297
<i>Laplace</i> , Sur la Mécanique.....	343
<i>Monge</i> , Des courbes à double courbure.....	345
<i>Hassenfratz</i> , Mémoire sur les meilleures proportions à donner aux chaudières.....	364
<i>Hassenfratz</i> , Physique générale.....	372
<i>Prieur</i> , Lettre sur le serein et la rosée.....	409
<i>Neveu</i> , Cours relatif aux arts du Dessin (suite).....	419
<i>Lermina</i> , <i>Garin</i> et <i>Pecheur</i> , Description d'une pierre appelée <i>Sibérîte</i>	439
<i>Camus</i> , Compte rendu des travaux entrepris par l'Institut national ou exécutés sous sa direction.....	446
<i>Camus</i> , Extraits de quelques Ouvrages nouveaux qui ont paru en Allemagne.....	451

7° et 8° Cahiers. (Juin 1812.)

	Pages.
<i>Laplace</i> , Leçons de Mathématiques données à l'École Normale en 1795.....	1
<i>Lagrange</i> , Leçons élémentaires sur les Mathématiques données à l'École Normale en 1795.....	173
<i>Hachette</i> , Du contact des Sphères, traduit de Fermat.....	279

TOME TROISIÈME.

7° et 8° Cahiers *bis*. (1799.)

<i>Prony</i> , Mécanique philosophique.....	1 à 477
---	---------

9° Cahier. (Mai 1797.)

<i>Lagrange</i> , Théorie des fonctions analytiques.....	1 à 277
--	---------

TOME QUATRIÈME.

10° Cahier. (Novembre 1810.)

<i>Brianchon</i> , Solution de plusieurs problèmes de Géométrie.....	1
<i>Poinsot</i> , Mémoire sur les polygones et les polyèdres.....	16
<i>Prony</i> , Note sur l'application de la théorie des solutions particulières des équations différentielles à des questions qui intéressent la pratique de l'art de l'ingénieur....	49
<i>Prony</i> , Recherches sur le système hydraulique de l'Italie.....	59
<i>Humboldt</i> (<i>A. de</i>), Sur la communication qui existe entre l'Orénoque et la rivière des Amazones.....	65
<i>Andrieux</i> , Cours de Grammaire et de Belles-Lettres.....	69

11° Cahier. (Juin 1802.)

Loi relative à l'organisation de l'École Polytechnique, du 25 frimaire an VIII.....	2
Rapport sur la situation de l'École.....	11
Avis du Ministre de l'Intérieur sur le concours pour l'admission en l'an X.....	25
<i>Monge</i> , Mémoire sur la surface courbe dont toutes les normales sont tangentes à la surface d'une même sphère.....	28
<i>Monge</i> , Mémoire sur la surface courbe dont toutes les normales sont tangentes à une même surface conique à base arbitraire.....	59
<i>Prony</i> , Analyse des différentes questions qui se rapportent au mouvement d'un corps sollicité par des puissances quelconques.....	87

	Pages
<i>Monge et Hachette</i> , Application de l'Algèbre à la Géométrie.....	143
<i>Poisson</i> , Mémoire sur la pluralité des intégrales dans le calcul des différences.....	173
<i>Biot</i> , Considérations sur les intégrales aux différences finies.....	182
<i>Poisson</i> , Mémoire sur l'élimination dans les équations algébriques.....	199
<i>Moreau</i> , Sur la théorie du mouvement des projectiles dans les milieux résistants....	204
<i>Marescot</i> , Mémoire sur la fortification souterraine.....	230
<i>Lomet</i> , Sur l'emploi des machines aérostatiques aux reconnaissances militaires et à la construction des cartes géographiques.....	252
<i>Regnard</i> , Sur la direction des cassis.....	259
<i>Lefrançois</i> , Sur la gnomonique.....	261
<i>Hassenfratz</i> , Sur les ombres colorées.....	272
<i>Hachette</i> , Sur le galvanisme.....	284
<i>Barruel</i> , Extrait d'un Mémoire sur l'Élasticité.....	295
<i>Guyton</i> , Examen d'un oxyde d'antimoine.....	308
<i>Berthollet</i> , Observations sur la strontiane.....	315
<i>Berthollet</i> , Notice sur une méthode de donner au lin et au chanvre les apparences du coton.....	319
<i>Desormes et Clément</i> , Précis d'expériences sur l'oxyde de carbone gazeux.....	322
<i>Thenard</i> , Notice sur l'acide sébacique.....	327
<i>Thenard</i> , Observations sur l'acide zoonique.....	333
<i>Lermina</i> , Description d'un sel sulfuré de soude.....	337
<i>Neveu</i> , Discours sur les connaissances nécessaires à un amateur éclairé des arts du Dessin.....	341
<i>Guyton</i> , Notice biographique sur Charles Gardeur le Brun.....	355
Annonces et Notices d'ouvrages..	358
Rapport sur la situation de l'École.....	371
Programme des connaissances exigées.....	381
Liste des membres du Conseil de perfectionnement.....	383

TOME CINQUIÈME.

12^e Cahier. (Juillet 1804.)

<i>Lagrange</i> , Leçons sur le calcul des fonctions.....	1 à 320
<i>Lagrange</i> , Leçons sur le calcul des fonctions (supplément).....	3 à 90

TOME SIXIÈME.

13^e Cahier. (Avril 1806.)

<i>Monge</i> , Mémoire sur les surfaces courbes dont toutes les normales sont tangentes à une même surface développable quelconque.....	1
--	---

	Pages.
<i>Monge</i> , De la surface courbe qui enveloppe l'espace parcouru par une sphère variable de rayon, dont le centre parcourt une courbe à double courbure quelconque.....	41
<i>Poisson</i> , Sur les solutions particulières des équations différentielles et des équations aux différences.....	60
<i>Poisson</i> , Sur les équations aux différences mêlées.....	126
<i>Ampère</i> , Sur la théorie des fonctions dérivées qui conduisent à une nouvelle démonstration de la série de Taylor.....	148
<i>Poinsot</i> , Sur la composition des moments et sur la théorie de l'équilibre et du mouvement des systèmes.....	182
<i>Poinsot</i> , De l'équilibre et du mouvement des systèmes.....	206
<i>Biot</i> , Sur les axes de suspension synchronés.....	242
<i>Ampère</i> , Sur le principe des vitesses virtuelles.....	247
<i>Livet</i> , Formules pour passer d'un système de coordonnées rectangulaires à un système de coordonnées obliques.....	270
<i>Brianchon</i> , Sur les surfaces courbes du deuxième degré.....	297
<i>Fourcroy et Thenard</i> , Sur les oxydes et sur les sels de mercure.....	312
<i>Hassenfratz</i> , Programme d'un cours des mines fait à l'École.....	345
Annnonce de la <i>Correspondance sur l'École Polytechnique</i>	372
Nécrologie (Lermina).....	376

TOME SEPTIÈME.

14^e Cahier. (Avril 1808.)

<i>Malus</i> , Mémoire sur l'Optique.....	1
<i>Dupin</i> , Essai sur la description des lignes et des surfaces du deuxième degré.....	45
<i>Malus</i> , Mémoire sur l'Optique (suite).....	84
<i>Poisson</i> , Extrait des Leçons faites à l'École sur les points singuliers des courbes.....	130
<i>Poisson</i> , Sur les oscillations du pendule dans un milieu résistant et en ayant égard à l'extensibilité du fil.....	143
<i>Ampère</i> , Sur les avantages qu'on peut retirer, dans la théorie des courbes, de la considération des paraboles osculatrices, avec des réflexions sur les fonctions différentielles dont la valeur ne change pas lors de la transformation des axes.....	159
<i>Français</i> , Sur la transformation des coordonnées.....	182
<i>Brisson</i> , Sur l'intégration des équations différentielles partielles.....	191
<i>Dupuis-Torcy et Brisson</i> , Sur l'art de projeter les canaux de navigation.....	262
<i>Montgolfier</i> , Sur la possibilité de substituer le béliet hydraulique à l'ancienne machine de Marly.....	289
<i>Hachette</i> , Calcul sur ce moteur.....	318
<i>Poisson</i> , Mémoire sur la théorie du son.....	319
Annnonce de la <i>Correspondance sur l'École Polytechnique</i>	393

TOME HUITIÈME.

15^e Cahier. (Décembre 1809.)

	Pages.
<i>Poisson</i> , Mémoire sur les inégalités séculaires des moyens mouvements des planètes.	1
<i>Lagrange</i> , Éclaircissement d'une difficulté singulière qui se rencontre dans le calcul de l'attraction des sphéroïdes très peu différents d'une sphère.....	57
<i>Monge</i> , Essai d'application de l'Analyse à quelques questions de Géométrie élémentaire.	68
<i>Monge</i> , Construction de l'équation des cordes vibrantes.....	118
<i>Prony</i> , Notice sur la nouvelle écluse de M. de Bettancourt.....	146
<i>Prony</i> , Supplément à la Notice précédente.....	153
<i>Bret</i> , Mémoire sur la méthode du plus grand commun diviseur, appliquée à l'élimination.	162
<i>Poisson</i> , Mémoire sur le mouvement de rotation de la Terre.....	198
<i>Malus</i> , Mémoire sur la mesure du pouvoir réfringent des corps opaques.....	219
<i>Laplace</i> , Mémoire sur divers points d'Analyse.....	229
<i>Poisson</i> , Mémoire sur la variation des constantes arbitraires dans les questions de Mécanique.....	266
<i>Poisson</i> , Addition au Mémoire sur le pendule, imprimé dans le 14 ^e Cahier.....	345
Annonce de la <i>Correspondance sur l'École Polytechnique</i>	354

TOME NEUVIÈME.

16^e Cahier. (Mai 1813.)

<i>Petit</i> , Théorie mathématique de l'action capillaire.....	1
<i>Binet (J.)</i> , Mémoire sur la théorie des axes conjugués et des moments d'inertie des corps.....	41
<i>Cauchy</i> , Premier Mémoire sur les polyèdres.....	68
<i>Cauchy</i> , Deuxième Mémoire sur les polygones et sur les polyèdres.....	87
<i>Cauchy</i> , Recherches sur les nombres.....	99
<i>Gaultier</i> , de Tours, Mémoire sur les moyens généraux de construire graphiquement les cercles déterminés par trois conditions, et les sphères déterminées par quatre conditions.....	124
<i>Poisson</i> , Mémoire sur les intégrales définies.....	215
<i>Poisson</i> , Mémoire sur un cas particulier du mouvement de rotation des corps pesants.	247
<i>Hachette</i> , De l'héliostat; théorie et description.....	263
<i>Binet (J.)</i> , Mémoire sur un système de formules analytiques et leur application à des considérations géométriques.....	280
Annonce de la <i>Correspondance sur l'École Polytechnique</i>	354

TOME DIXIÈME.

17^e Cahier. (Janvier 1815.)

	Pages.
<i>Cauchy</i> , Mémoire sur le nombre de valeurs qu'une fonction peut acquérir lorsqu'on y permute de toutes les manières possibles les quantités qu'elle renferme.....	1
<i>Cauchy</i> , Mémoire sur les fonctions qui ne peuvent obtenir que deux valeurs égales et de signes contraires par suite des transpositions opérées entre les variables qu'elles renferment.....	29
<i>Binet</i> , Sur la détermination analytique d'une sphère tangente à quatre autres.....	113
<i>Hachette</i> , Déterminer le centre et le rayon d'une sphère qui touche quatre sphères données.....	129
<i>Dupin</i> , Expériences sur la flexibilité, la force et l'élasticité des bois.....	137
<i>Corancez</i> , Mémoire sur la résolution des équations, contenant une nouvelle méthode pour construire, par des procédés géométriques, les racines réelles des équations de tous les degrés.....	212
<i>Cavendish</i> (traduit par <i>Chompré</i>), Expériences pour déterminer la densité de la Terre.	263
<i>Binet</i> , Mémoire sur la composition des forces et sur la composition des moments....	321
<i>Plana</i> , Mémoire sur les oscillations des lames élastiques.....	349
<i>Puissant</i> , Mémoire où l'on expose une nouvelle méthode analytique pour déterminer les effets de l'aberration sur la position des astres.....	396
<i>Binet</i> , Mémoire sur l'expression analytique de l'élasticité et de la raideur des courbes à double courbure.....	418
<i>Cauchy</i> , Mémoire sur la détermination du nombre de racines réelles dans les équations algébriques.....	457
<i>Ampère</i> , Considérations générales sur les intégrales des équations aux différentielles partielles.....	549
<i>Poisson</i> , Suite du Mémoire sur les intégrales définies, imprimé dans le 16 ^e Cahier...	612
<i>Hachette</i> , Suite de l'héliostat, imprimé dans le 16 ^e Cahier.....	632
<i>Hachette</i> , Note sur le Mémoire de <i>Plana</i> imprimé page 349.....	633

TOME ONZIÈME.

18^e Cahier. (Janvier 1820.)

<i>Ampère</i> , Mémoire contenant l'application de la théorie exposée dans le 17 ^e Cahier à l'intégration des équations aux différentielles partielles du premier et du deuxième ordre.....	1
<i>Dulong et Petit</i> , Recherches sur la mesure des températures et sur les lois de la communication de la chaleur.....	189

	Pages
<i>Poisson</i> , Suite du Mémoire sur les intégrales définies, inséré dans les tomes IX et X. Sur les intégrales des fonctions qui passent par l'infini entre les limites de l'intégration, et sur l'usage des imaginaires dans la détermination des intégrales définies...	295
<i>Poinsot</i> , Mémoire sur l'application de l'Algèbre à la théorie des nombres. Application à des exemples. Application à la recherche des racines primitives.....	342
<i>Cauchy</i> , Sur les racines imaginaires des équations.....	411
<i>Poisson</i> , Mémoire sur la manière d'exprimer les fonctions en séries de quantités périodiques, et sur l'usage de cette transformation dans la résolution de différents problèmes	417

TOME DOUZIÈME.

19^e Cahier. (Juillet 1823.)

<i>Poisson</i> , Mémoire sur la distribution de la chaleur dans les corps solides.....	1
<i>Binet</i> , Mémoire sur les principes généraux de Dynamique, et en particulier sur un nouveau principe de Mécanique générale.....	163
<i>Brianchon</i> , Mémoire sur les courbes de raccordement.....	187
<i>Cauchy</i> , Mémoire sur une espèce particulière de mouvement des fluides.....	204
<i>Poisson</i> , Sur l'intégration des équations linéaires aux différences partielles.....	215
<i>Poisson</i> , Suite du Mémoire sur la distribution de la chaleur dans les corps solides ...	249
<i>Poisson</i> , Suite du Mémoire sur les intégrales définies et sur la sommation des séries..	404
<i>Cauchy</i> , Mémoire sur l'intégration des équations linéaires aux différences partielles et à coefficients constants.....	510

TOME TREIZIÈME.

20^e Cahier. (Février 1831.)

<i>Poisson</i> , Mémoire sur les équations générales de l'équilibre et du mouvement des corps solides, élastiques et fluides.....	1
<i>Cauchy</i> , Mémoire sur le système de valeurs qu'il faut attribuer à divers éléments, déterminés par un grand nombre d'observations, pour que la plus grande de toutes les erreurs, abstraction faite du signe, devienne un minimum.....	175
<i>Poisson</i> , Suite du Mémoire sur les intégrales définies et sur la sommation des séries..	222
<i>Binet</i> , Mémoire sur la détermination des orbites des planètes et des comètes.....	249
<i>Binet</i> , Mémoire sur la résolution des équations indéterminées du premier degré en nombres entiers	289
<i>Cauchy</i> , Mémoire sur l'intégration d'une certaine classe d'équations aux différences partielles, et sur les phénomènes dont cette intégration fait connaître les lois dans les questions de Physique mathématique	297

21^e Cahier. (Septembre 1832.)

	Pages
<i>Liouville</i> , Mémoire sur quelques questions de Géométrie et de Mécanique, et sur un nouveau genre de calcul pour résoudre ces questions.....	1
<i>Liouville</i> , Mémoire sur le calcul des différentielles à indices quelconques.....	71
<i>Liouville</i> , Mémoire sur l'intégration de l'équation	

$$(mx^2 + nx + p) \frac{d^2y}{dx^2} + (qx + r) \frac{dy}{dx} + sy = 0,$$

à l'aide des différentielles à indices quelconques	163
<i>Poisson</i> , Formules relatives au mouvement du boulet dans l'intérieur du canon, extraites des manuscrits de Lagrange.....	187
<i>Poisson</i> , Mémoire sur la courbure des surfaces.....	205
<i>Coriolis</i> , Mémoire sur l'influence du moment d'inertie du balancier d'une machine à vapeur et de sa vitesse moyenne sur la régularité du mouvement de rotation que le va-et-vient du piston communique au volant.....	228
<i>Coriolis</i> , Mémoire sur le principe des forces vives dans les mouvements relatifs des machines.....	268
<i>Olivier (Théodore)</i> , Mémoire de Géométrie descriptive sur la construction des tangentes en un point multiple d'une courbe plane ou à double courbure dont l'équation n'est pas connue.....	303
<i>Duhamel</i> , Sur les équations générales de la propagation de la chaleur dans les corps solides dont la conductibilité n'est pas la même dans tous les sens.....	356

TOME QUATORZIÈME.

22^e Cahier. (Septembre 1833.)

<i>Liouville</i> , Mémoire sur l'équation de Riccati.....	1
<i>Duhamel</i> , Mémoire sur la méthode générale relative au mouvement de la chaleur dans les corps solides plongés dans des milieux dont la température varie avec le temps.	20
<i>Duhamel</i> , Notes au sujet du Mémoire précédent.....	67
<i>Olivier (Théodore)</i> , Mémoire de Géométrie descriptive. Construction des points d'inflexion de la transformée d'une courbe plane ou à double courbure, tracée sur une surface développable.....	78
<i>Liouville</i> , Premier et deuxième Mémoires sur la détermination des intégrales dont la valeur est algébrique.....	124
<i>Lamé</i> , Mémoire sur la propagation de la chaleur dans les polyèdres et principalement dans le prisme triangulaire régulier.....	194

23^e Cahier. (1834.)

	Pages.
<i>Duhamel</i> , Sur les vibrations d'un système quelconque de points matériels.....	1
<i>Liouville</i> , Mémoire sur les transcendentes elliptiques de première et de deuxième espèce, considérées comme fonctions de leur amplitude.....	37
<i>Olivier (Théodore)</i> , Mémoire de Géométrie descriptive. Construction des centres de courbure des épicycloïdes planes et sphériques.....	85
<i>Clapeyron</i> , Mémoire sur la puissance motrice de la chaleur.....	153
<i>Lamé</i> , Mémoire sur les lois de l'équilibre du fluide éthéré.....	191
<i>Liouville (J.)</i> , Sur la figure d'une masse fluide homogène, en équilibre et douée d'un mouvement de rotation.....	289

TOME QUINZIÈME.

24^e Cahier. (1835.)

<i>Duhamel</i> , Note sur divers points de Mécanique.....	1
<i>Liouville</i> , Mémoire sur le changement de la variable indépendante, dans le calcul des différentielles à indices quelconques.....	17
<i>Liouville</i> , Note sur la détermination d'une fonction arbitraire placée sous un signe d'intégration définie.....	55
<i>Olivier (Théodore)</i> , Mémoire de Géométrie. De la courbure et de la flexion d'une courbe à double courbure.....	61
<i>Coriolis</i> , Mémoire sur la manière d'établir les différents principes de Mécanique pour des systèmes de corps en les considérant comme des assemblages de molécules.....	93
<i>Coriolis</i> , Mémoire sur l'évaluation des pertes de travail dues aux frottements dans les engrenages coniques.....	126
<i>Coriolis</i> , Mémoire sur la théorie des mouvements considérés comme analyse des rencontres des lignes droites.....	133
<i>Coriolis</i> , Mémoire sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps....	142
<i>Coriolis</i> , Mémoire sur la stabilité des voitures, avec application aux messageries de France.....	155
<i>Duchemin</i> , Sur la vitesse initiale des projectiles.....	183
<i>Olivier (Théodore)</i> , Addition au Mémoire sur la courbure et la flexion d'une courbe à double courbure.....	252
<i>Bénard</i> , Note sur une question de probabilités.....	261

25^e Cahier. (1837.)

<i>Duhamel</i> , Deuxième Mémoire sur les phénomènes thermo-mécaniques.....	1
<i>Liouville</i> , Mémoire sur l'intégration des équations différentielles à indices fractionnaires.....	58

	Pages.
<i>Liouville</i> , Mémoire sur l'intégration de l'équation $\frac{du}{dt} = \frac{d^3 u}{dx^3}$	85
<i>Guilbert</i> , Note sur les axes principaux des corps.....	118
<i>Olivier (Théodore)</i> , Mémoire de Géométrie. Des indicatrices de divers ordres de contact entre deux surfaces et des conditions géométriques auxquelles doivent satisfaire deux surfaces ayant un point de contact pour qu'elles aient un contact du $n^{\text{ième}}$ ordre tout autour de ce point.....	123
<i>Wantzel</i> , Note sur les nombres incommensurables.....	151
<i>Brianchon</i> , Mémoire sur les puissances des polynomes.....	158
<i>Cauchy</i> , Calcul des indices des fonctions.....	176
<i>Olivier (Théodore)</i> , Note de Géométrie sur les paraboloides osculateurs.....	230
<i>Chasles</i> , Mémoire sur l'attraction des ellipsoïdes.....	244
<i>Chasles</i> , Mémoire sur l'attraction d'une couche ellipsoïdale infiniment mince.....	266
<i>Brianchon</i> , Théorèmes nouveaux sur les polyèdres.....	317

TOME SEIZIÈME.

26^e Cahier. (1838.)

<i>Poisson</i> , Mémoire sur le mouvement des projectiles dans l'air en ayant égard à la rotation de la Terre.....	1
<i>Poisson</i> , Mémoire sur le mouvement des projectiles dans l'air en ayant égard à leur rotation.....	69
<i>Olivier (Théodore)</i> , Mémoire de Géométrie sur les projections stéréographiques....	177
<i>Demonferrand</i> , Essai sur les lois de la population et de la mortalité en France.....	249

27^e Cahier. (1839.)

<i>Poisson</i> , Deuxième Mémoire sur le mouvement des projectiles dans l'air en ayant égard à leur rotation.....	1
<i>Didion</i> , Expériences sur la justesse comparée du tir des balles sphériques, plates et longues.....	51
<i>Demonferrand</i> , Mémoire sur la rectification de quelques documents relatifs à la statistique.....	75
<i>Barré de Saint-Venant</i> et <i>Wantzel</i> , Mémoire et expériences sur l'écoulement de l'air, déterminé par des différences de pression considérable.....	85
<i>Binet</i> , Mémoires sur les intégrales définies eulériennes et leur application à la théorie des suites, ainsi qu'à l'évaluation des fonctions de grands nombres.....	123

TOME DIX-SEPTIÈME.

28^e Cahier. (1841.)

	Pages.
<i>Binet (J.)</i> , Mémoire sur la variation des constantes arbitraires dans les formules générales de la Dynamique et dans un système d'équations analogues plus étendues . . .	1
<i>Biot</i> , Sur les surfaces catacaustiques et diacaustiques dans la sphère	95
<i>Cauchy</i> , Mémoire sur diverses formules relatives à la théorie des intégrales définies et sur la conversion des différences finies des puissances en intégrales de cette espèce	147
<i>Bertrand (J.)</i> , Mémoire sur les conditions d'intégrabilité des fonctions différentielles.	249
<i>Bertrand (J.)</i> , Démonstration d'un théorème de Jacobi	276

29^e Cahier. (1843.)

<i>Duhamel (J.-M.-C.)</i> , Mémoire sur les vibrations d'une corde flexible, chargée d'un ou de plusieurs curseurs	1
<i>Delaunay (Ch.)</i> , Mémoire sur le calcul des variations	37
<i>Catalan (E.)</i> , Mémoire sur les surfaces gauches à plan directeur	121
<i>Bertrand (J.)</i> , Démonstration de quelques théorèmes sur les surfaces orthogonales . .	157

TOME DIX-HUITIÈME.

30^e Cahier. (1845.)

<i>Saint-Venant (de)</i> , Mémoire sur les lignes courbes non planes	1
<i>Bravais</i> , Notice sur les parhélies qui sont situés à la même hauteur que le Soleil . . .	77
<i>Bravais</i> , Notice sur l'arc-en-ciel blanc	97
<i>Bertrand (J.)</i> , Mémoire sur le nombre de valeurs que peut prendre une fonction quand on y permute les lettres qu'elle renferme	123
<i>Bonnet (Ossian)</i> , Mémoire sur la théorie des surfaces isothermes orthogonales	141
<i>Bonnet (Ossian)</i> , Note sur les ombilics des surfaces	165
<i>Bonnet (Ossian)</i> , Mémoire sur la théorie des corps élastiques	171

31^e Cahier. (1847.)

<i>Bravais</i> , Mémoire sur les halos et les phénomènes optiques qui les accompagnent . .	1
<i>Catalan (E.)</i> , Note sur la théorie des solutions singulières	271

TOME DIX-NEUVIÈME.

32° Cahier. (1848.)

	Pages
<i>Bonnet (Ossian)</i> , Mémoire sur la théorie générale des surfaces.....	1
NOTE I. — Sur la surface réglée dont les rayons de courbure principaux sont égaux et dirigés en sens contraires.....	134
NOTE II. — Sur quelques propriétés des lignes géodésiques et des lignes de courbure des surfaces du second ordre.....	137
<i>Serret (J.-A.)</i> , Remarque sur un Mémoire de M. Bertrand.....	147
<i>Bertrand (J.)</i> , Note sur la théorie des mouvements relatifs.....	149
<i>Duhamel (J.-M.-C.)</i> , Mémoire sur la propagation de la chaleur dans les cristaux....	155
<i>Bertrand (J.)</i> , Note sur la similitude en Mécanique.....	189

33° Cahier. (1850.)

<i>Bravais</i> , Mémoire sur les systèmes formés par des points distribués régulièrement sur un plan ou dans l'espace.....	1
<i>Boileau (P.)</i> , Mémoire sur le jaugeage des cours d'eau à faible ou à moyenne section.	129
<i>Resal (H.)</i> , Mémoire sur le frottement des engrenages coniques et de la vis sans fin..	235
<i>Resal (H.)</i> , Note sur la détermination de l'intégrale	

$$u = \int \frac{(\cos x + q) dx}{\sin x + r \cos x + s},$$

<i>r, q, s</i> étant des constantes.....	252
--	-----

TOME VINGTIÈME.

34° Cahier. (1851.)

<i>Gournerie (de la)</i> , Mémoire sur les lignes d'ombre et de perspective des hélicoïdes gauches	1
<i>Bravais (A.)</i> , Études cristallographiques.....	101

35° Cahier. (1853.)

<i>Senarmont (de)</i> , Commentaire au Mémoire de Fresnel sur la double réfraction.....	1
<i>Gournerie (de la)</i> , Mémoire sur les courbes d'ombre et de perspective des surfaces de révolution.....	29

	Page
<i>Serret (J.-A.)</i> , Mémoire sur les courbes algébriques dont les arcs s'expriment par des arcs de cercle	69
<i>Bresse</i> , Mémoire sur un théorème nouveau concernant les mouvements plans et sur l'application de la Cinématique à la détermination des rayons de courbure.....	89
<i>Bonnet (Ossian)</i> , Mémoire sur les surfaces dont les lignes de courbure sont planes ou sphériques.....	117

TOME VINGT ET UNIÈME.

36^e Cahier. (1856)

<i>Duhamel (J.-M.-C.)</i> , Mémoire sur le mouvement des différents points d'une barre cylindrique dont la température varie.....	1
<i>Bour (E.)</i> , Mémoire sur le problème des trois corps	35
<i>Bour (E.)</i> , Sur l'attraction qu'exercerait une planète, si l'on supposait sa masse répartie sur chaque élément de son orbite proportionnellement au temps employé à le parcourir	59
<i>Briot et Bouquet</i> , Étude des fonctions d'une variable imaginaire (1 ^{er} Mémoire).....	85
<i>Briot et Bouquet</i> , Recherches sur les propriétés des fonctions définies par des équations différentielles (2 ^e Mémoire).....	133
<i>Briot et Bouquet</i> , Mémoire sur l'intégration des équations différentielles au moyen des fonctions elliptiques (3 ^e Mémoire).....	199
<i>Gournerie (de la)</i> , Note sur des théorèmes de Schooten et de Lahire	255

37^e Cahier. (1858.)

<i>Rouché (E.)</i> , Mémoire sur le développement des fonctions en séries ordonnées suivant les dénominateurs des réduites d'une fraction continue.....	1
<i>Haton de la Goupillière (J.-N.)</i> , Mémoire sur une théorie nouvelle de la Géométrie des masses (1 ^{er} et 2 ^e Mémoires).....	35
<i>Haton de la Goupillière (J.-N.)</i> , Mémoire sur la sommation des dérivées et des intégrales d'une fonction quelconque.....	97
<i>Catalan (E.)</i> , Mémoire sur les surfaces dont les rayons de courbure en chaque point sont égaux et de signes contraires.....	129
<i>Reech</i> , Démonstration d'une propriété générale des surfaces fermées.....	169
<i>Mannheim (A.)</i> , Construction des centres de courbure des lignes décrites dans le mouvement d'une figure plane qui glisse sur son plan.....	179
<i>Violla (B.)</i> , Mémoire sur la vis Saint-Gilles.....	191
<i>Tissot (A.)</i> , Sur les altérations d'angles et de distance dans le développement modifié de Flamsteed.....	217
<i>Resal (H.)</i> , Mémoire sur les propriétés géométriques du mouvement le plus général d'un corps solide	227

TOME VINGT-DEUXIÈME.

38^e Cahier. (1861.)

	Pages.
<i>Lucas (F.)</i> , Mémoire sur les propriétés géométriques de l'arche biaise (appareil hélicoïdal à joint normaux à l'intrados).....	1
<i>Haton de la Goupillière (J.-N.)</i> , Mémoire sur une nouvelle théorie générale des lignes isothermes et du potentiel cylindrique.....	15
<i>Jordan (Camille)</i> , Mémoire sur le nombre des valeurs des fonctions.....	113
<i>Trançon (Abel)</i> , Mémoire sur les propriétés d'un ensemble de droites menées de tous les points de l'espace, suivant une loi continue.....	195

39^e Cahier. (1862.)

<i>Bour (Edmond)</i> , Théorie de la déformation des surfaces.....	1
<i>Bour (Edmond)</i> , Sur l'intégration des équations différentielles partielles du premier et du second ordre.....	149
<i>Rouché (Eugène)</i> , Mémoire sur la série de Lagrange.....	193

TOME VINGT-TROISIÈME.

40^e Cahier. (1863.)

<i>La Gournerie (Jules de)</i> , Mémoire sur la surface engendrée par la révolution d'une conique autour d'une droite située d'une manière quelconque dans l'espace.	1
<i>Laurent (P.-Alph.)</i> , Mémoire sur la théorie des imaginaires, sur l'équilibre des températures et sur l'équilibre d'élasticité.....	75
<i>Mannheim</i> , Recherches géométriques sur les longueurs comparées d'arcs de courbes différentes.....	205

TOME VINGT-QUATRIÈME.

41^e Cahier. (1865.)

<i>Catalan (E.)</i> , Mémoire sur la théorie des polyèdres.....	1
<i>Collignon (Édouard)</i> , Recherches sur la représentation plane de la surface du globe terrestre.....	73

	Pages
<i>Pigeon (Henri)</i> , Recherches analytiques sur les polygones semi-réguliers.....	165
<i>Reech (F.)</i> , Théorie de la courbure des lignes orthogonales.....	201
<i>Bonnet (Ossian)</i> , Mémoire sur la théorie des surfaces applicables sur une surface donnée.....	209

TOME VINGT-CINQUIÈME.

42^e Cahier. (1867.)

<i>Bonnet (Ossian)</i> , Mémoire sur la théorie des surfaces applicables sur une surface donnée.....	1
<i>Haton de la Goupillière (J.-N.)</i> , Méthodes de transformation en Géométrie et en Physique mathématique.....	153
<i>Trançon (Abel)</i> , Remarques sur la théorie des maxima et des minima.....	205
<i>Laguerre</i> , Sur le calcul des systèmes linéaires (extrait d'une Lettre adressée à M. Hermite).....	215
<i>Mathieu (Émile)</i> , Mémoire sur les fonctions elliptiques.....	265

TOME VINGT-SIXIÈME.

43^e Cahier. (1870.)

<i>Rolland (E.)</i> , Mémoire sur l'établissement des régulateurs de la vitesse.....	1
<i>Mannheim (A.)</i> , Étude sur le déplacement d'une figure de forme invariable.....	57
<i>Haton de la Goupillière (J.-N.)</i> , Recherches sur les centres de gravité.....	123
<i>Lévy (Maurice)</i> , Mémoire sur les coordonnées curvilignes orthogonales.....	157
<i>Tissot (A.)</i> , Sur l'intégration d'une classe de fonctions transcendantes.....	201

TOME VINGT-SEPTIÈME.

44^e Cahier. (1874.)

<i>Marie (Maximilien)</i> , Théorie élémentaire des intégrales simples et de leurs périodes.....	1
<i>Marie (Maximilien)</i> , Théorie élémentaire des intégrales doubles et de leurs périodes.....	27
<i>Marie (Maximilien)</i> , Extension de la méthode de Cauchy à la théorie des intégrales doubles.....	51

	Pages
<i>Marie (Maximilien)</i> , Théorie élémentaire des intégrales d'ordre quelconque et de leurs périodes.....	91
<i>Marie (Maximilien)</i> , Théorie des résidus des intégrales d'ordre quelconque.	103
<i>Marie (Maximilien)</i> , Classification des intégrales quadratrices des courbes algébriques.....	109
<i>Badoureau</i> , Note sur le problème des partis appliqué aux jeux de calcul.....	123
<i>Cornu (A.)</i> , Détermination nouvelle de la vitesse de la lumière.....	133
<i>Hermite</i> , Sur quelques intégrales définies.....	181

TOME VINGT-HUITIÈME.

45^e Cahier. (1878.)

Moutard, Sur la construction des équations de la forme

$$\frac{1}{z} \frac{d^2 z}{dx dy} = \lambda(x, y),$$

qui admettent une intégrale générale explicite.....	1
<i>Poincaré (Henri)</i> , Note sur les propriétés des fonctions définies par les équations différentielles.....	13
<i>Halphen</i> , Sur les caractéristiques des systèmes de coniques et de surfaces du second ordre.....	27
<i>Callandreau (Octave)</i> , Note sur l'emploi des fractions continues algébriques pour le calcul des coefficients $b_s^{(v)}$ de Laplace.....	91
<i>Haton de la Goupillière</i> , Formules nouvelles pour l'étude du mouvement d'une figure plane.....	105
<i>Collignon (Éd.)</i> , Note sur le mouvement des planètes.....	173
<i>Picquet</i> , Mémoire sur l'application du calcul des combinaisons à la théorie des déterminants.....	201
<i>Mathieu (Émile)</i> , Sur l'application du problème des trois corps à la détermination des perturbations de Jupiter et de Saturne.....	245

46^e Cahier. (1879.)

<i>Lucas (Félix)</i> , Géométrie des polynomes.....	1
<i>Jordan (Camille)</i> , Mémoire sur les caractéristiques des fonctions θ	35
<i>Léauté (H.)</i> , Étude géométrique sur les fonctions elliptiques de première espèce....	65
<i>Clarival (E.)</i> , Méthode nouvelle pour mesurer la dépense des déversoirs.....	101
<i>Léauté (H.)</i> , Méthode d'approximation graphique applicable à un grand nombre de questions de Mécanique pratique.....	167

47^e Cahier. (1880.)

	Pages
<i>Halphen</i> , Sur les invariants différentiels des courbes gauches.....	1
<i>Collignon (Édouard)</i> , Recherches sur la formule de Wallis.....	103
<i>Léauté (H.)</i> , Sur un perfectionnement applicable à tous les régulateurs à force centrifuge.....	139
<i>Poincaré (H.)</i> , Sur un mode nouveau de représentation géométrique des formes quadratiques définies ou indéfinies.....	177

TOME VINGT-NEUVIÈME.

48^e Cahier. (1880.)

<i>Laussedat</i> , Discours prononcé aux funérailles de M. Chasles.....	v-viii
<i>Lecornu (L.)</i> , Sur l'équilibre des surfaces flexibles et inextensibles.....	1
<i>Jordan (Camille)</i> , Mémoire sur l'équivalence des formes.....	111
<i>Jordan (Camille)</i> , Sur la réduction des substitutions linéaires.....	151
<i>Mathieu (Émile)</i> , Mémoire sur les intégrations relatives à l'équilibre d'élasticité...	163
<i>Humbert (G.)</i> , Sur l'équation différentielle du second ordre.....	207
<i>Rouché (Eugène)</i> , Note sur les équations linéaires... ..	221

TOME TRENTIÈME.

49^e Cahier. (1881.)

<i>Phillips</i> , Du spiral réglant conique des chronomètres et de divers autres spiraux....	1
<i>Badoureaux (A.)</i> , Géométrie. — Mémoire sur les figures isoscèles.....	47
<i>Mathieu (Émile)</i> , Mémoire sur l'équilibre d'élasticité d'un prisme rectangle.....	173
<i>Callandreau (Octave)</i> , Contribution à la théorie du mouvement elliptique et parabolique.....	197
<i>Lecornu (Léon)</i> , Sur les polygones générateurs d'une relation entre plusieurs variables imaginaires.....	205

TOME TRENTE ET UNIÈME.

50^e Cahier. (1881.)

<i>Léauté (H.)</i> , Théorie générale des transmissions par câbles métalliques. — Règles pratiques.....	1
<i>Poincaré (Henri)</i> , Sur les formes cubiques, ternaires et quaternaires.....	199

51^e Cahier (1). (1882.)

	Pages
<i>Jordan (Camille)</i> , Sur la théorie arithmétique des formes quadratiques.....	1
<i>Poincaré (H.)</i> , Sur les formes cubiques ternaires et quaternaires.....	45
<i>Autonne (Léon)</i> , Recherches sur les intégrales algébriques des équations différentielles linéaires à coefficients rationnels.....	93
<i>Mathieu (Émile)</i> , Mémoire sur le mouvement vibratoire des cloches.....	177

52^e Cahier. (1882.)

<i>Halphen</i> , Mémoire sur la classification des courbes gauches algébriques.....	1
<i>Léauté (H.)</i> , Application de la résistance des matériaux au calcul des pièces de machines.....	201
<i>Baille (J.-B.)</i> , Étude sur la résistance de l'air.....	211

53^e Cahier. (1883.)

<i>Resal (H.)</i> , Solution de quelques questions se rapportant aux ponts suspendus.....	1
<i>Resal (H.)</i> , Développement sur un point de la théorie de la rotation des corps solides.....	17
<i>Moutier (J.)</i> , Sur la loi de Dulong et Petit.....	31
<i>Léauté (H.)</i> , Sur une famille de courbes que l'on rencontre dans les transmissions de mouvement et sur leur application dans les machines.....	59
<i>Picquet</i> , Quelques développements sur les équations différentielles linéaires à coefficients constants et sur la théorie des fractions rationnelles.....	79
<i>Lecornu (Léon)</i> , Mémoire sur les surfaces enveloppes de sphères.....	135
<i>Cornu (A.)</i> , Sur les raies telluriques qu'on observe dans le spectre solaire au voisinage des raies D.....	175
<i>Brisse (Ch.)</i> , Exposition analytique de la théorie des surfaces.....	213
PLANCHE. — Sur les raies telluriques qu'on observe dans le spectre solaire au voisinage des raies D.	

54^e Cahier. (1884.)

<i>Autonne (Léon)</i> , Recherches sur les intégrales algébriques des équations différentielles linéaires à coefficients rationnels.....	1
<i>Picquet</i> , Applications de la représentation des courbes du troisième degré à l'aide des fonctions elliptiques.....	31
<i>Demarçay (Eugène)</i> , Sur les dérivés du sulfure d'azote.....	101
<i>Léauté (H.)</i> , Théorie du frein à lame.....	117

(1) A partir du LI^e Cahier, la désignation par *Tomes* a été supprimée.

	Pages
<i>Guieysse</i> , Régulateur isochrone parabolique.....	137
<i>Moutier (J.)</i> , Sur les phénomènes thermiques qui accompagnent le mélange de deux liquides.....	143
<i>Halphen (G.-H.)</i> , Note sur l'inversion des intégrales elliptiques.....	171
<i>Halphen (G.-H.)</i> , Sur une courbe élastique.....	183
PLANCHE.	

55^e Cahier. (1885.)

<i>Léauté (H.)</i> , Mémoire sur les oscillations à longues périodes dans les machines actionnées par des moteurs hydrauliques et sur les moyens de prévenir ces oscillations.	1
<i>Humbert (G.)</i> , Sur les surfaces cyclides	127
<i>Lecornu (Léon)</i> , Sur les forces analytiques.....	253
<i>Resal (H.)</i> , Note sur la courbure de l'herpolhodie.....	275
PLANCHES I, II et III.	

56^e Cahier. (1886.)

<i>Moutard</i> , Recherches sur les équations aux dérivées partielles du second ordre à deux variables indépendantes.....	1
<i>Liouville (R.)</i> , Sur les formes intégrales des équations linéaires du second ordre....	7
<i>Lévy (Lucien)</i> , Sur quelques équations linéaires aux dérivées partielles du second ordre.....	63
<i>Poincaré (H.)</i> , Mémoire sur la réduction simultanée d'une forme quadratique et d'une forme linéaire.....	79
<i>Ossian-Bonnet (Georges)</i> , Démonstration nouvelle de deux Mémoires de M. Bertrand.....	143
<i>Brisse (Ch.)</i> , Démonstration du théorème de d'Alembert.....	163
<i>Fouret (G.)</i> , Mémoire sur certains mouvements dans lesquels des arcs d'une même courbe plane, comptés à partir d'une origine fixe, sont parcourus dans le même temps que les cordes correspondantes.....	171
<i>Rouché (Eugène)</i> , Edmond Laguerre, sa vie et ses travaux.....	213

57^e Cahier. (1887.)

<i>Hugoniot (H.)</i> , Mémoire sur la propagation du mouvement dans les corps, et spécialement dans les gaz parfaits (I ^{re} Partie)	3
<i>Moutier (J.)</i> , L'énergie libre et les changements d'état.....	99
<i>David</i> , Développement des fonctions implicites.....	147
<i>Humbert (G.)</i> , Sur les arcs des courbes planes algébriques.....	171
<i>Liouville (R.)</i> , Sur quelques équations différentielles non linéaires.....	189

58^e Cahier. (1889.)

	Pages
<i>Hugoniot (H.)</i> , Mémoire sur la propagation des mouvements dans les corps, et spécialement dans les gaz parfaits (II ^e Partie)	1
<i>Callandreau (O.)</i> , Sur le développement en série du potentiel des sphéroides de révolution	127
<i>Mercadier</i> , Études expérimentales sur l'élasticité dynamique et statique des fils métalliques.	155

59^e Cahier. (1889.)

<i>Léauté (H.)</i> , Sur une condition de bon fonctionnement des installations mécaniques comportant des transmissions par liens rigides ou flexibles.....	1
<i>Liouville (Roger)</i> , Mémoire sur les invariants de certaines équations différentielles et sur leurs applications.....	7
<i>Moutier (J.)</i> , Sur l'intensité de la lumière.....	77
<i>Flamant</i> , Courbes représentatives des lois du choc longitudinal et du choc transversal d'une barre prismatique, dressées par M. de Saint-Venant	97
Explication des planches.....	124
PLANCHES I à XI.	

60^e Cahier. (1890.)

<i>Andrade (J.)</i> , Sur le mouvement d'un corps soumis à l'attraction newtonienne de deux corps fixes. Sur une extension d'une propriété des mouvements képlériens ...	1
<i>Grimaux et Cloëz (Ch.)</i> , Sur quelques dérivés de l'érythrite.....	59
<i>Mannheim (A.)</i> , Géométrie cinématique : Sur le déplacement d'une figure de forme invariable dont tous les plans passent par des points fixes.....	75
<i>Picard (Émile)</i> , Sur la détermination des intégrales de certaines équations aux dérivées partielles du second ordre par leurs valeurs le long d'un contour fermé... ..	89
<i>Laurent (H.)</i> , Mémoire sur les fonctions entières.....	107
<i>Poincaré (H.)</i> , Notice sur Halphen.....	137

61^e Cahier. (1891.)

<i>Léauté (H.)</i> , Du mouvement troublé des moteurs consécutifs à une perturbation brusque. Nouvelle méthode graphique pour l'étude complète de ce mouvement....	1
<i>Autonne (Léon)</i> , Sur la théorie des équations différentielles du premier ordre et du premier degré (I ^{re} et II ^e Parties)	35
PLANCHES I à XI.	

62^e Cahier. (1892.)

	Pages
<i>Phillips</i> , Disposition propre à rendre le pendule isochrone.....	1
<i>Godefroy (René)</i> , Sur les rayons de courbure de certaines courbes et surfaces et en particulier des courbes et surfaces de Lamé.....	37
<i>Autonne (Léon)</i> , Sur la théorie des équations différentielles du premier ordre et du premier degré (III ^e Partie).....	47
<i>Liouville (R.)</i> , Sur une équation différentielle du premier ordre.....	181

63^e Cahier. (1893.)

<i>Ocagne (Maurice d')</i> , Sur la détermination géométrique du point le plus probable donné par un système de droites non convergentes.....	1
<i>Montessus de Ballore (F. de)</i> , Étude statistique sur le recrutement de l'École Polytechnique.....	27
<i>Vaschy</i> , Sur l'intégration des équations différentielles linéaires à coefficients constants.	39
<i>Autonne (Léon)</i> , Sur la limitation du degré pour les intégrales algébriques de l'équation différentielle du premier ordre (1 ^{er} Mémoire).....	79
PLANCHES I, II et III.	

64^e Cahier. (1894.)

<i>Autonne (Léon)</i> , Sur la limitation du degré pour les intégrales algébriques de l'équation différentielle du premier ordre (1 ^{er} Mémoire, III ^e Partie).....	1
<i>Moutard (Th.)</i> , Note sur les équations aux dérivées partielles.....	55
<i>Moutier (J.)</i> , Sur la composition des mouvements vibratoires.....	71
<i>Humbert (G.)</i> , Sur un complexe remarquable de coniques et sur la surface du troisième ordre.....	123
<i>Ocagne (Maurice d')</i> , Mémoire sur les suites récurrentes.....	151
<i>Andrade</i> , Sur une détermination de l'irrationnelle e^x par le calcul des chances, et sur une identité numérique.....	225



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

I. — TRAVAUX ENTRANT DANS LA CLASSIFICATION DU RÉPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES.

(Les numéros donnés après les titres des Mémoires sont ceux des cahiers correspondants).

A

ALGÈBRE; THÉORIE DES ÉQUATIONS.

1. [A1]. *Laplace*, Leçons de Mathématiques données à l'École Normale en 1795, 7 et 8.
2. [A1c]. *Brianchon*, Mémoire sur les puissances des polynomes, 25.
3. [A2a]. *Cauchy*, Mémoire sur les fonctions qui ne peuvent obtenir que deux valeurs égales et de signes contraires par suite des transpositions opérées entre les variables qu'elles renferment, 17.
4. [A2a]. *Rouché*, Note sur les équations linéaires, 48.
5. [A3]. *Laplace*. (Voir 1.)
6. [A3]. *Lagrange*, Leçons élémentaires sur les Mathématiques données à l'École Normale en 1795, 7 et 8.
7. [A3ax]. *Brissé*, Démonstration du théorème de d'Alembert, 56.
8. [A3az]. *Cauchy*, Sur les racines imaginaires des équations, 18.
9. [A3d]. *Cauchy*, Mémoire sur la détermination du nombre des racines réelles dans les équations algébriques, 18.
10. [A3e]. *Lucas (Félix)*, Géométrie des polynomes, 46.

B

DÉTERMINANTS; SUBSTITUTIONS LINÉAIRES; QUANTITÉS COMPLEXES.

11. [B1a]. *Binet*, Mémoire sur un système de formules analytiques, et leur application à des considérations géométriques, 16.
12. [B1a]. *Cauchy*. (Voir 3.)
J. E. P.

13. [B1a]. *Picquet*, Mémoire sur l'application du calcul des combinaisons à la théorie des déterminants, 43.
14. [B2a]. *Jordan (Camille)*, Sur la réduction des substitutions linéaires, 48.
15. [B3a]. *Bret*, Sur la méthode du plus grand commun diviseur appliqué à l'élimination, 15.
16. [B3d]. *Poisson*, Mémoire sur l'élimination dans les équations algébriques, 11.
17. [B3d]. *Bret*. (Voir 15.)
18. [B3d]. *Laurent (Hermann)*, Mémoire sur les fonctions entières, 60.
19. [B5a]. *Picquet*, Quelques développements sur les équations différentielles linéaires à coefficients constants et sur la théorie des fractions rationnelles, 53.
20. [B9a]. *Poincaré*, Sur les formes cubiques, ternaires et quaternaires, 50.
21. [B12a]. *Lecornu*, Sur les polygones générateurs d'une relation entre plusieurs variables imaginaires, 49.
22. [B12c]. *Laguerre*, Note sur le calcul des systèmes linéaires. Extrait d'une lettre adressée à M. Hermite, 42.

C

PRINCIPES DU CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTEGRAL.

23. [C]. *Prony*, Cours d'Analyse appliquée à la Mécanique, 1, 2, 3 et 4.
24. [C]. *Lagrange*, Théorie des fonctions analytiques, 9.
25. [C]. *Lagrange*, Leçons sur le calcul des fonctions (1799), 12.
26. [C1b]. *Liouville (J.)*, Mémoires sur quelques questions de Géométrie et de Mécanique, et sur un nouveau genre de calcul pour résoudre ces questions, 21.
27. [C1b]. *Liouville (J.)*, Mémoire sur le calcul des différentielles à indices quelconques, 21.
28. [C1b]. *Liouville (J.)*, Sur le changement de la variable indépendante dans le calcul des différentielles à indices quelconques, 24.
29. [C1e]. *Ampère*, Recherches sur quelques points de la théorie des fonctions dérivées qui conduisent à une nouvelle démonstration de la série de Taylor et à l'expression finie des termes qu'on néglige lorsqu'on arrête cette série à un terme quelconque, 13.
30. [C1f]. *Trançon*, Remarque sur la théorie des maxima et des minima, 42.
31. [C2d]. *Liouville (J.)*, Sur les transcendentes elliptiques de première et de seconde espèce considérées comme fonctions de leur amplitude, 23.
32. [C2e]. *Resal*, Note sur la détermination de l'intégrale

$$u = \int \frac{(\cos x + q) dx}{\sin x + r \cos x + s},$$

r, q, s étant des constantes, 33.

33. [C2e]. *Tissot*, Sur l'intégration d'une classe de fonctions transcendentes, 43.
34. [C2k]. *Cauchy*, Sur diverses formules relatives à la théorie des intégrales définies

et sur la conversion des différences finies des puissances en intégrales de cette espèce, 28.

35. [C21]. *Lagrange*. Supplément aux leçons sur le calcul des fonctions, 12 (supplément).
36. [C21]. *Bertrand (J.)*, Sur les conditions d'intégrabilité des fonctions différentielles, 28.
37. [C21]. *Bertrand (J.)*, Démonstration d'un théorème de Jacobi, 28.

D

THÉORIE GÉNÉRALE DES FONCTIONS; SERIES; FRACTIONS CONTINUES.

38. [D]. *Lagrange*. (Voir 24.)
39. [D]. *Lagrange*. (Voir 25.)
40. [D1b α]. *Poisson*, Mémoire sur la manière d'exprimer les fonctions par des séries de quantités périodiques, et sur l'usage de cette transformation dans la résolution de différents problèmes, 18.
41. [D2b]. *Haton de la Goupillière*, Mémoire sur la sommation des dérivées et des intégrales d'une fonction quelconque, 37.
42. [D2b]. *Ocagne (D')*. (Voir 133.)
43. [D2b β]. *Poisson*. (Voir 64.)
44. [D2d α]. *Ocagne (D')*. (Voir 133.)
45. [D2e α]. *Rouché*, Mémoire sur le développement des fonctions en séries ordonnées suivant les dénominateurs des réduites d'une fraction continue, 37.
46. [D3a]. *Cauchy*, Calcul des indices des fonctions, 25.
47. [D3a]. *Briot et Bouquet*, Étude des fonctions d'une variable imaginaire, 36.
48. [D3a]. *Laurent (Alph.)*, Mémoire sur la théorie des imaginaires, sur l'équilibre des températures et sur l'équilibre d'élasticité, 40.
49. [D3b α]. *Laurent (A.)*. (Voir 48.)
50. [D3c γ]. *Rouché*, Mémoire sur la série de Lagrange, 39.
51. [D3e]. *Marie*, Extension de la méthode de Cauchy à la théorie des intégrales doubles, 44.
52. [D3e]. *Marie*, Théorie des résidus des intégrales d'ordre quelconque, 44.
53. [D3g]. *Marie*, Théorie élémentaire des intégrales simples et de leurs périodes, 44.
54. [D3g]. *Marie*, Théorie élémentaire des intégrales doubles et de leurs périodes, 44.
55. [D3g]. *Marie*, Théorie élémentaire des intégrales d'ordre quelconque et de leurs périodes, 44.
56. [D3g]. *Marie*, Classification des intégrales quadratrices des courbes algébriques, 44.
57. [D6a]. *David*, Développement des fonctions implicites, 57.
58. [D6b]. *Andrade*, Sur une détermination de l'irrationnelle e^x par le calcul des chances, et sur une identité numérique, 64.

E

INTÉGRALES DÉFINIES ET EN PARTICULIER INTÉGRALES EULÉRIENNES.

- 59. [E1a]. *Cauchy*. (Voir 34.)
- 60. [E1a]. *Binet*, Sur les intégrales définies eulériennes et sur leur application à la théorie des suites ainsi qu'à l'évaluation des fonctions des grands nombres, 27.
- 61. [E1f]. *Binet*. (Voir 60.)
- 62. *Laplace*, Mémoire sur divers points d'Analyse, 15.
[E5]. III. — Sur le passage réciproque des résultats réels aux résultats imaginaires.
- 63. [E5]. *Poisson*, Mémoire sur les intégrales définies, 16, 17, 18.
- 64. [E5]. *Poisson*, Suite du Mémoire sur les intégrales définies, 19, 20.
- 65. [E5]. *Liouville (J.)*, Sur la détermination d'une fonction arbitraire placée sous un signe d'intégration définie, 24.
- 66. [E5]. *Cauchy*. (Voir 34.)
- 67. [E5]. *Hermite*, Sur quelques intégrales définies, 44.

F

FONCTIONS ELLIPTIQUES.

- 68. [F2e]. *Poisson*. (Voir 64.)
- 69. [F2f]. *Poisson*. (Voir 64.)
- 70. [F5d]. *Mathieu*, Mémoire sur les fonctions elliptiques, 42.
- 71. [F8a]. *Halphen*, Note sur l'inversion des intégrales elliptiques, 54.
- 72. [F8g]. *Léauté*, Étude géométrique sur les fonctions elliptiques de première espèce, 46.
- 73. [F8hβ]. *Halphen*, Sur une courbe élastique, 54.

G

FONCTIONS HYPERELLIPTIQUES, ABÉLIENNES.

- 74. [G1bα]. *Liouville (J.)*, Sur la détermination des intégrales dont la valeur est algébrique, 22.
- 75. [G3c]. *Jordan*, Mémoires sur les caractéristiques des fonctions 0, 46.

II

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ET AUX DÉRIVÉES PARTIELLES; ÉQUATIONS
FONCTIONNELLES; ÉQUATIONS AUX DIFFÉRENCES FINIES; SUITES RÉCURRENTES.

- 76. [H]. *Prony*. (Voir 23.)
- 77. [H]. *Lagrange*. (Voir 24.)
- 78. [H]. *Lagrange*. (Voir 25.)
- 79. [H1]. *Poisson*, Mémoire sur les solutions particulières des équations différentielles et des équations aux différences, 13. (Lu à l'Institut le 23 floréal an XIII.)
- 80. [H1c]. *Binet*, Mémoire sur la variation des constantes arbitraires dans les formules générales de Dynamique et dans un système d'équations analogues plus étendues, 28.
- 81. [H1g]. *Briot et Bouquet*, Recherches sur les propriétés des fonctions définies par des équations différentielles, 36.
- 82. [H1g]. *Poincaré*, Note sur les propriétés des fonctions définies par les équations différentielles, 45.
- 83. [H1i]. *Liouville (R.)*, Mémoire sur les invariants de certaines équations différentielles et sur leurs applications, 59.
- 84. [H2]. *Poisson*. (Voir 79.)
- 85. [H2b]. *Catalan*, Sur la théorie des solutions singulières, 31.
- 86. [H2c]. *Autonne*. Sur la théorie des équations différentielles du premier ordre et du premier degré, 61 et 62.
- 87. [H2c]. *Liouville (R.)*, Sur une équation différentielle du premier ordre, 62.
- 88. [H2cα]. *Briot et Bouquet*, Mémoire sur l'intégration des équations différentielles au moyen des fonctions elliptiques, 36.
- 89. [H2cβ]. *Autonne*, Sur la limitation du degré pour les intégrales algébriques de l'équation différentielle du premier ordre, 63 et 64.
- 90. [H2cγ]. *Liouville (J.)*, Mémoire sur l'équation de Riccati, 22.
- 91. [H3b]. *Binet*. (Voir 80.)
- 92. [H3c]. *Liouville (J.)*, Sur l'intégration des équations différentielles à indices fractionnaires, 25.
- 93. [H3c]. *Liouville (R.)*, Sur quelques équations différentielles non linéaires, 57.
- 94. [H3c]. *Liouville (R.)*. (Voir 83.)
- 95. [H5a]. *Picquet*. (Voir 19.)
- 96. [H5a]. *Vaschy*, Sur l'intégration des équations différentielles linéaires à coefficients constants, 63.
- 97. [H5b]. *Liouville (J.)*. (Voir 74.)
- 98. [H5b]. *Autonne*, Recherches sur les intégrales algébriques des équations différentielles linéaires à coefficients rationnels, 51.
- 99. [H5b]. *Autonne*, Recherches sur les intégrales algébriques des équations différentielles linéaires à coefficients rationnels, 54.

100. [H5f]. *Liouville (J.)*, Mémoire sur l'intégration de l'équation

$$(mx^2 + nx + p) \frac{d^2y}{dx^2} + (qx + r) \frac{dy}{dx} + sy = 0$$

à l'aide des différentielles à indices quelconques, 21.

101. [H5f]. *Humbert (G.)*, Sur l'équation différentielle du second ordre, 48.

102. [H7]. *Poisson*. (Voir 79.)

103. [H7]. *Brisson*, Sur l'intégration des équations différentielles partielles, 14.

104. [H7]. *Ampère*, Considérations générales sur les intégrales des équations aux différentielles partielles, 17.

105. [H8]. *Brisson*. (Voir 103.)

106. [H8a]. *Ampère*, Application de la théorie sur les intégrales des équations aux différentielles partielles du premier et du second ordre, 18.

107. [H8b]. *Poisson*, Sur la variation des constantes arbitraires dans les questions de Mécanique, 15.

108. [H8b]. *Bour*, Sur l'intégration des équations différentielles partielles du premier et du second ordre, 39.

109. [H9a]. *Ampère*. (Voir 106.)

110. [H9b]. *Bour*. (Voir 108.)

111. [H9d]. *Poisson*, Mémoire sur l'intégration des équations linéaires aux différences partielles, 19.

112. [H9d]. *Moutard*, Recherches sur les équations aux dérivées partielles du second ordre à deux variables indépendantes, 56.

113. [H9d]. *Liouville (R.)*, Sur les formes intégrables des équations linéaires du second ordre, 56.

114. [H9d]. *Lévy (L.)*, Sur quelques équations linéaires aux dérivées partielles du second ordre, 56.

115. [H9d]. *Moutard*, Notes sur les équations aux dérivées partielles, 64.

116. [H9dz]. *Picard*, Sur la détermination des intégrales de certaines équations aux dérivées partielles du second ordre par leurs valeurs le long d'un contour fermé, 60.

117. [H9e]. *Laplace*, Mémoire sur divers points d'Analyse : II. Sur les intégrales définies des équations à différences partielles, 15.

118. [H9e]. *Liouville (R.)* (Voir 113).

119. [H9ex]. *Moutard*, Sur la construction des équations de la forme

$$\frac{1}{z} \frac{d^2 z}{dx dy} = \lambda(x, y)$$

qui admettent une intégrale générale explicite, 45.

120. [H9hx]. *Bour*. (Voir 108.)

121. [H10]. *Brisson*. (Voir 103.)

122. [H10b]. *Cauchy*, Mémoire sur l'intégration des équations linéaires aux différences partielles et à coefficients constants, 19.

123. [H10e]. *Cauchy*, Mémoire sur l'intégration d'une certaine classe d'équations aux

différences partielles, et sur les phénomènes dont cette intégration fait connaître les lois dans les questions de Physique mathématique, 20.

124. [H10e]. *Liouville (J.)*, Sur l'intégration de l'équation $\frac{du}{dt} = \frac{d^3 u}{dx^3}$, 25.
125. [H11b]. *Laplace*, Mémoire sur divers points d'Analyse : V. Sur la réduction des fonctions en tables, 15.
126. [H12]. *Poisson*. (Voir 79.)
127. [H12a]. *Cauchy*. (Voir 34.)
128. [H12b]. *Poisson*, Mémoire sur la pluralité des intégrales dans le calcul des différences, 11.
129. [H12b]. *Biot*, Considérations sur les intégrales des équations aux différences finies, 11.
130. [H12b]. *Laplace*, Mémoire sur divers points d'Analyse : IV. Sur l'intégration des équations aux différences finies non linéaires, 15.
131. [H12bx]. *Poisson*, Sur les équations aux différences mêlées, 13.
132. [H12c]. *Laplace*, Mémoire sur divers points d'Analyse : I. Sur le calcul des fonctions génératrices, 15.
133. [H12d]. *Ocagne (d')*, Mémoire sur les suites récurrentes, 64.

I

THÉORIE DES NOMBRES; THÉORIE ARITHMÉTIQUE DES FORMES.

134. [I1]. *Lagrange*, Essai d'analyse numérique sur la transformation des fractions, 5.
135. [I1]. *Laplace*. (Voir 1.)
136. [I1]. *Lagrange*. (Voir 6.)
137. [I3a]. *Cauchy*, Recherches sur les nombres, 16.
138. [I3b]. *Binet*, Mémoire sur la résolution des équations indéterminées du premier degré en nombres entiers, 20.
139. [I7a]. *Poinsot*, Mémoire sur l'application de l'Algèbre à la théorie des nombres, 18.
140. [I12b]. *Binet*. (Voir 138.)
141. [I15]. *Poincaré*, Sur un mode nouveau de représentation géométrique des formes quadratiques définies ou indéfinies, 47.
142. [I16]. *Poincaré*. (Voir 141.)
143. [I18a]. *Jordan*, Mémoire sur l'équivalence des formes, 48.
144. [I18a]. *Poincaré*. (Voir 20.)
145. [I18a]. *Jordan*, Sur la théorie arithmétique des formes quadratiques, 51.
146. [I18c]. *Jordan*. (Voir 145.)
147. [I20]. *Poincaré*, Mémoire sur la réduction simultanée d'une forme quadratique et d'une forme linéaire, 56.
148. [I22a]. *Wantzel*, Note sur les nombres incommensurables, 25.
149. [I23a]. *Lagrange*. (Voir 134.)
150. [I24b]. *Collignon*, Recherches sur la formule de Wallis, 47.

J

CALCUL DES PROBABILITÉS; CALCUL DES VARIATIONS; THÉORIE DES GROUPES DE TRANSFORMATIONS.

- 151. [J2]. *Laplace*. (Voir 1.)
- 152. [J2e]. *Cauchy*, Mémoire sur le système de valeurs qu'il faut attribuer à divers éléments déterminés par un grand nombre d'observations, pour que la plus grande des erreurs, abstraction faite du signe, devienne un minimum, 20.
- 153. [J2e]. *Didion*, Expérience sur la justesse comparée du tir des balles sphériques. plates et longues, 27.
- 154. [J2e]. *Ocagne (D')*, Sur la détermination géométrique du point le plus probable donné par un système de droites non convergentes, 63.
- 155. [J2f]. *Bénard*, Note sur une question de probabilité, 24.
- 156. [J2f]. *Badoureaux*, Note sur le problème des partis appliqué aux jeux de calcul, 44.
- 157. [J2f]. *Andrade*. (Voir 58.)
- 158. [J3]. *Lagrange*. (Voir 35.)
- 159. [J3c]. *Delaunay*, Sur le calcul des variations, 29.
- 160. [J4c]. *Cauchy*, Sur le nombre des valeurs qu'une fonction peut acquérir, lorsqu'on y permute, de toutes les manières possibles, les quantités qu'elle renferme, 17.
- 161. [J4c]. *Bertrand*, Sur le nombre de valeurs que peut prendre une fonction quand on y permute les lettres qu'elle renferme, 30.
- 162. [J4c]. *Serret*, Remarque sur un Mémoire de M. Bertrand, 32.
- 163. [J4c]. *Jordan*, Mémoire sur le nombre des valeurs des fonctions, 38.

K

GÉOMÉTRIE DE LA DROITE, DU PLAN, DU CERCLE, DE LA SPHÈRE; GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.

- 164. [K1d]. *Monge*, Application de l'Analyse à quelques parties de la Géométrie élémentaire, 15.
- 165. [K6a]. *Livet*, Formules pour passer d'un système de coordonnées rectangulaires à un système de coordonnées obliques, 13.
- 166. [K6a]. *Français*, Sur la transformation des coordonnées, 14.
- 167. [K9a]. *Poinsot*, Mémoire sur les polygones et les polyèdres, 10.
- 168. [K9a]. *Cauchy*, Deuxième Mémoire sur les polygones et les polyèdres, 16.
- 169. [K9a]. *Ocagne (D')*. (Voir 154.)
- 170. [K9c]. *Pigeon*, Recherches analytiques sur les polygones semi-réguliers, 41.
- 171. [K11a]. *Gaultier (de Tours)*, Sur les moyens généraux de construire graphique-

ment un cercle déterminé par trois conditions et une sphère déterminée par quatre conditions, 16.

172. [K12b α]. *Gaultier*. (Voir 171.)
173. [K13c]. *Monge*. (Voir 164.)
174. [K14b]. *Poinsot*. (Voir 167.)
175. [K14b]. *Cauchy*. (Voir 168.)
176. [K14b]. *Cauchy*, Recherches sur les polyèdres, 16.
177. [K14b]. *Brianchon*, Théorèmes nouveaux sur les polyèdres, 25.
178. [K14b]. *Catalan*, Mémoire sur la théorie des polyèdres, 41.
179. [K14c α]. *Catalan*. (Voir 178.)
180. [K14c α]. *Badoureau*, Mémoire sur les figures isoscèles, 49.
181. [K14f]. *Badoureau*. (Voir 180.)
182. [K14f]. *Binet*. (Voir 11.)
183. [K14g]. *Bravais*, Mémoire sur les systèmes formés par des points distribués régulièrement sur un plan ou dans l'espace, 33.
184. [K14g]. *Bravais*, Études cristallographiques, 34.
185. [K18a]. *Gaultier*. (Voir 171.)
186. [K18c]. *Fermat*, Du contact des sphères (traduction d'Hachette), 7 et 8.
187. [K19b α]. *Gaultier*. (Voir 171.)
188. [K19b α]. *Binet*, Sur la détermination analytique d'une sphère tangente à quatre autres, 17.
189. [K19b α]. *Hachette*, Déterminer le centre et le rayon d'une sphère qui touche quatre sphères données (solution analytique), 17.
190. [K20]. *Laplace*. (Voir 1.)
191. [K20f]. *Lagrange*, Solutions de quelques problèmes relatifs aux triangles sphériques, avec une analyse complète de ces triangles, 6.
192. [K22d]. *Monge*, Stéréotomie, 1.
193. [K22d]. *Eisenman*, Stéréotomie, 2, 3 et 4.
194. [K22d]. *Lucas (R.)*, Mémoire sur les propriétés géométriques de l'arche biaise (Appareil hélicoïdal à joints normaux à l'intrados), 38.

L'

CONIQUES.

195. [L'11b]. *Dupin*, Sur la description des lignes et des surfaces du second degré, 14.
196. [L'11b]. *Brianchon*, Solution de plusieurs problèmes de Géométrie, 10.
197. [L'11b]. *La Gournerie (de)*, Note sur les théorèmes de Schooten et de la Hire, 36.
198. [L'1c α]. *Brianchon*, Sur les surfaces courbes du second degré, 13.
199. [L'1c α]. *Brianchon*. (Voir 196.)
200. [L'6a]. *La Gournerie (de)*. (Voir 197.)
201. [L'12c]. *Prony*, Note sur l'application de la théorie des solutions particulières des
J, E. P.

équations différentielles à des questions qui intéressent la pratique de l'art de l'ingénieur, 10.

202. [L¹13a]. *Brianchon*. Des courbes de raccordement, 19.

L²

QUADRIQUES.

203. [L²1a]. *Monge et Hachette*, Application d'Algèbre à la Géométrie, 11.

204. [L²1b]. *Dupin*. (Voir 193.)

205. [L²4b]. *Binet*. (Voir 11.)

206. [L²5a]. *Monge, Hachette*. (Voir 203.)

207. [L²6b]. *Livet*. (Voir 163.)

208. [L²6b]. *Brianchon*. (Voir 198.)

209. [L²11b]. *Bonnet (O.)*, Sur quelques propriétés des lignes géodésiques et des lignes de courbures des surfaces du second ordre, 32.

210. [L²11c]. *Monge*, Sur les lignes de courbure de la surface de l'ellipsoïde, 2.

211. [L²14ax]. *Brianchon*. (Voir 198.)

M¹

COURBES PLANES ALGÈBRIQUES.

212. [M¹3a]. *Humbert (G.)*, Sur les arcs des courbes planes algébriques, 57.

213. [M¹5eδ]. *Picquet*, Applications de la représentation des courbes du troisième degré, à l'aide des fonctions elliptiques, 54.

214. [M¹8e]. *Godefroy*, Sur les rayons de courbure de certaines courbes et surfaces et, en particulier, des courbes et surfaces de Lamé, 62.

M²

SURFACES ALGÈBRIQUES.

215. [M²3e]. *Humbert (G.)*, Sur un complexe remarquable de coniques et sur la surface du troisième ordre, 64.

216. [M²4f]. *Humbert (G.)*, Sur les surfaces cyclides, 53.

217. [M²4g]. *Humbert*. (Voir 216.)

218. [M²4h]. *Humbert*. (Voir 216.)

219. [M²9c]. *Godefroy*. (Voir 214.)

M³

COURBES GAUCHES ALGÈBRIQUES.

220. [M³3]. *Halphen*, Mémoire sur la classification des courbes gauches algébriques, 52.
221. [M³6b]. *Léauté*. (Voir 72.)

M¹

COURBES ET SURFACES TRANSCENDANTES.

222. [M¹az]. *Olivier*, Construction des centres de courbure des épicycloïdes planes et sphériques, 23.
223. [M¹i]. *La Gournerie (de)*, Mémoire sur les lignes d'ombre et de perspective des hélicoïdes gauches, 34.
224. [M¹j]. *La Gournerie (de)*. (Voir 223.)
225. [M¹n]. *Violla*, Mémoire sur la vis Saint-Gilles, 37.

N¹

COMPLEXES.

226. [N¹3a]. *Humbert (G.)*. (Voir 215.)

N¹

GÉOMÉTRIE ÉNUMÉRATIVE.

227. [N¹1a]. *Halphen*, Sur les caractéristiques des systèmes de coniques et de surfaces de second ordre, 45.

O

GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE ET GÉOMÉTRIE CINÉMATIQUE

228. [O]. *Lagrange*. (Voir 24.)
229. [O2az]. *Marie*. (Voir 56.)
230. [O2b]. *Olivier*, Mémoire de Géométrie descriptive sur la construction des tangentes

- en un point multiple d'une courbe plane ou à double courbure, dont l'équation n'est pas connue, 21.
231. [O2c3]. *Serret*, Mémoire sur les courbes algébriques dont les axes s'expriment par des arcs de cercle, 33.
232. [O2d]. *Haton de la Goupillière*, Recherches sur les centres de gravité, 43.
233. [O2dz]. *Haton de la Goupillière*. (Voir 232.)
234. [O2gz]. *Poisson*. (Voir 40.)
235. [O2i]. *Ampère*, Sur les avantages qu'on peut retirer dans la théorie des courbes de la considération des paraboles osculatrices, avec des réflexions sur les fonctions différentielles dont la valeur ne change pas lors de la transformation des axes, 14.
236. [O2j]. *Poisson*, Extrait des leçons faites à l'École Polytechnique sur les points singuliers des courbes dans le cours d'Analyse de 1803, 14.
237. [O2k]. *Reech*, Théorie de la courbure des lignes orthogonales, 41.
238. [O2m]. *Laurent (A.)*. (Voir 48.)
239. [O2m]. *Haton de la Goupillière*, Mémoire sur une nouvelle théorie générale des lignes isothermes et du potentiel cylindrique, 38.
240. [O2m]. *Haton de la Goupillière*, Méthodes de transformation en Géométrie et en Physique mathématique, 42.
241. [O2q]. *Haton de la Goupillière*, Formules nouvelles pour l'étude du mouvement d'une figure plane, 43.
242. [O3]. *Monge*, Des courbes à double courbure, 6.
243. [O3]. *Saint-Venant (de)*, Sur les lignes courbes non planes, 30.
244. [O3a]. *Olivier*. (Voir 230.)
245. [O3d]. *Olivier*, De la courbure et de la flexion d'une courbe à double courbure, 24.
246. [O3e]. *Olivier*. (Voir 245.)
247. [O3i]. *Halphen*, Sur les invariants différentiels des courbes gauches, 47.
248. [O4c]. *Olivier*, Mémoire de Géométrie descriptive. Construction des points d'inflexion de la transformée d'une courbe plane ou à double courbure tracée sur une surface développable, 22.
249. [O4hz]. *Catalan*, Sur les surfaces gauches à plan directeur, 29.
250. [O5]. *Brisse*, Exposition analytique de la théorie des surfaces, 53.
251. [O5az]. *Haton de la Goupillière*. (Voir 232.)
252. [O5f]. *Poisson*, Mémoire sur la courbure des surfaces, 21.
253. [O5f]. *Bonnet (O.)*, Mémoire sur la théorie générale des surfaces, 32.
254. [O5h]. *Bonnet (O.)*, Sur les ombilics des surfaces, 30.
255. [O5iz]. *Bonnet (O.)*, Mémoire sur les surfaces dont les lignes de courbure sont planes ou sphériques, 33.
256. [O5i]. *Bonnet (O.)*. (Voir 253.)
257. [O5i]. *Bonnet (G.-O.)*, Démonstration nouvelle de deux théorèmes de M. Bertrand, 56.
258. [O5n]. *Dupuis*, Sur la détermination géométrique des teintes dans les dessins, 1.
259. [O6a]. *La Gournerie (de)*. (Voir 223.)
260. [O6az]. *La Gournerie (de)*, Mémoire sur les courbes d'ombre et de perspective des surfaces de révolution, 33.

261. [O6a α]. *La Gournerie (de)*, Mémoire sur la surface engendrée par la révolution d'une conique autour d'une droite située d'une manière quelconque dans l'espace, 40.
262. [O6c]. *Monge*, De la surface courbe qui enveloppe l'espace parcouru par une sphère variable de rayon, et dont le centre parcourt une courbe à double courbure quelconque, 13.
263. [O6c]. *Lecornu*, Mémoire sur les surfaces enveloppes de sphères, 53.
264. [O6d]. *La Gournerie (de)*. (Voir 261.)
265. [O6h]. (*Bonnet O.*), Sur la surface réglée dont les rayons de courbure principaux sont égaux et dirigés en sens contraires, 32.
266. [O6h]. *Catalan*, Mémoire sur les surfaces dont les rayons de courbure, en chaque point, sont égaux et de signes contraires, 37.
267. [O6i]. *Olivier*, Des indicatrices des divers ordres de contact entre deux surfaces, et des conditions géométriques auxquelles doivent satisfaire deux surfaces ayant un point de contact pour qu'elles aient un contact de $n^{\text{ième}}$ ordre autour de ce point, 25.
268. [O6i]. *Olivier*, Sur les paraboloides osculateurs, 25.
269. [O6k]. *Bonnet (O.)*. (Voir 253.)
270. [O6k]. *Bour*, Théorie de la déformation des surfaces, 39.
271. [O6k]. *Bonnet (O.)*, Mémoire sur la théorie des surfaces applicables sur une surface donnée, 41, 42.
272. [O6n]. *Collignon*, Recherches sur la représentation plane de la surface du globe terrestre, 41.
273. [O6p]. *Lamé*, Sur les lois de l'équilibre du fluide éthéré. — 2^e Partie. Surfaces orthogonales conjuguées, 23.
274. [O6p]. *Bertrand*, Démonstration de quelques théorèmes sur les surfaces orthogonales, 29.
275. [O6p]. *Bonnet (O.)*. (Voir 253.)
276. [O6p α]. *Bonnet (O.)*, Sur la théorie des surfaces isothermes orthogonales, 30.
277. [O6q]. *Lévy (M.)*, Mémoire sur les coordonnées curvilignes orthogonales et en particulier sur celles qui comprennent une famille quelconque de surfaces de second degré, 43.
278. [O6s]. *Monge*, Mémoire sur la surface courbe dont toutes les normales sont tangentes à la surface d'une même sphère, 11.
279. [O6s]. *Monge*, Mémoire sur la surface courbe dont toutes les normales sont tangentes à une même surface conique à base arbitraire, 11.
280. [O6s]. *Monge*, Sur la surface courbe dont toutes les normales sont tangentes à une même surface développable quelconque, 13.
281. [O7a]. *Trançon*, Mémoire sur les propriétés d'un ensemble de droites menées de tous les points de l'espace, suivant une loi continue, 38.
282. [O7b]. *Malus*, Optique, 14.
283. [O7b]. *Malus*, Dioptrique, 14.
284. [O7b]. *Biot*, Sur les surfaces catacaustiques et diacaustiques dans la sphère, 28.
285. [O8a]. *Bresse*, Mémoire sur un théorème nouveau concernant les mouvements plans et sur l'application de la Cinématique à la détermination des rayons de courbure, 35.

286. [O8a]. *Mannheim*, Recherches géométriques sur les longueurs comparées d'arcs de courbes différentes, 40.
287. [O8a]. *Mannheim*, Construction des centres de courbure des lignes décrites dans le mouvement d'une figure plane qui glisse sur son plan, 37.
288. [O8a]. *Haton de la Goupillière*. (Voir 241.)
289. [O8c]. *Resal*, Mémoire sur les propriétés géométriques du mouvement le plus général d'un corps solide, 37.
290. [O8c]. *Mannheim*, Étude sur le déplacement d'une figure de forme invariable. Nouvelle méthode des normales. Applications diverses, 43.
291. [O8c]. *Mannheim*, Géométrie cinématique. Sur le déplacement d'une figure de forme invariable dont tous les plans passent par des points fixes, 60.

P

TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES.

292. [P3a]. *Haton de la Goupillière*. (Voir 240.)
293. [P3bz]. *Olivier*, Sur les projections stéréographiques, 26.
294. [P5c]. *Bonnet (O.)*. (Voir 253.)
295. [P6f]. *Haton de la Goupillière*. (Voir 240.)

Q

ANALYSIS SITUS.

296. [Q3a]. *Reech*, Démonstration d'une propriété générale des surfaces fermées, 37.

R

MÉCANIQUE GÉNÉRALE.

297. [R]. *Lagrange*. (Voir 24.)
298. [R]. *Prony*, Cours de Mécanique, 5.
299. [R1c]. *Prony*, Sur le principe des vitesses virtuelles et la décomposition des mouvements circulaires, 5.
300. [R1e]. *Léauté*, Sur une famille de courbes que l'on rencontre dans les transmissions de mouvement et sur leur application dans les machines, 53.
301. [R1f]. *Collignon*, Note sur le mouvement des planètes, 45.
302. [R1f]. *Léauté*, Méthode d'approximation graphique applicable à un grand nombre de questions de Mécanique pratique, 46.

303. [R1f α]. *Olivier*. (Voir 222.)
304. [R2a]. *Haton de la Goupillière*, Mémoire sur une théorie nouvelle de la Géométrie des masses, 37.
305. [R2c]. *Binet*, Mémoire sur la théorie des axes conjugués et des moments d'inertie des corps, 16.
306. [R2c]. *Guilbert*, Sur les axes principaux des corps, 25.
307. [R3]. *Poinsot*, Sur la composition des moments et la composition des aires, 13.
308. [R3]. *Binet*, Sur la composition des forces et sur la composition des moments, 17.
309. [R3]. *Coriolis*, Sur la théorie des moments considérée comme analyse des rencontres des lignes droites, 24.
310. [R4]. *Prony*, Mécanique philosophique, 7^{bis} et 8^{bis}.
311. [R4a]. *Fourier*, Mémoire sur la Statique contenant la démonstration du principe des vitesses virtuelles et sur la théorie des moments, 5.
312. [R4a]. *Lagrange*, Sur le principe des vitesses virtuelles, 5.
313. [R4a]. *Prony*. (Voir 299.)
314. [R4a]. *Poinsot*, De l'équilibre et du mouvement des systèmes, 13.
315. [R4b α]. *Lecornu*, Sur l'équilibre des surfaces flexibles et inextensibles, 48.
316. [R5a]. *Bour*, Sur l'attraction qu'exercerait une planète si l'on supposait sa masse répartie sur chaque élément de son orbite proportionnellement au temps employé à le parcourir, 36.
317. [R5a α]. *Callandreau*, Sur le développement en série du potentiel des sphéroïdes de révolution, 58.
318. [R5b]. *Chasles*, Mémoire sur l'attraction des ellipsoïdes, 25.
319. [R5b]. *Chasles*, Mémoire sur l'attraction d'une couche ellipsoïdale infiniment mince et les rapports qui ont lieu entre cette attraction et les lois de la chaleur en mouvement dans un corps en équilibre de température, 25.
320. [R6]. *Prony*. (Voir 310.)
321. [R6]. *Bertrand*, Note sur la théorie des mouvements relatifs, 32.
322. [R6]. *Bertrand*, Note sur la similitude en Mécanique, 32.
323. [R6a]. *Poinsot*. (Voir 314.)
324. [R6a]. *Binet*, Mémoire sur les principes généraux de Dynamique et en particulier sur un nouveau principe de Mécanique générale, 19.
325. [R6a α]. *Prony*. (Voir 299.)
326. [R6a α]. *Fourier*. (Voir 311.)
327. [R6a α]. *Lagrange*. (Voir 312.)
328. [R6a α]. *Ampère*, Démonstration générale du principe des vitesses virtuelles, dégagée de la considération des infiniment petits, 13.
329. [R6a β]. *Coriolis*, Mémoire sur le principe des forces vives dans les mouvements relatifs des machines, 21.
330. [R6a β]. *Duhamel*, Sur la perte de force vive qu'éprouve un système dans lequel il s'opère des changements brusques de vitesse, 24.
331. [R6a γ]. *Poinsot*. (Voir 307.)
332. [R7]. *Liouville (J.)*. (Voir 26.)
- .

333. [R7]. *Prony*. (Voir 310.)
334. [R7b]. *Poisson*. (Voir 107.)
335. [R7b β]. *Lecornu*, Sur les forces analytiques, 55.
336. [R7b γ]. *Poisson*, Mémoire sur le mouvement des projectiles dans l'air : 1° en ayant égard à la rotation de la Terre, 26; 2° en ayant égard à leur rotation, 26 et 27.
337. [R7e β]. *Fouret (G.)*, Mémoire sur certains mouvements dans lesquels des arcs d'une même courbe plane, comptés à partir d'une origine fixe, sont parcourus dans le même temps que les cordes correspondantes, 56.
338. [R8a]. *Prony*, Théorie du mouvement, autour d'un axe libre de rotation, d'un corps de figure invariable sollicité par des puissances quelconques, 6.
339. [R8a]. *Prony*, Analyse détaillée des différentes questions qui se rapportent au mouvement d'un corps sollicité par des puissances quelconques, 11.
340. [R8a]. *Coriolis*, Sur la manière d'établir les différents principes de Mécanique pour des systèmes de corps, en les considérant comme des assemblages de molécules, 24.
341. [R8a]. *Coriolis*, Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps, 24.
342. [R8a]. *Resal*, Note sur la courbure de l'herpolhodie, 55.
343. [R8a]. *Resal*, Développements sur un point de la théorie de la rotation des corps solides, 53.
344. [R8b]. *Prony*. (Voir 338.)
345. [R8c]. *Poisson*, Mémoire sur un cas particulier du mouvement de rotation des corps pesants, 16.
346. [R8c β]. *Moreau*, Sur la théorie du mouvement des projectiles dans les milieux résistants, 11.
347. [R8d]. *Biot*, Sur les axes de suspension synchrones, 13.
348. [R8d]. *Phillips*, Disposition propre à rendre le pendule isochrone, 62.
349. [R8e α]. *Léauté*, Théorie générale des transmissions par câbles métalliques. Règles pratiques, 50.
350. [R8f]. *Poisson*. (Voir 107.)
351. [R9a]. *Coriolis*, Sur l'évaluation des pertes de travail dues au frottement dans les engrenages coniques, 24.
352. [R9a]. *Resal*, Mémoire sur le frottement des engrenages coniques et de la vis sans fin, 33.
353. [R9a]. *Léauté*, Théorie du frein à lame, 54.
354. [R9c]. *Poisson*, Sur les oscillations du pendule dans un milieu résistant et en ayant égard à l'extensibilité du fil, 14 et 15.
355. [R9d]. *Coriolis*, Mémoire sur l'influence du moment d'inertie du balancier d'une machine à vapeur et de sa vitesse moyenne sur la régularité du mouvement de rotation que le va-et-vient du piston communique au volant, 21.
356. [R9d]. *Coriolis*, Sur la stabilité des voitures avec application aux messageries de France, 24.
357. [R9d]. *Coriolis*. (Voir 329.)
358. [R9d]. *Rolland*, Mémoire sur l'établissement des régulateurs de la vitesse, 43.

359. [R9d]. *Léauté*, Sur un perfectionnement applicable à tous les régulateurs à force centrifuge, 47.
360. [R9d]. *Léauté*. (Voir 349.)
361. [R9d]. *Léauté*, Sur une condition de bon fonctionnement des installations mécaniques comportant des transmissions par liens rigides ou flexibles, 59.
362. [R9d]. *Léauté*, Du mouvement troublé des moteurs consécutif à une perturbation brusque. Nouvelle méthode graphique pour l'étude complète de ce mouvement, 61.
363. [R9d β]. *Guieysse*, Régulateur isochrone parabolique, 54.

S

MECANIQUE DES FLUIDES.

364. [S1]. *Prony*. (Voir 310.)
365. [S2]. *Prony*. (Voir 310.)
366. [S2a]. *Cauchy*, Mémoire sur une espèce particulière de mouvement des fluides, 19.
367. [S2a]. *Poisson*, Mémoire sur les équations générales de l'équilibre et du mouvement des corps solides élastiques et des fluides, 20.
368. [S2a]. *Hugoniot*, Sur la propagation du mouvement dans les corps, et spécialement dans les gaz parfaits, 57.
369. [S2e]. *Hugoniot*. (Voir 368.)
370. [S3a β]. *Clarival*, Méthode nouvelle pour mesurer la dépense des déversoirs, 46.
371. [S3b α]. *Boileau*, Mémoire sur le jaugeage des cours d'eau à faible ou à moyenne section, 33.
372. [S3c]. *Prony*, Notice sur la nouvelle écluse de M. de Betancourt, 13.
373. [S4a]. *Clapeyron*, Sur la puissance motrice de la chaleur, 23.
374. [S4b γ]. *Moutier*, Sur les phénomènes thermiques qui accompagnent le mélange de deux liquides, 54.
375. [S5a]. *Barré de Saint-Venant* et *Wantzel*, Mémoire et expériences sur l'écoulement de l'air déterminé par des différences de pressions considérables, 27.
376. [S6a]. *Poisson*, Formules relatives au mouvement du boulet dans l'intérieur du canon, extraites du manuscrit de Lagrange, 21.
377. [S6a]. *Duchemin*, Mémoire sur la vitesse initiale des projectiles, 24.

T

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE.

378. [T1b α]. *Petit*, Théorie mathématique de l'action capillaire, 16.
379. [T2a]. *Poisson*. (Voir 367.)
380. [T2a]. *Duhamel*, Sur les vibrations d'un système quelconque de points matériels, 23.
J. E. P.

381. [T2a]. *Bonnet (O.)*, Mémoire sur la théorie des corps élastiques, 30.
382. [T2a]. *Mathieu*, Mémoire sur des intégrations relatives à l'équilibre d'élasticité, 48.
383. [T2a]. *Mathieu*, Mémoire sur l'équilibre d'élasticité d'un prisme rectangle, 49.
384. [T2ax]. *Poisson*. (Voir 40.)
385. [T2ax]. *Binet*, Sur l'expression analytique de l'élasticité et de la raideur des courbes à double courbure, 17.
386. [T2ax]. *Barré de Saint-Venant et Flamant*, Courbes représentatives des lois du choc longitudinal et du choc transversal d'une barre prismatique, 59.
387. [T2ay]. *Monge*, Construction de l'équation des cordes vibrantes, 15.
388. [T2ay]. *Plana*, Mémoire sur les oscillations des lames élastiques, 17.
389. [T2ay]. *Poisson*. (Voir 40.)
390. [T2ay]. *Duhamel*, Mémoire sur les vibrations d'une corde flexible chargée d'un ou de plusieurs curseurs, 29.
391. [T2aδ]. *Plana*. (Voir 388.)
392. [T2aδ]. *Mathieu*, Mémoire sur le mouvement vibratoire des cloches, 51.
393. [T2aε]. *Phillips*, Du spiral réglant conique des chronomètres et de divers autres spiraux, 49.
394. [T2b]. *Dupin*, Expériences faites sur la flexibilité, la force et l'élasticité des bois, 17.
395. [T2b]. *Léauté*, Application de la résistance des matériaux au calcul des pièces de machines, 52.
396. [T2b]. *Resal*, Solution de quelques questions se rapportant aux ponts suspendus, 53.
397. [T2c]. *Poisson*, Sur la théorie du son, 14.
398. [T3a]. *Hachette*, De l'héliostat, 16, 17.
399. [T3b]. *Malus*, Sur la mesure du pouvoir réfringent des corps opaques, 15.
400. [T3b]. *Lamé*, Mémoire sur les lois de l'équilibre du fluide éthéré, 23.
401. [T3b]. *Senarmont (de)*, Commentaire au Mémoire de Fresnel sur la double réfraction, 35.
402. [T3b]. *Moutier*, Sur l'intensité de la lumière, 59.
403. [T3b]. *Moutier*, Sur la composition des mouvements vibratoires, 64.
404. [T3c]. *Léauté*, Mémoire sur les oscillations à longues périodes dans les machines actionnées par des moteurs hydrauliques et sur les moyens de prévenir ces oscillations, 55.
405. [T4a]. *Duhamel*, Mémoire sur le mouvement des différents points d'une barre cylindrique dont la température varie, 36.
406. [T4a]. *Moutier*, L'énergie libre et les changements d'état, 57.
407. [T4c]. *Poisson*, Mémoire sur la distribution de la chaleur dans les corps solides, 19.
408. [T4c]. *Duhamel*, Mémoire sur les équations générales de la propagation de la chaleur dans les corps solides dont la conductibilité n'est pas la même dans tous les sens, 21.
409. [T4c]. *Duhamel*, Sur la méthode générale relative au mouvement de la chaleur dans les corps solides plongés dans des milieux dont la température varie avec le temps, 22.

410. [T4c]. *Lamé*, Sur la propagation de la chaleur dans les polyèdres, et principalement dans le prisme triangulaire régulier, 22.
 411. [T4c]. *Duhamel*, Mémoire sur les phénomènes thermomécaniques, 25.
 412. [T4c]. *Duhamel*, Mémoire sur la propagation de la chaleur dans les cristaux, 32.

U

MÉCANIQUE CÉLESTE; GÉOGRAPHIE MATHÉMATIQUE.

413. [U1]. *Callandreau*, Contribution à la théorie du mouvement elliptique et parabolique, 49.
 414. [U2]. *Binet*, Mémoire sur la détermination des orbites des planètes et des comètes, 20.
 415. [U3]. *Laplace*, Mémoire sur la détermination d'un plan qui reste toujours parallèle à lui-même, dans le mouvement d'un système de corps agissant d'une manière quelconque les uns sur les autres, et libres de toute action étrangère, 5.
 416. [U3]. *Laplace*, Sur la Mécanique, 6.
 417. [U3]. *Poisson*, Sur les inégalités séculaires des moyens mouvements des planètes, 15.
 418. [U3]. *Lagrange*, Sur une difficulté singulière qui se rencontre dans le calcul de l'attraction des sphéroïdes très peu différents de la sphère, 15.
 419. [U3]. *Bour (Ed.)*, Mémoire sur le problème des trois corps, 36.
 420. [U3]. *Mathieu*, Sur l'application du problème des trois corps à la détermination des perturbations de Jupiter et de Saturne, 45.
 421. [U3]. *Andrade (J.)*, Sur le mouvement d'un corps soumis à l'attraction newtonienne de deux corps fixes. Sur une extension d'une propriété des mouvements képlériens, 60.
 422. [U4]. *Callandreau*, Note sur l'emploi des fractions continues algébriques pour le calcul des coefficients $b_{\frac{1}{2}}^{(v)}$ de Laplace, 45.
 423. [U6b]. *Liouville (J.)*, Sur la figure d'une masse fluide homogène, en équilibre et douée d'un mouvement de rotation, 23.
 424. [U9]. *Poisson*, Sur le mouvement de rotation de la Terre, 15.
 425. [U10b]. *Tissot*, Sur les altérations d'angles et de distances dans le développement modifié de Flamsteed, 37.

V

HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES.

426. [V9]. *Laussedat*, Discours prononcé aux funérailles de M. Chasles, 48.
 427. [V9]. *Rouché*, Edmond Laguerre, sa vie et ses travaux, 56.
 428. [V9]. *Poincaré*, Notice sur Halphen, 60.

X

PROCÉDÉS DE CALCUL.

429. [X2]. *Laplace*. (Voir 62.)
430. [X4]. *Léauté*. (Voir 302.)
431. [X4b]. *Corancez (de)*, Sur la résolution des équations. Méthode nouvelle pour construire, par des procédés géométriques, les racines réelles des équations de tous les degrés, 17.
-

II. — TRAVAUX ÉTRANGERS A LA CLASSIFICATION DU RÉPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Astronomie.

432. *Lefrançois*, Sur la gnomonique, 11.
433. *Puissant*, Nouvelle méthode analytique pour déterminer les effets de l'aberration sur la position des astres, 17.

Physique.

434. *Hassenfratz, Welter, Bonjour, Hachette*, Sur la congélation du mercure, 1.
435. *Prony*, Sur les lois de la dilatabilité des fluides élastiques et sur celle de la force expansive de la vapeur, 2.
436. *Barruel*, Physique générale, 2, 3, 4.
437. *Hassenfratz*, Physique générale, 6.
438. *Hassenfratz*, Sur les ombres colorées, 11.
439. *Hachette*, Sur le galvanisme, 11.
440. *Barruel*, Extrait d'un Mémoire sur l'élasticité, 11.
441. *Cavendish* (traduit par *Chompré*), Expériences pour déterminer la densité de la Terre, 17.
442. *Dulong et Petit*, Recherches sur la mesure des températures et sur les lois de la communication de la chaleur, 18.
443. *Bravais*, Notice sur les parhélies qui sont situés à la même hauteur que le Soleil, 30.
444. *Bravais*, Notice sur l'arc-en-ciel blanc, 30.
445. *Bravais*, Mémoire sur les halos et les phénomènes optiques qui les accompagnent, 31.
446. *Cornu*, Détermination nouvelle de la vitesse de la lumière, 44.
447. *Baille*, Étude sur la résistance de l'air, 52.

448. *Moutier*, Sur la loi de Dulong et Petit, 53.
449. *Cornu*, Sur les raies telluriques qu'on observe dans le spectre solaire au voisinage des raies D, 53.
450. *Mercadier*, Études expérimentales sur l'élasticité dynamique et statique des fils métalliques, 58.

Chimie.

451. *Fourcroy, Chaptal, Berthollet, Guyton, Vauquelin, Chaussier*, Chimie (Substances salines, végétales, animales, minérales), 1, 2, 3, 4.
452. *Guyton*, Description d'un eudiomètre à sulfure de potasse, 2.
453. *Berthollet*, Observations sur les propriétés eudiométriques du phosphore, 3.
454. *Guyton*, Résumé sur la théorie de la cristallisation, 3.
455. *Guyton*, Analyse de la calcédoine du Creuzot, 3.
456. *Guyton*, Expériences comparatives sur les terres pour déterminer leur fusibilité, 3.
457. *Bonjour*, Expériences sur la formation du principe colorant prussique, 3.
458. *Fourcroy, Vauquelin*, Des propriétés de l'acide sulfureux et de ses combinaisons avec les bases terreuses et alcalines, 4.
459. *Fourcroy*, Sur le principe de l'odeur des végétaux, 5.
460. *Guyton*, Examen d'un oxyde d'antimoine, 11.
461. *Berthollet*, Observations sur la strontiane, 11.
462. *Desormes, Clément*, Précis d'expériences sur l'oxyde de carbone gazeux, 11.
463. *Thenard*, Notice sur l'acide sébacique, 11.
464. *Thenard*, Observations sur l'acide zoonique, 11.
465. *Lermina*, Description d'un sel sulfuré de soude, 11.
466. *Fourcroy, Thenard*, Sur les oxydes et sur les sels de mercure, 13.
467. *Demarçay*, Sur les dérivés du sulfure d'azote, 54.
468. *Grimaux, Ch. Cloëz*, Sur quelques dérivés de l'érythrite, 60.

Minéralogie.

469. *Lermina, Garin, Pêcheur*, Description d'une pierre appelée *sibérîte*, 6.

Météorologie.

470. *Hassenfratz*, Observations sur la neige et la pluie, leur influence sur la végétation et leur combinaison avec l'oxygène, 4.
471. *Prieur*, Lettre sur le serein et la rosée, 6.

Géographie physique.

472. *Humboldt (A. de)*, Sur la communication qui existe entre l'Orénoque et la rivière des Amazones, 10.

Technologie.

473. *Bernard*, Description sur la manière dont se polissent et s'étament les glaces, 5.
474. *Berthollet*, Notice sur une méthode de donner au lin et au chanvre les apparences du coton, 11.

Génie civil.

475. *Lamblardie*, Extrait d'un Mémoire de Brémontier sur le moyen de fixer les dunes, 5.
476. *Prony*, Recherches sur le système hydraulique de l'Italie, 10.
477. *Regnard*, Sur la direction des cassis, 11.
478. *Dupuis-Torcy*, *Brisson*, Sur l'art de projeter les canaux de navigation, 14.
479. *Montgolfier*, Sur la possibilité de substituer le béliet hydraulique à l'ancienne machine de Marly, 14.
480. *Hachette*, Calcul sur le précédent, 14.

Machines.

481. *Régnier*, Description et usage du dynamomètre, 5.
482. *Hassenfratz*, Mémoire sur les meilleures proportions à donner aux chaudières, 6.

Génie militaire.

483. *Obenheim (d')*, Fortification, 1.
484. *Say*, Fortification, 2, 3, 4.
485. *Say*, Mémoire sur le défillement des fortifications, 4.
486. *Marescot*, Mémoire sur la fortification souterraine, 11.
487. *Lomet*, Sur l'emploi des machines aérostatiques aux reconnaissances militaires et à la construction des cartes géographiques, 11.

Beaux-Arts.

488. *Lamblardie*, *Baltard*, Architecture, 1.
489. *Baltard*, Architecture, 4.
490. *Griffet la Baume*, Architecture, 2, 3.
491. *Neveu*, Cours relatif aux Arts du Dessin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11.

Littérature.

492. *Andrieux*, Cours de Grammaire et de Belles-Lettres, 6.

Statistique.

493. *Demonferrand*, Essai sur les lois de la population et de la mortalité en France, 26.
494. *Demonferrand*, Mémoire sur la rectification de quelques documents relatifs à la statistique, 27.

Éloges et Notices nécrologiques.

495. *Prony*, Éloge de Lamblardie, 5.
496. *Guyton*, Éloge de Bertrand Pelletier, 5.
497. *Guyton*, Notice biographique sur Gardeur le Brun, 11.
498. *Anonyme*, Notice nécrologique sur Lermine, 13.
Voir aussi nos 426, 427, 428.

Bibliographie; Rapports sur divers Travaux.

499. *Prony*, Notice sur les nouveaux Éléments d'Analyse de Lagrange, 2.
500. *Camus*, Compte rendu des travaux entrepris par l'Institut National ou exécutés sous sa direction, 6.
501. *Camus*, Extraits de quelques Ouvrages nouveaux qui ont paru en Allemagne, 6.
502. Annonces et Notices d'Ouvrages, 11.
503. Annonce de la *Correspondance sur l'École Polytechnique*, 13, 14, 15, 16.

Documents relatifs à l'École.

504. Organisation de l'École Polytechnique, 3.
505. État nominatif des principaux agents de l'École Polytechnique.
506. Lois et Arrêtés concernant l'École, 4.
507. Discours prononcés par les divers Professeurs, 6.
508. Loi relative à l'organisation du 25 frimaire an VIII, 11.
509. Rapports sur la situation de l'École, 11.
510. Avis du Ministre de l'Intérieur sur le Concours pour l'admission en l'an X, 11.
511. Programme des connaissances exigées, 11.
512. Liste des Membres du Conseil de perfectionnement, 11.
513. *Hassenfratz*, Programme d'un Cours de Mines fait à l'École, 13.
514. *Montessus de Ballore (F. de)*, Étude statistique sur le recrutement de l'École, 63.
-

TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS D'AUTEURS.

(Les numéros inscrits après chaque nom renvoient à la Table analytique.)

- | | |
|--|---|
| Ampère, 29, 104, 106, 109, 235, 328. | Chaussier, 431. |
| Andrade, 58, 157, 421. | Chompré, 441. |
| Andrieux, 492. | Clapeyron, 373. |
| Autonne, 86, 89, 98, 99. | Clarival, 370. |
| Badoureau, 156, 180, 181. | Clément, 462. |
| Baille, 447. | Cloez (Ch.), 468. |
| Baltard, 488, 489. | Collignon, 150, 272, 301. |
| Barruel, 436, 440. | Corancez (de), 431. |
| Bénard, 153. | Coriolis, 309, 329, 340, 341, 351, 353, 356, 357. |
| Bernard, 473. | Cornu, 446, 449. |
| Berthollet, 451, 453, 461, 474. | David, 57. |
| Bertrand (Joseph), 36, 37, 161, 274, 321, 322. | Demarçay, 467. |
| Binet, 11, 60, 61, 80, 91, 138, 140, 182, 188, 203, 303, 308, 324, 383, 414. | Delaunay, 159. |
| Biot, 129, 284, 347. | Demontferrand, 493, 494. |
| Boileau, 371. | Desormes, 462. |
| Bonjour, 434, 457. | Didion, 153. |
| Bonnet (Ossian), 209, 253, 254, 255, 256, 263, 269, 271, 273, 276, 294, 381. | Duchemin, 377. |
| Bonnet (Georges-Ossian), 237. | Duhamel, 330, 380, 390, 405, 408, 409, 411, 412. |
| Bouquet, 47, 81, 88. | Dulong, 442. |
| Bour, 108, 110, 120, 270, 316, 419. | Dupin, 195, 204, 394. |
| Bravais, 183, 184, 443, 444, 445. | Dupuis, 258. |
| Bresse, 283. | Dupuis-Torcy, 478. |
| Briet, 15, 17. | Eisenman, 193. |
| Brianchon, 2, 177, 196, 198, 199, 202, 208, 211. | Fermat, 186. |
| Briot, 47, 81, 88. | Flamant, 386. |
| Brisse, 7, 230. | Fourcroy, 451, 458, 459, 466. |
| Brisson, 103, 105, 121, 478. | Fouret, 337. |
| Callandreaux, 317, 413, 422. | Fourier, 311, 326. |
| Camus, 500, 501. | François, 166. |
| Catalan, 85, 178, 179, 249, 266. | Garin, 469. |
| Cauchy, 3, 8, 9, 12, 34, 46, 59, 66, 122, 123, 127, 137, 152, 160, 168, 173, 176, 366. | Gaultier (de Tours), 171, 172, 183, 187. |
| Cavendish, 441. | Godefroy, 214, 219. |
| Chaptal, 451. | Griffet de la Baume, 490. |
| Chasles, 318, 319. | Grimaux, 468. |
| | Guieysse, 363. |
| | Gulbert, 306. |
| | Guyton, 451, 452, 454, 455, 456, 460, 496, 497. |

- Hachette, 186, 189, 203, 206, 398, 434, 439, 480.
Halphen, 71, 73, 220, 227, 247.
Hassenfratz, 434, 437, 438, 470, 482, 513.
Haton de la Goupillière, 41, 232, 233, 239, 240, 241, 251, 288, 292, 293, 304.
Hermitte, 67.
Hugoniot, 368, 369.
Humbert (Georges), 101, 212, 215, 216, 217, 218, 226.
Humboldt (A. de), 472.
Jordan, 14, 73, 143, 145, 146, 163.
La Gournerie (de), 197, 200, 223, 224, 239, 260, 261, 264.
Laguerre, 22.
Lagrange, 6, 24, 25, 33, 38, 39, 77, 78, 134, 136, 149, 158, 191, 228, 297, 312, 327, 418.
Lamblardie, 475, 488.
Lamé, 273, 400, 410.
Laplace, 1, 5, 62, 117, 123, 130, 132, 133, 131, 190, 413, 416, 429.
Laurent (Alph.), 48, 49, 238.
Laurent (Hermann), 18.
Laussedat, 426.
Léauté, 72, 221, 300, 302, 349, 353, 359, 360, 361, 362, 393, 404, 430.
Lecornu, 21, 263, 313, 333.
Lefrançois, 432.
Lermina, 463, 469.
Lévy (Lucien), 114.
Lévy (Maurice), 277.
Liouville (Joseph), 26, 27, 28, 31, 63, 74, 90, 92, 97, 100, 124, 332, 423.
Liouville (Roger), 83, 87, 93, 94, 113, 118.
Livet, 165, 207.
Lomet, 487.
Lucas (Félix), 10, 194.
Malus, 282, 283, 399.
Mannheim, 286, 287, 290, 291.
Marescot, 486.
Marie (Maximilien), 51, 52, 53, 54, 55, 56, 229.
Mathieu (Emile), 70, 382, 383, 392, 420.
Mercadier, 450.
Monge, 164, 173, 192, 203, 206, 210, 242, 262, 278, 279, 280, 387.
Montessus de Ballore (de), 514.
Montgolfier, 479.
Moreau, 346.
Moutard, 112, 113, 119.
Moutier, 374, 402, 403, 406, 448.
Neveu, 491.
Obenheim (d'), 483.
Ocagne (M. d'), 42, 44, 133, 154, 169.
Olivier (Théodore), 222, 230, 244, 245, 246, 248, 267, 268, 293, 303.
Pêcheur, 469.
Petit, 378, 442.
Phillips, 348, 393.
Picard (Emile), 116.
Picquet, 13, 19, 93, 213.
Pigeon, 170.
Plana, 388, 391.
Poincaré (Henri), 20, 82, 141, 142, 144, 147, 428.
Poinot, 139, 167, 174, 307, 314, 323, 331.
Poisson, 16, 40, 43, 63, 64, 68, 69, 79, 84, 102, 107, 111, 126, 128, 131, 234, 236, 232, 334, 336, 345, 350, 354, 367, 376, 379, 384, 389, 397, 407, 417, 424.
Prieur, 471.
Prony (de), 23, 76, 201, 298, 299, 310, 313, 320, 325, 333, 338, 339, 344, 364, 365, 372, 435, 476, 495, 499.
Puissant, 433.
Reech, 237, 296.
Regnard, 477.
Régnier, 481.
Resal (H.), 32, 289, 342, 343, 352, 396.
Rolland, 358.
Rouché, 4, 45, 50, 427.
Saint-Venant (Barré de), 243, 375, 386.
Say, 484, 485.
Senarmont (de), 401.
Serret (J.-A.), 162, 231.
Thenard, 463, 464, 466.
Tissot, 33, 423.
Trançon, 30, 281.
Vaschy, 96.
Vauquelin, 451, 458.
Vialla, 223.
Wantzel, 148, 373.
Welter, 434.

